

护士执业资格考试《答疑周刊》2019 年第 13 期

1. 【问题】学员提问：中分子右旋糖酐和羟乙基淀粉都是胶体渗透压怎么区分？

【解答】羟乙基淀粉：增加血浆渗透压及循环血量，可在急性大出血时与全血共用。

中分子右旋糖酐：可提高血浆胶体渗透压，扩充血容量。

2. 【问题】学员提问：交感神经和副交感神经结构上，功能上的特点？

【解答】交感神经是植物性神经的一部分。由中枢部、交感干、神经节、神经和神经丛组成。

中枢部位于脊髓胸段全长及腰髓 1~3 节段的灰质侧角。交感干位于脊柱两侧，由交感干神经节和节间支连接而成，可分颈、胸、腰、骶和尾 5 部分。调节心脏及其他内脏器官的活动。交感神经系统的活动比较广泛，刺激交感神经能引起腹腔内脏及皮肤末梢血管收缩、心搏加强和加速、瞳孔散大、疲乏的肌肉工作能力增加等。交感神经的活动主要保证人体紧张状态时的生理需要。

人体在正常情况下，功能相反的交感和副交感神经处于相互平衡制约中。

可以这样理解，一个属动，一个属静，综合调控人体的生理状态。

3. 根据甲类传染病的疫情控制要求，当遇到甲类传染病的密切接触者时，处理方法下列哪项是正确的

- A. 确诊前在指定场所单独隔离治疗
- B. 确诊后在指定场所单独隔离治疗
- C. 在指定场所进行医学观察
- D. 必须限制其活动范围，防止疾病传播
- E. 不必进行特别的管理

【正确答案】C

【学员问题】老师，甲类传染病是传染病中最严重的类型，为什么不进行单独隔离？

【解答】修订后的法律规定，医疗机构发现甲类传染病时，应当及时采取下列措施：对病人、病原携带者予以隔离治疗，隔离期限根据医学检查结果确定；对疑似病人，确诊前在指定场所单独隔离治疗；对医疗机构内的病人、病原携带者、疑似病人的密切接触者，在指定场所进行医学观察和采取其他必要的预防措施。

4. 杨某。男，30 岁。行疝修补术后 2 天体温 38℃，病人无其他主诉。应考虑

- A. 手术切口感染

- B. 上呼吸道感染
- C. 并发肺部感染
- D. 基础代谢增高
- E. 外科手术热

【正确答案】 E

【学员问题】 老师，什么是外科手术热？

【解答】 术后 2~3 天内不超过 38℃ 的发热应考虑为外科手术热。外科手术热又称外科热或吸收热。是由于外科手术破坏，组织的分解产物及局部渗液、渗血吸收后出现的反应，术后病人的体温可略升高，变化幅度在 0.5~1℃，一般不超过 38.5℃。多发生在术后 2~3 天。

5. 【问题】 学员提问：室早是在什么情况下出现？洋地黄中毒是首要条件吗？

【解答】 洋地黄中毒导致的室早是因为患者有服用洋地黄，其他的原因也可以导致二尖瓣狭窄出现室早，比如二尖瓣狭窄手术治疗后。室性期前收缩的病因有很多，正常人以及各种心脏病的患者都可以出现。