

护士执业资格考试《答疑周刊》2019 年第 14 期

1. 患者，女性，33 岁。支气管扩张，右侧支气管有炎性分泌物需要引流，护士为患者采取的正确卧位是

- A. 半坐卧位
- B. 右侧头高足低位
- C. 左侧头高足低位
- D. 右侧头低足高位
- E. 左侧头低足高位

【正确答案】E

【学员问题】老师，为什么所有的支气管扩张分泌物引流都是左侧头低足高位吗？

【解答】支气管扩张引流时要保持需要引流的部位在高位，利用重力作用把分泌物引流出来。患者是右侧支气管有炎性分泌物所以要左侧卧位。头低足高位这样肺底部处于高位便于引流物流出。

2. 【问题】学员提问：中心静脉压高说明什么？

【解答】中心静脉压过高提示血容量过多或心脏排血量明显减少，有发生肺水肿的危险，应减少输液，酌情给予快速洋地黄制剂等措施。

3. 【问题】学员提问：屈膝仰卧位和截石位都可以做会阴操作，如何区分？

【解答】屈膝仰卧位主要用于腹部检查和导尿管，截石位适用于会阴、肛门部位的检查、治疗、手术，产妇分娩时等。

4. 【问题】学员提问：婴儿喂养不足会出现那些症状？

【解答】婴儿喂养不足会引起婴儿增重缓慢，且睡眠不实，严重者出现营养不良，机体抵抗力下降。

5. 急性心肌梗死时体内最先升高、特异性最高的酶是

- A. ALP
- B. CPK
- C. LDH
- D. ALT
- E. CK-MB

【正确答案】E

肌酸激酶同工酶（CK-MB）起病 4 小时内升高，16~24 小时达高峰，3~4 日恢复正常，其诊断特异性高。此外，CK-MB 高峰出现时间是否提前有助于判断溶栓治疗是否成功。

