

A1 型题 (1~108 题)

1. 湿浊内生的关键是

- A. 脾气的运化失职
- B. 肝气的疏泄失职
- C. 肾阳的温化失职
- D. 心阳的推动失职
- E. 肺气宣降失职

2. 起于胸中走向手指端的经脉为

- A. 手三阳经
- B. 足三阳经
- C. 手三阴经
- D. 足三阴经
- E. 以上都不是

3. 决定着疾病的发生、发展和转归, 体现气的哪方面功能

- A. 温煦作用
- B. 凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

4. 富有营养, 性质精纯的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

5. 主液的脏腑为

- A. 肾
- B. 膀胱
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 肺

6. 脾之华在

- A. 肉
- B. 唇
- C. 毛
- D. 骨
- E. 筋

7. 君相安位指的是

- A. 心与肝的关系
- B. 心与脾的关系
- C. 肺与脾的关系
- D. 肺与肝的关系
- E. 心与肾的关系

8. “通因通用”适用于治疗下列哪种病证

- A. 真实假虚证
- B. 真虚假实证
- C. 虚实错杂证
- D. 虚证
- E. 实证

9. “五脏之阳气，非此不能发”指的是

- A. 肾阳
- B. 肾阴
- C. 肾精
- D. 肾气
- E. 以上都不对

10. 将脏腑代谢后产生的浊液下输于膀胱，成为尿液生成之源。是肺的哪方面生理功能

- A. 肺为华盖
- B. 肺气宣发
- C. 肺主治节
- D. 肺气肃降
- E. 肺为娇脏

11. 指导脏腑用药，青色、酸味入

- A. 心
- B. 脾
- C. 肺
- D. 肝
- E. 肾

12. 下列五行相侮正确的是

- A. 火侮金
- B. 木侮金
- C. 木侮土
- D. 木侮水
- E. 土侮金

13. “土”所不胜者为

- A. 火
- B. 土
- C. 水
- D. 木
- E. 金

14. 凡具有沉降、肃杀、收敛等性质或作用的事物和现象，归属于

- A. 土
- B. 火
- C. 金
- D. 水
- E. 木

15. 阴阳偏衰的治疗原则是

- A. 阴病治阳
- B. 阳病治阴

- C. 虚则补之
- D. 实则泻之
- E. 热者寒之

16. 促使气血运行畅通无阻的是

- A. 肺
- B. 脾
- C. 肝
- D. 肾
- E. 胃

17. 既能活血化瘀, 又能行气止痛, 为“血中之气药”的是

- A. 红花
- B. 郁金
- C. 川芎
- D. 乳香
- E. 三七

18. 功效为“活血调经, 祛瘀止痛, 凉血消痈, 除烦安神”的药物是

- A. 红花
- B. 桃仁
- C. 郁金
- D. 丹参
- E. 川芎

19. 肉桂入煎剂的剂量为

- A. 5~15g
- B. 15~30g
- C. 0.1~0.3g
- D. 1~2g
- E. 1~4.5g

20. 具有利尿通淋、清热解暑、收湿敛疮功效的药物为

- A. 萆薢
- B. 藿香
- C. 茯苓
- D. 滑石
- E. 木通

21. 既能利水渗湿, 又能宁心的药物是

- A. 远志
- B. 茯苓
- C. 石决明
- D. 五味子
- E. 酸枣仁

22. 可治风湿痹证、风寒表证以及夜盲的药物是

- A. 白前
- B. 厚朴
- C. 羌活
- D. 苍术

E. 车前子

23. 功效为祛风湿, 通络止痛, 消骨鲠的药物是

- A. 川乌
- B. 蕲蛇
- C. 独活
- D. 威灵仙
- E. 天竺黄

24. 为治疗积滞便秘之要药的是

- A. 芒硝
- B. 番泻叶
- C. 巴豆
- D. 大黄
- E. 火麻仁

25. 具有清实热、退虚热的药物是

- A. 苦参
- B. 栀子
- C. 石膏
- D. 知母
- E. 黄芩

26. 既能清热燥湿, 止血, 安胎的药物是

- A. 桑寄生
- B. 续断
- C. 黄芩
- D. 艾叶
- E. 菟丝子

27. 荆芥的功效是

- A. 祛风解表, 透疹消疮, 止血
- B. 祛风解表, 胜湿止痛, 止痉
- C. 解表散寒, 祛风胜湿, 止痛
- D. 发散风寒, 通鼻窍, 止痛
- E. 疏散风热, 清利头目, 利咽透疹

28. 贝壳、甲壳、化石等类药物入汤剂的用法是

- A. 另煎
- B. 烱化兑服
- C. 先煎
- D. 后下
- E. 布包煎

29. 一种药物的毒副作用能被另一种药物所抑制, 称为

- A. 相使
- B. 相杀
- C. 相反
- D. 相须
- E. 相畏

30. 甘味药的作用是

- A. 渗湿利水
- B. 发散、行气、行血
- C. 软坚散结、泻下
- D. 收敛、固涩
- E. 补益、和中、缓急

31. 以温阳健脾, 行气利水为功用的方剂是

- A. 桂枝汤
- B. 苓甘五味姜辛汤
- C. 小青龙汤
- D. 实脾散
- E. 贝母瓜蒌散

32. 以益气滋阴, 通阳复脉为功用的方剂是

- A. 失笑散
- B. 一贯煎
- C. 生脉散
- D. 大补阴丸
- E. 炙甘草汤

33. 不属于汤剂特点的是

- A. 吸收快
- B. 不方便携带
- C. 药效发挥迅速
- D. 加减变化灵活
- E. 随证改变

34. 独活、羌活并见的方剂是

- A. 玉真散
- B. 败毒散
- C. 独活寄生汤
- D. 九味羌活汤
- E. 柴葛解肌汤

35. 桂枝汤中甘草和桂枝的配伍意义是

- A. 调和营卫
- B. 暖胃止呕
- C. 辛甘化阳
- D. 酸甘化阴
- E. 调和脾胃

36. 小青龙汤中起温肺化饮作用的配伍是

- A. 细辛、干姜
- B. 芍药、半夏
- C. 麻黄、桂枝
- D. 五味子、芍药
- E. 五味子、细辛

37. 九味羌活汤的药物组成不包括

- A. 防风
- B. 独活



- C. 细辛
- D. 川芎
- E. 黄芩

38. 桂枝汤服已须臾, 啜热稀粥的意义是

- A. 防止脾胃受损
- B. 滋汗源, 以防伤阴
- C. 滋汗源, 以防伤阳
- D. 助汗并祛除外邪
- E. 既防亡阴又防亡阳

39. 运用前提为主证不变, 君药不变; 以适应病情变化和治疗需要, 此种情况属于

- A. 药味加减变化
- B. 药量加减变化
- C. 剂型加减变化
- D. 药味及药量的加减变化
- E. 药味及剂型的加减变化

40. 下列哪项不属于散剂的特点

- A. 吸收速度比丸剂快
- B. 吸收速度不如汤剂
- C. 制作简单, 节约药材
- D. 易变质
- E. 便于使用和携带

41. 下列关于君药的说法, 错误的是

- A. 主要是针对主病或主证
- B. 每一方中必须有君药
- C. 在方中起主要治疗作用
- D. 君药的用量相对增大
- E. 君药在方中用量是最重的

42. 左金丸中黄连吴茱萸用量比例为

- A. 5:1
- B. 6:1
- C. 3:1
- D. 3:2
- E. 4:1

43. 汗出如油, 四肢肌肤尚温而脉躁疾无力者属

- A. 亡阳证
- B. 亡阴证
- C. 实热证
- D. 阴虚证
- E. 气虚证

44. 消渴并发症患者, 其病室中可嗅及的气味表现为

- A. 蒜臭味
- B. 氨气味
- C. 血腥味
- D. 尸臭味



E. 烂苹果味

45. 表现为神识不清, 语言重复, 时断时续, 语声低弱模糊的症状属于

- A. 错语
- B. 狂言
- C. 郑声
- D. 谵语
- E. 独语

46. 不属于寒证与热证鉴别要点的是

- A. 疼痛与否
- B. 口渴与否
- C. 面色的赤白
- D. 四肢的温凉
- E. 对寒热的喜恶

47. 风寒表证的特征是

- A. 恶寒重发热轻
- B. 恶寒轻发热轻
- C. 发热重恶寒轻
- D. 发热重恶寒重
- E. 发热轻而恶风自汗

48. 睡后易醒, 醒后不易入睡多见于

- A. 心肾不交
- B. 心脾两虚
- C. 胆郁痰扰
- D. 食滞内停
- E. 痰湿困脾

49. 主气血运行不畅的舌色表现是

- A. 红舌
- B. 绛舌
- C. 淡白舌
- D. 淡红舌
- E. 青紫舌

50. 临床表现主要为胃脘嘈杂, 饥不欲食, 隐隐灼痛, 干呕呃逆, 口干咽燥, 舌红少苔, 脉细数的证候为

- A. 胃阴虚证
- B. 胃阳虚证
- C. 食滞胃脘证
- D. 肝胃不和证
- E. 肝脾不调证

51. 不属于肝郁气滞证临床表现的是

- A. 情志抑郁
- B. 乳房胀痛
- C. 胁肋灼痛
- D. 月经不调
- E. 少腹胀痛

52. 面部呆板、无表情, 似面具样, 见于

A.破伤风

B.震颤麻痹

C.甲亢患者

D.肝硬化

E.二尖瓣狭窄

53. 我国最常见的咯血原因是

A.肺脓肿

B.风湿性心脏病二尖瓣狭窄

C.肺结核

D.肺癌

E.支气管扩张

54. 金属调的咳嗽多见于

A.喉炎

B.喉结核

C.声带炎

D.纵隔肿瘤

E.支气管炎

55. 腹痛位于右上腹部, 并向右肩部放射, 提示

A.肠炎

B.十二指肠溃疡

C.胃炎

D.胆囊炎

E.急性胰腺炎

56. 中枢性瘫痪的特点是

A.肌张力降低

B.腱反射减弱

C.浅反射消失

D.不出现病理反射

E.肌张力增强

57. 胆囊肿大, 无压痛, 伴黄疸进行性加深, 多考虑

A.胆囊炎

B.胆结石

C.肝脓肿

D.胆囊癌

E.胰头癌

58. 反应肝损害的最敏感的检查指标是

A.AFP

B.ALT

C.AST

D.γ-GT

E.ALP

59. PT 延长可见于

A.维生素 K 缺乏

B.DIC 早期



C. 脑血栓形成

D. 心肌梗死

E. 多发性骨髓瘤

60. 人体血清中含量最高的免疫球蛋白是

A. IgA

B. IgD

C. IgM

D. IgE

E. IgG

61. 长期减肥禁食的患者, 下列哪项最常见

A. 血清钾升高

B. 血清钾降低

C. 血清氯降低

D. 血清钙增高

E. 以上都不是

62. 少尿是尿量小于

A. 17ml/h

B. 100ml/24h

C. 400ml/h

D. 100ml/h

E. 17ml/24h

63. 心源性水肿的主要特点是

A. 呈下垂性水肿

B. 先眼睑或颜面水肿

C. 向心性水肿

D. 非凹陷性水肿

E. 黏液性水肿

64. 关于碱性磷酸酶测定的临床意义错误的是

A. 阻塞性黄疸患者 ALP 明显增高

B. 肝细胞性黄疸 ALP 轻度增高

C. 肝内局限性胆道阻塞 ALP 明显增高

D. 骨骼疾病时 ALP 不增高

E. 肝内胆汁淤积 ALP 明显升高

65. 下列疾病中, 粪便显微镜检查可见红细胞的是

A. 痢疾

B. 直肠癌

C. 下消化道出血

D. 溃疡性结肠炎

E. 以上都是

66. 大脑中动脉闭塞的脑梗死主要表现为

A. 球麻痹

B. 眩晕

C. 三偏征

D. 共济失调

E. 吞咽困难

67. 类风湿关节炎最早出现的关节表现为

- A. 畸形
- B. 晨僵
- C. 疼痛
- D. 肿胀
- E. 活动障碍

68. 下列不属于类风湿关节炎临床特点的是

- A. 早期小关节受累
- B. 可致关节畸形与功能障碍
- C. 女性多见
- D. 起病隐匿
- E. 80%发生于 60 岁以上老年人

69. 1 型糖尿病的临床表现是

- A. 对胰岛素不敏感
- B. 起病缓, 症状轻
- C. 肥胖者多见
- D. 中老年多见
- E. 明显的三多一少症状

70. 甲状腺功能亢进症患者, 由甲状腺素分泌过多而引起的临床表现是

- A. 眼裂增宽, 凝视
- B. 甲状腺肿大
- C. 怕热, 多汗, 多食善饥
- D. 畏寒
- E. 突眼

71. 急性白血病发生感染, 感染最常见的部位为

- A. 咽峡炎、口腔炎
- B. 泌尿道感染
- C. 皮肤感染
- D. 肺部感染
- E. 肛周炎

72. 治疗慢性再生障碍性贫血, 应首选

- A. 雄性激素
- B. 马利兰
- C. 叶酸
- D. 维生素 B<sub>12</sub>
- E. 硫酸亚铁

73. 下列药物中用铁剂治疗缺铁性贫血, 疗效表现最早的是

- A. 红细胞平均血红蛋白量增多
- B. 红细胞计数增多
- C. 血红蛋白增加
- D. 网织红细胞增加
- E. 红细胞体积增大

74. 肝癌最常见、最重要的症状与体征是

- A. 血性腹水
- B. 黄疸
- C. 食欲减退
- D. 进行性肝大及肝区痛
- E. 肝硬化表现

75. 肝硬化出血倾向的主要原因是

- A. 毛细血管脆性增加
- B. 肝解毒功能下降
- C. 维生素缺乏
- D. 血小板功能不良
- E. 凝血因子减少

76. 胃癌最常见, 最早的转移方式是

- A. 种植转移
- B. 上行转移
- C. 直接蔓延
- D. 淋巴转移
- E. 血行转移

77. 消化性溃疡最主要的症状是

- A. 呕血、黑粪
- B. 食欲减退
- C. 恶心、呕吐
- D. 暖气、反酸
- E. 上腹疼痛

78. 对诊断心肌梗死最有意义的是

- A. 血清碱性磷酸酶
- B. 肌酸磷酸激酶
- C. 淀粉酶
- D. 血清转氨酶
- E.  $\gamma$  谷氨酰基转肽酶

79. 6 分钟步行试验评价心功能的描述, 不正确的是

- A. 将心衰分为轻、中、重三度
- B. 可以评定慢性心衰患者的运动耐力
- C. 6 分钟步行距离 200m 属重度心衰
- D. 6 分钟步行距离 400m 属中度心衰
- E. 6 分钟步行距离 600m 属轻度心衰

80. 慢性左心衰竭的临床表现, 不正确的是

- A. 心源性哮喘
- B. 肝颈静脉反流征阳性
- C. 劳力性呼吸困难
- D. 夜间阵发性呼吸困难
- E. 反复咯血

81. 支气管哮喘呼吸困难的类型是

- A. 吸气性
- B. 呼气性

C. 混合性

D. 阵发性

E. 腹式呼吸消失

82. 肺心病心功能失代偿期多表现为

A. 全心衰竭

B. 肺水肿

C. 以右心衰竭为主

D. 低氧血症

E. 二氧化碳潴留

83. 下列哪项是慢性阻塞性肺疾病最主要的病因

A. 感染

B. 氧化应激

C. 吸烟

D. 职业粉尘

E. 空气污染

84. 慢性细菌性痢疾, 病程的时限为

A. 时限不定, 反复发作

B. 超过 2 周

C. 超过 1 年

D. 超过 6 个月

E. 超过 2 个月

85. 下列哪项不属于基因诊断和基因治疗的伦理原则

A. 尊重与平等的原则

B. 知情同意的原则

C. 以治疗为目的原则

D. 保护隐私原则

E. 利用基因进行胚胎克隆

86. 下列哪项不属于心理治疗的道德要求

A. 要有同情、帮助病人的诚意

B. 要关心病人, 加快患者的康复

C. 要保守病人的秘密、隐私

D. 要以健康、稳定的心理状态去影响和帮助病人

E. 要掌握和运用心理治疗的知识、技巧去开导病人

87. 医患关系的发展趋势不包括

A. 医患关系结构的“人机化”趋势

B. 医患关系调节方式上的“自动化”趋势

C. 医患关系调节方式上的“法制化”趋势

D. 医患要求的“多元化”趋势

E. 医患交往的“经济化”趋势

88. 以人具有的内在价值与外在价值的统一来衡量生命意义的一种理论是

A. 人道论

B. 美德论

C. 生命质量论

D. 生命价值论

E. 生命神圣论

89. 以下不属于医学模式类型的是

- A. 神灵主义医学模式
- B. 医药医学模式
- C. 生物医学模式
- D. 机械论医学模式
- E. 自然哲学医学模式

90. 以技术标准形式发布的与卫生相关的规范性文件称为

- A. 卫生法律
- B. 卫生标准
- C. 卫生规章
- D. 基本法律
- E. 行政法

91. 下列乙类传染病中, 应采取甲类传染病的预防和控制措施的是

- A. 肺结核
- B. 狂犬病
- C. 艾滋病
- D. 病毒性肝炎
- E. 传染性非典型肺炎

92. 下列情形的药品中按假药论处的是

- A. 超过有效期
- B. 未标明有效期或者更改有效期
- C. 国务院药品监督管理部门规定禁止使用
- D. 直接接触药品的包装材料和容器未经批准
- E. 擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料

93. 慢性细菌性痢疾, 病程的时限为

- A. 时限不定, 反复发作
- B. 超过 2 周
- C. 超过 1 年
- D. 超过 6 个月
- E. 超过 2 个月

94. 下列关于霍乱弧菌的叙述, 正确的是

- A. 古典生物型比埃尔托生物型的抵抗力强
- B. 革兰染色阴性, 有鞭毛, 运动极为活跃
- C. 产生的内毒素是重要的致病因子
- D. 革兰染色阳性, 有芽胞、荚膜和鞭毛
- E. 需氧, 耐酸不耐碱

95. 下列关于艾滋病高危人群的说法, 哪项是错误的

- A. 性工作者
- B. 血友患者
- C. 多次输血者
- D. 50 岁以上的人
- E. 同性恋

96. 下列哪像是感染 HBV 后最早出现的血清学标志



A. 抗-HBc

B. HBcAg

C. 抗-HBs

D. HBeAg

E. HBsAg

97. 乙脑主要的死因是

A. 高热抽搐

B. 意识障碍

C. 循环衰竭

D. 呼吸衰竭

E. 脑水肿

98. 与流行性脑脊髓膜炎患者密切接触后, 重要的预防措施为

A. 开窗通风

B. 隔离观察

C. 服用利福平

D. 注射青霉素

E. 菌苗预防注射

99. 不属于医院感染的是

A. 本次感染直接与上次住院有关

B. 由于创伤或非生物性因子刺激而产生的炎症表现

C. 新生儿在分娩过程中获得的感染

D. 医务人员在医院工作期间获得的感染

E. 由于诊疗措施激活的潜在性感染

100. 对长期发热的患者, 怀疑为伤寒, 诊断最可靠的依据是

A. 血培养阳性

B. 肥达反应阳性

C. 相对缓脉

D. 血嗜酸粒细胞消失

E. 玫瑰疹

101. 流行性出血热的临床五期经过顺序, 正确的是

A. 发热期、多尿期、低血压期、少尿期、恢复期

B. 发热期、低血压期、少尿期、多尿期、恢复期

C. 发热期、出血期、少尿期、多尿期、恢复期

D. 发热期、低血压期、多尿期、少尿期、恢复期

E. 发热期、出血期、低血压期、少尿期、恢复期

102. HIV 主要侵犯机体的系统为

A. 内分泌系统

B. 免疫系统

C. 神经系统

D. 呼吸系统

E. 循环系统

103. 有关 SARS 临床表现中进展期体征的叙述, 不正确的是

A. 多发生在病程的 8~14 天

B. 发热及感染中毒症状持续存在



- C. 肺部病变进行性加重
- D. 肺部阴影发展缓慢
- E. 少数患者可出现 ARDS

104. 禽流感病毒致病性最强的亚型是

- A. H7N7
- B. H5N1
- C. H7N5
- D. H9N2
- E. H3N2

105. 有关肺炎型流感的临床表现, 叙述不正确的是

- A. 多发生在 2 岁以下的小儿
- B. 发病后 24 小时内出现高热
- C. 应用抗菌药物无效
- D. 两肺可有呼吸音减低
- E. 肺实变体征

106. 下列哪项是流感的主要传染源

- A. 苍蝇
- B. 患者
- C. 蚊子
- D. 寄生虫
- E. 禽类

107. 流行性感动的叙述, 下列正确的是

- A. 儿童高发
- B. 夏秋季多见
- C. 潜伏期长
- D. 传播迅速
- E. 起病较缓

108. 感染 HBV 后最早出现的抗体是

- A. HBcAg
- B. 抗-HBc
- C. HBsAg
- D. 抗-HBe
- E. 抗-HBs

**B1 型题**

- A. 正胜邪退
- B. 邪去正虚
- C. 邪胜正衰
- D. 正虚邪恋
- E. 邪正相持

109. 邪气退却而正气大伤的病理状态为

110. 正气不能完全祛邪外出, 邪气可以稽留于一定的部位为

- A. 上
- B. 缓

C. 结

D. 乱

E. 消

111. 惊则气

112. 怒则气

A. 宣通鼻窍

B. 和中止呕

C. 利水消肿

D. 胜湿止痛

E. 消肿排脓

113. 防风与羌活均具有的功是

114. 麻黄与香薷均具有的功是

A. 相须

B. 相使

C. 相畏

D. 相杀

E. 相恶

115. 生姜与生南星配伍属于

116. 石膏与知母配伍属于

A. 猪苓

B. 佩兰

C. 苍术

D. 藿香

E. 茯苓

117. 最宜治湿浊中阻之呕吐的药物是

118. 具有燥湿健脾, 祛风散寒功效的药物是

A. 清热化痰, 理气止咳

B. 宣肺降气, 清热化痰

C. 疏肝行气, 活血止痛

D. 降气平喘, 祛痰止咳

E. 降气快膈, 化痰消食

119. 苏子降气汤的功用是

120. 柴胡疏肝散的功用是

A. 化痰止咳

B. 益阴敛营

C. 解肌发表

D. 化阳实卫

E. 缓峻护正

121. 麻黄汤中配伍炙甘草的主要用意是

122. 桂枝汤中配伍炙甘草的主要用意是

- A. 疏散风热, 清肺化痰
- B. 疏风清热, 宣肺止咳
- C. 温肺化痰, 止咳平喘
- D. 解表散寒, 温肺化饮
- E. 宣肺降气, 祛痰平喘



123. 小青龙汤的功用是

124. 桑菊饮的功用是

- A. 清营凉血
- B. 调和肝脾
- C. 行气活血
- D. 调畅营卫
- E. 开泄腠理



125. 属于消法范畴的是

126. 属于和法范畴的是

- A. 肝病、寒证
- B. 脾虚、湿证
- C. 肾虚、寒证
- D. 瘀血、水饮
- E. 寒证、失血证



127. 五色主病中, 黄色多见于

128. 五色主病中, 白色多见于

- A. 水轮
- B. 血轮
- C. 风轮
- D. 气轮
- E. 肉轮

129. 白睛属肺, 称为

130. 眼胞属脾, 称为

- A. 巅顶痛
- B. 全头重痛
- C. 后头部连项痛
- D. 前额部连眉棱骨痛
- E. 侧头部痛, 以两侧太阳穴为甚

131. 太阳经头痛的特点是

132. 少阳经头痛的特点是

- A. 库瓦济埃征阴性



- B. 板状腹
- C. 麦氏点压痛
- D. 墨菲征阳性
- E. 库瓦济埃征阳性

133. 胰头癌的体征为

134. 急性胆囊炎的体征为

- A. 直肠炎
- B. 直肠息肉
- C. 肛裂
- D. 直肠癌
- E. 直肠周围脓肿

135. 直肠触诊触及柔软光滑而有弹性的包块, 应考虑的是

136. 直肠触诊触及质地坚硬, 表面凸凹不平的包块, 应考虑的是

- A. 浊音
- B. 鼓音
- C. 清音
- D. 过清音
- E. 实音

137. 气胸患者病变部位的叩诊音是

138. 大量胸腔积液患者病变部位的叩诊音是

- A.  $10^4 \sim 10^5 / \text{ml}$
- B.  $\geq 10^5 / \text{ml}$
- C.  $10^3 \sim 10^4 / \text{ml}$
- D.  $< 10^3 / \text{ml}$
- E.  $< 10^4 / \text{ml}$

139. 确诊尿路感染, 尿细菌定量培养菌落计数每毫升是

140. 尿培养判断为尿液污染, 每毫升菌落数是

- A. 慢性病性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 再生障碍性贫血
- D. 铁粒幼细胞性贫血
- E. 珠蛋白生成障碍性贫血

141. 血清铁降低, 总铁结合力增高为

142. 血清铁降低, 总铁结合力降低为

- A. 贫血
- B. 晨僵
- C. 关节肿胀
- D. 类风湿结节
- E. 抗角蛋白抗体阳性

143. 提示类风湿关节炎处于活动期的表现是

144. 类风湿关节炎最多见的表现是

A. 半年

B. 1 年

C. 2 年

D. 3 年

E. 5 年

145. 具有高等学校医学专业本科以上学历, 需在执业医师指导下在医疗机构中试用期满几年方有资格参加执业医师考试

146. 取得执业助理医师执业证书后, 具有高等学校医学专科学历, 在医疗机构中工作满几年方可参加执业医师资格考试

A. 汉城病毒

B. 汉滩病毒

C. 普马拉病毒

D. 辛诺柏病毒

E. 希望山病毒

147. 汉坦病毒 I 型为

148. 汉坦病毒 II 型为

A. 空气

B. 水、食物

C. 蚊虫

D. 土壤

E. 母婴

149. SARS 的主要传播方式是

150. 流脑的传播途径是