

## 一、最佳选择题

### 1. 【正确答案】A

【答案解析】“证”是机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括，包括病变的部位、原因、性质，以及邪正关系，能够反映出疾病发展过程中某一阶段的病例变化的本质。A 为证，BCD 为症，E 为病。

### 2. 【正确答案】B

【答案解析】阴阳互用，即阴阳相互资生、相互促进的关系。阴阳在相互依存的基础上，还体现为相互资生、相互促进的过程。即所谓“阳根于阴，阴根于阳，无阳则阴无以生，无阴则阳无以化”。

### 3. 【正确答案】A

【答案解析】宗气的生理功能：上走息道以行呼吸，贯注心脉以行气血。故本题答案选 A

### 4. 【正确答案】E

【答案解析】冲脉，调节十二经气血，故称“十二经脉之海”。

本题知识点：奇经八脉、经络的生理功能，

【答疑编号 101422574, 点击提问】

### 5. 【正确答案】E

【答案解析】具有偏阴质体质类型的人，对寒、湿等阴邪具有易感性，受邪发病后多表现为寒证、虚证；容易发生湿滞、水肿、痰饮、瘀血等病症。在用药上宜温，忌用苦寒。

### 6. 【正确答案】C

【答案解析】惊则气乱：是指突然受惊，以致心无所倚，神无所归，虑无所定。表现为精神不安，惊慌失措，或遇事犹豫不决等。

### 7. 【正确答案】D

【答案解析】寒热辨证是辨别疾病性质的纲领。

### 8. 【正确答案】E

【答案解析】通因通用：是以通治通，即用通利的药物治疗具有实性通泄症状的真实假虚证。所以只有 E 才是最佳答案。

此题解题切入点：通因通用适用于实证的治疗，而 ABCD 是虚证，所以 E 项为正确答案。

9. 【正确答案】C

【答案解析】风热感冒应采取的治疗方法是：清热宣肺解表。

10. 【正确答案】A

【答案解析】风热犯肺

[症状]咳嗽气粗，咯痰黏稠，色白或黄，咽痛，声音嘶哑，或兼发热，微恶风，口微渴。舌边尖红，苔薄白或微黄，脉浮数。

[治法]辛凉解表，宣肺清热。

[方剂应用]桑菊饮（桑叶、杏仁、芦根、菊花、栀子、连翘、薄荷、桔梗）加减。

[中成药选用]蛇胆川贝枇杷膏、急支糖浆、桑菊感冒片（合剂）。

11. 【正确答案】B

【答案解析】脾胃虚寒的症状有：胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，泛吐清水，纳差，神疲乏力，甚则手足不温，大便溏薄。舌淡苔白，脉虚弱或迟缓。

12. 【正确答案】B

【答案解析】阴暑

[症状]发热恶寒，无汗，身重疼痛，神疲倦怠。舌质淡，苔薄黄，脉弦细。

[治法]解表散寒，祛暑化湿。

[方剂应用]香薷饮（香薷，厚朴，白扁豆）加减。

[中成药选用]藿香正气软胶囊（藿香正气水），十滴水。

13. 【正确答案】A

【答案解析】气虚虚劳

[症状]神疲乏力，少气懒言，声音低微，头晕，自汗，不思饮食，活动后诸症加重。舌质淡，或有齿痕，苔薄白，脉虚无力。

[治法]益气补虚。

[方剂应用]四君子汤（人参、白术、茯苓、炙甘草）加减。[中成药选用]四君子丸、玉屏风颗粒、补中益气丸、参芪口服液。

14. 【正确答案】B

【答案解析】本题干中描述的是“内痔”的症状内痔。题干信息是肠风下血引起的内痔。

肠风下血

[症状]大便带血，滴血或喷射状出血，血色鲜红，或有肛门瘙痒。舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数。

[治法]清热凉血祛风。

[方剂应用]凉血地黄汤（细生地、当归尾、地榆、槐角、黄连、天花粉、升麻、赤芍，枳壳、黄芩、荆芥）加减。

[中成药选用]槐角丸。

15. 【正确答案】D

【答案解析】本题中患者的症状是肝郁引起的月经先后无定期。

肝郁

[症状]经行或先或后，经量或多或少，色紫红有块，血行不畅，胸胁、乳房、少腹胀痛，情志不舒，心烦易怒，暖气食少，时欲叹息。舌质淡红，苔薄，脉弦。

[治法]疏肝解郁，和血调经。

[方剂应用]逍遥散（当归、白芍、柴胡、白术、茯苓、炙甘草、薄荷、生姜）加减。

[中成药选用]逍遥丸、妇科得生片、妇科调经片。

16. 【正确答案】C

【答案解析】脾虚夹积

[症状]面色萎黄，形体消瘦，神疲肢倦，不思乳食，腹满喜按，大便稀溏腥臭，夹乳片或不消化食物残渣。舌质淡，苔白腻，脉濡细而滑，或指纹淡滞。

[治法]健脾助运，消食化滞。

[方剂应用]健脾丸（人参，白术，陈皮，麦芽，山楂，神曲，枳实）加减。

[中成药选用]健胃消食片、健脾丸、开胃健脾丸。

17. 【正确答案】D

【答案解析】志嘎汗散，由冰片、天竺黄、红花等 13 味药制成。功能清热解毒，消炎。用于小儿流感、脑炎等。

18. 【正确答案】B

【答案解析】密杂吉学说包括 8 种正常气质（热、湿、寒、干、干热、湿热、湿寒，干寒）和 8 种异常气质。

19. 【正确答案】C

【答案解析】血红蛋白常被称为“血色素”，是组成红细胞的主要成分，承担着机体向器官组织运输氧气和运出二氧化碳的功能。其增减的临床意义基本上与红细胞增减的意义相同，但血红蛋白功能更好地反映贫血的程度。

男性 120~160g/L;

女性 110-150g/L;

新生儿 180~190g/L。

20. 【正确答案】E

【答案解析】HBcAg 与抗-HBc：HBcAg 主要存在于受感染的肝细胞内，血液中游离的 HBcAg 极少，故较少用于临床常规检测。抗-HBc 不是中和抗体，而是反映肝细胞受到 HBV 侵害的可靠指标，主要有 IgM 和 IgG 两型：抗 HBc-IgM 是机体感染 HBV 后在血液中最先出现的特异性抗体，故常作为急性 HBV 感染的指标；抗 HBc-IgG 出现较晚，其阳性可持续多年，甚至终身，具有流行病学意义。

21. 【正确答案】C

【答案解析】当发生严重不良反应时，执业药师首先的应对措施就是与会同临床处置不良反应。

22. 【正确答案】D

【答案解析】在审方中必须注意以下几点。

1. 认真审查处方各项内容，包括处方前记、正文、后记是否清晰完整，并确认处方的合法性，对不规范处方或不能判定其合法性的处方不得调剂。对老年、妊娠期、儿童、肝肾功能异常等特殊人群的用药适宜性进行重点审核，如发现问题，应向处方医生或患者核对。

2. 药师审核处方后，认为存在用药不适宜时，如有妊娠禁忌、配伍禁忌、超剂量用药、超时间用药、服用方法有误、毒麻药使用违反规定等，应当告知处方医师，请其确认或者重新开具处方。

3. 药师发现严重不合理用药或者用药错误，应当拒绝调剂，及时告知处方医师，并应当记录，按照有关规定报告。

4. 处方一般以当日有效，特殊情况下需延长有效期的，由开具处方的医师注明有效期，但最长不得超过 3 天。

5. 药师不应擅自涂改医师处方所列的药味、剂量、处方旁注等。

23. 【正确答案】A

【答案解析】拳参的别名是紫参。

24. 【正确答案】A

【答案解析】马钱子的别名又叫“番木鳖”。

25. 【正确答案】C

【答案解析】海螵蛸：乌贼骨。

26. 【正确答案】E

【答案解析】十九畏列述了九组十九味相反药，具体是：硫黄畏朴硝（包括芒硝、玄明粉），水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆（包括巴豆霜）畏牵牛子（包括黑丑、白丑），丁香（包括母丁香）畏郁金，川乌（包括附子）、草乌畏犀角，芒硝（包括玄明粉）畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂。

27. 【正确答案】A

【答案解析】属于配伍禁忌的药物，不能装于一斗或上下药斗中。如甘草与京大戟、甘遂、芫花；藜芦与丹参、南沙参、玄参、苦参、白芍、赤芍、细辛；乌头类（附子、川乌及草乌）与半夏的各种炮制品、瓜蒌（瓜蒌皮、瓜蒌子、瓜蒌仁及天花粉）；丁香（包括母丁香）与郁金（黄郁金、黑郁金）；芒硝（包括玄明粉）与荆三棱；肉桂（官桂）与石脂（赤石脂）均不宜放在一起。

28. 【正确答案】A

【答案解析】一些果实种子类中药，由于外壳坚硬，其成分不易煎出。为此这类药需要“用时捣碎”，例如有：牛蒡子、瓜蒌子、芥子、决明子、豆蔻、苦杏仁、萆薢等。故本题答案选 A。

29. 【正确答案】A

【答案解析】生千金子的内服量为 1~2g。

30. 【正确答案】B

【答案解析】有些蜜炙饮片，如炙甘草、炙黄芪、炙枇杷叶等，特别容易吸湿粘连，吸湿后饮片表面也容易霉变。

31. 【正确答案】C

【答案解析】生石灰块，又名氧化钙，具有取材和使用方便，成本低，吸湿率高等特点，其吸潮率可达 20%~25%，是传统养护方法中一种主要的吸潮剂。

32. 【正确答案】C

【答案解析】本题考查合理用药的原则。

在合理用药的基本原则中，安全的意义首先是指应考虑所用药物是否安全，是否会对患者造成不良反应。

33. 【正确答案】B

【答案解析】麻黄与青霉素联用，治疗细菌性肺炎，有协同增效作用。

34. 【正确答案】B

【答案解析】黄连、黄柏与四环素、呋喃唑酮、磺胺脒联用，可增强治疗菌痢的效果。

35. 【正确答案】B

【答案解析】茵陈蒿及含茵陈蒿的复方与灰黄霉素联用，可增强疗效，这是因为茵陈蒿所含的羟基苯丁酮能促进胆汁的分泌，而胆汁能增加灰黄霉素的溶解度，促进其吸收，从而增强灰黄霉素的抗菌作用。

36. 【正确答案】D

【答案解析】维 C 银翘片为中西药复方制剂，本品含马来酸氯苯那敏、对乙酰氨基酚、维生素 C。对本品所含成分过敏者禁用，过敏体质者慎用。

37. 【正确答案】E

【答案解析】老年人肝肾功能多有不同程度的减退或合并多器官严重疾病。因此，用药要因人而异，一般应从“最小剂量”开始。

38. 【正确答案】B

【答案解析】萜类在自然界分布广泛，种类繁多，不少萜类化合物对肝脏有明显毒副作用，但肝损伤机制还不甚明了。包括有川楝子、黄药子、艾叶等，其中川楝子是含萜类肝脏毒性中药中最典型的一类物质，能引起急性中毒性肝炎，出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大。

39. 【正确答案】E

【答案解析】马钱子含番木鳖碱即士的宁，毒性大。成人服用 5~10mg 即可中毒，一次服用 30mg 即可致死。首先兴奋中枢神经系统，引起脊髓强直性痉挛，继而兴奋呼吸中枢及血管运动中枢。

40. 【正确答案】A

【答案解析】苍耳子有小毒，生品对肝脏有损害，需炒黄去刺用，炒后可使其有毒的植物蛋白变性凝固。

## 二、配伍选择题

[41~42]

41. 【正确答案】D

【答案解析】若阳虚不能制阴而造成阴盛者，属虚寒证，不宜用辛温发散药以散阴寒，须用“益火之源，以消阴翳”即扶阳益火之法，以消退阴盛。这种治疗原则也称为“阴病治阳”。

42. 【正确答案】E

【答案解析】阴虚不能制阳而致阳亢者，属虚热证，一般不能用寒凉药直折其热，须用“壮水之主，以制阳光”即用滋阴壮水之法，以抑制阳亢火盛。这种治疗原则亦称为“阳病治阴”。

[43~44]

43. 【正确答案】D

【答案解析】脾为生痰之源。

44. 【正确答案】A

【答案解析】肺为贮痰之器。

[45~46]

45. 【正确答案】D

【答案解析】若神识昏糊，胡言乱语，声高有力的，是谵语，常见于热扰心神的实证。

46. 【正确答案】E

【答案解析】神志不清，语言重复，时断时续，声音低弱的，是郑声，属于心气大伤，精神散乱的虚证。

[47~49]

47. 【正确答案】C

【答案解析】阴虚潮热：每当午后或入夜即发热，属于“阴虚生内热”，且以五心烦热为特征，甚至有热自深层向外透发的感觉，故又称“骨蒸潮热”。常兼见盗汗、颧赤、口咽干燥、舌红少津等症。

48. 【正确答案】A

【答案解析】阳明潮热：是由于胃肠燥热内结所致，因其常于日晡阳明旺时而热甚，故又称“日晡潮热”，常兼见腹满痛拒按，大便燥结，手足汗出，舌苔黄燥、甚则生芒刺等症。

49. 【正确答案】E

【答案解析】湿温潮热：以午后热甚，身热不扬为特征。其病多在脾胃，因湿遏热伏，热难透达，所以身热不扬，初扪之不觉很热，扪之稍久则觉灼手。多伴有胸闷呕恶、头身困重、大便溏薄、苔腻等症。

[50~52]

50. 【正确答案】D

【答案解析】齿根外露者，多属肾虚或虚火上炎。

51. 【正确答案】A

【答案解析】龈色淡白者，多是血虚不荣。

52. 【正确答案】E

【答案解析】龈色红肿者，多属胃火上炎。牙龈出血而红肿者，为胃火伤络。

[53~56]

53. 【正确答案】C

【答案解析】阴虚燥热

[症状]烦渴引饮，消谷善饥，小便频数而多，尿浑而黄，形体消瘦，舌红苔薄黄，脉滑数。

[治法]养阴润燥。

[方剂应用]玉女煎（石膏，熟地，麦冬，知母，牛膝）加减。

[中成药选用]消渴平片（主治阴虚燥热、气阴两虚证）、清胃黄连丸合六味地黄丸。



54. 【正确答案】A

【答案解析】脾胃气虚

[症状]口渴引饮，能食与便溏并见，或饮食减少，精神不振，四肢乏力。舌淡，苔薄白而干，脉细弱无力。

[治法]健脾益气。

[方剂应用]参苓白术散（人参，白术，茯苓，桔梗，山药，甘草，白扁豆，莲子肉，砂仁，薏苡仁）加减。

[中成药选用]参苓白术散、人参健脾丸。

55. 【正确答案】B

【答案解析】肾阴亏虚

[症状]尿频量多，浊如膏脂，腰酸膝软，头晕耳鸣，多梦遗精，乏力肤燥。舌红少苔，脉细数。

[治法]滋养肾阴。

[方剂应用]杞菊地黄丸（枸杞子，白菊花，地黄，山茱萸，泽泻，茯苓，山药，丹皮）加减。

[中成药选用]杞菊地黄丸、六味地黄丸、左归丸。

56. 【正确答案】E

【答案解析】阴阳两虚

[症状]小便频数，甚则饮一溲一，咽干舌燥，面容憔悴，耳轮干枯，腰膝酸软，畏寒肢冷。舌淡苔白乏津，脉沉细无力。

[治法]温阳滋肾。

[方剂应用]金匮肾气丸（附子，肉桂，熟地，山茱萸，泽泻，茯苓，丹皮，山药）加减。

[中成药选用]生力胶囊、强肾片。

[57~58]

57. 【正确答案】E

【答案解析】阳虚内寒

[症状]经期或经后小腹冷痛，得热痛减，经量少，经色黯淡，畏寒肢冷，腰腿酸软，小便清长。舌苔白润，脉沉。

[治法]助阳暖宫，温经止痛。

[方剂应用]温经汤（吴茱萸、阿胶、牡丹皮、生姜、当归、川芎、人参、芍药、桂枝、甘草、半夏、麦冬）加减。

[中成药选用]艾附暖宫丸、痛经宝颗粒、痛经丸等。

58. 【正确答案】D

【答案解析】气滞血瘀

[症状]经前或经期，小腹胀痛拒按，经血量少，经行不畅，经色紫黯有块，块下痛减，胸胁、乳房作胀。舌紫黯或有瘀点，脉弦涩。

[治法]理气活血，化瘀止痛。

[方剂应用]膈下逐瘀汤（当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、丹皮、乌药、香附、甘草）加减。

[中成药选用]调经丸、调经活血片、元胡止痛片、益母丸等。

[59~61]

59. 【正确答案】C

【答案解析】关键词是“游走不定”，说明是风邪引起的行痹，可选用的方剂是防风汤。

60. 【正确答案】A

【答案解析】关键词是“遇寒痛增”，说明是寒邪引起的痛痹，可选用的方剂是乌头汤。

61. 【正确答案】E

【答案解析】关键词是“重着”，湿邪的特点是“湿性重浊”，故该症状是湿邪引起的着痹，可选用的方剂是薏苡仁汤。

[62~63]

62. 【正确答案】B

【答案解析】月经后期的原因主要有：肾虚血少，气滞血瘀。

月经后期

(1) 肾虚血少

[症状]经期错后，量少色淡，经质清稀，腰膝酸软，头晕耳鸣，带下清稀，面色晦暗，或面部暗斑。舌淡暗，苔薄白，脉沉细无力。

[治法] 补肾益气，养血调经。

[方剂应用] 归肾丸合四物汤（熟地黄、枸杞子、山茱萸、菟丝子、茯苓、当归、山药、杜仲、川芎、白芍）加减。

[中成药选用] 乌鸡白凤丸（胶囊、片）、归芍地黄丸、春血安胶囊。

## （2）气滞血瘀

[症状] 经期延后，经量偏少，经色黯红，或有血块，小腹胀痛，精神抑郁，胸闷不舒。舌苔正常，脉弦。

[治法] 活血行气，化瘀止痛。

[方剂应用] 膈下逐瘀汤（当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、丹皮、乌药、香附、甘草）加减。

[中成药选用] 调经丸、益母丸、调经活血片。

## 63. 【正确答案】E

【答案解析】若周期提前八、九天以上者，为月经先期，多因肾气虚、肝经郁热。若周期错后八、九天以上者，为月经后期，多因肾虚血少、气滞血瘀。

### 月经先期

#### （1）肾气虚

[症状] 月经提前，量少，色淡质稀，腰酸腿软，头晕耳鸣，小便频数。舌淡黯，苔薄白，脉沉细而弱。

[治法] 补肾益气，固冲调经。

[方剂应用] 固阴煎（人参、熟地、山药、山茱萸、远志、炙甘草、五味子、菟丝子）加减。

[中成药选用] 固经丸。

#### （2）肝经郁热

[症状] 经期提前，量多或少，经色紫红，质稠有块，经前乳房、胸胁、少腹胀痛，烦躁易怒，口苦咽干，喜叹息。舌红，苔黄，脉弦数。

[治法] 疏肝解郁，清热调经。

[方剂应用] 丹栀逍遥散（丹皮、炒山栀、当归、白芍、柴胡、白术、茯苓、煨姜、薄荷、炙甘草）加减。

[中成药选用] 加味逍遥丸（口服液）。

[64~66]

64. 【正确答案】E

【答案解析】牙硝难合荆三棱。芒硝（包括玄明粉）畏三棱

65. 【正确答案】A

【答案解析】丁香莫与郁金见。丁香（包括母丁香）畏郁金

66. 【正确答案】C

【答案解析】藻戟荒遂俱战草。甘草反海藻、京大戟、荒花、甘遂。

[67~68]

67. 【正确答案】E

【答案解析】处方直接写药名（或制），需调配炮制品，如草乌（水制）、川乌（水制）、天南星（矾制）、附子（炮制）、吴茱萸（甘草水制）、远志（甘草水制去心）、厚朴（姜制）、何首乌等。

68. 【正确答案】B

【答案解析】处方直接写药名（或炒或炙），需调配蜜炙品，如枇杷叶、马兜铃等。

[69~70]

69. 【正确答案】A

【答案解析】六味地黄丸、大补阴丸等可以用淡盐水送服，它可引药入肾，增强滋阴补肾的作用。

70. 【正确答案】C

【答案解析】更衣丸、消渴丸、四神丸等，以米汤送服可起协调作用。

[71~74]

71. 【正确答案】E

【答案解析】生甘遂的内服用量是 0.5-1.5g。

72. 【正确答案】C

【答案解析】洋金花的内服用量是 0.3-0.6g。

73. 【正确答案】A

【答案解析】斑蝥的内服用量是 0.03-0.06g。

74. 【正确答案】B

【答案解析】雄黄的内服用量是 0.05-0.1g。

[75~79]

75. 【正确答案】B

【答案解析】人参与细辛同贮。

76. 【正确答案】D

【答案解析】冰片与灯心草同贮。

77. 【正确答案】C

【答案解析】蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮。

78. 【正确答案】A

【答案解析】硼砂与绿豆同贮。

79. 【正确答案】E

【答案解析】牡丹皮与泽泻、山药同贮。

[80~81]

80. 【正确答案】E

【答案解析】利胆中成药利胆排石片、胆乐胶囊、胆宁片等都含有郁金，若与六应丸、苏合香丸、妙济丸、纯阳正气丸、紫雪散等含丁香（母丁香）的中成药同时使用，就要注意具“十九畏”药物的禁忌。

81. 【正确答案】D

【答案解析】治疗风寒湿痹证的大活络丸、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造丸等均含有附子，而止咳化痰的川贝枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸等分别含有川贝、半夏，依据配伍禁忌原则，若将上述两组合用，附子、乌头与川贝、半夏当属相反禁忌同用之列。

[82~84]

82. 【正确答案】C

【答案解析】柴胡桂枝汤等具有抗癫痫作用的中药复方与西药抗癫痫药联用，可减少抗癫痫药的用量及肝损害、嗜睡等副作用。

83. 【正确答案】D

【答案解析】六君子汤等与抗震颤麻痹药联用，可减轻其胃肠道副作用，但也可能影响其吸收、代谢和排泄。

84. 【正确答案】E

【答案解析】芍药甘草汤等与解痉药联用，在提高疗效的同时，还能消除腹胀、便秘等副作用。

[85~88]

85. 【正确答案】B

【答案解析】平时易感冒、多汗，属于气虚的儿童，可服用补气固表的黄芪、太子参、白术等。

86. 【正确答案】E

【答案解析】面色苍白、神疲乏力、夜寐不安、舌质淡，属于气血两虚的儿童，可给予益气养血的黄芪、党参、当归、黄精、首乌、大枣等。

87. 【正确答案】A

【答案解析】有些儿童生长发育迟缓。尿频，面色苍白，舌胖，属于肾虚，宜用补肾的补骨脂、菟丝子、肉苁蓉、熟地等。

88. 【正确答案】D

【答案解析】消瘦、面色萎黄、厌食、大便溏稀，属于脾虚，可选用健脾和胃消食的山药、茯苓、白术、白扁豆、稻芽等

[89~90]

89. 【正确答案】B

【答案解析】含乌头类药物的中成药：追风丸、追风透骨丸、大活络丸、小活络丸、三七伤药片、附子理中丸、金匱肾气丸、木瓜丸、小金丸、风湿骨痛胶囊、祛风止痛片、祛风舒筋丸、正天丸、右归丸等。

中毒原因

- (1) 过量服用为主要原因。
- (2) 用法不当，如煎煮时间太短或生用。
- (3) 泡酒服用。
- (4) 个体差异引起蓄积性中毒。

90. 【正确答案】D

【答案解析】含马钱子的中成药 九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片等。

中毒原因

- (1) 误服或服用过量。
- (2) 服用炮制不当的马钱子。

### 三、综合分析选择题

[91~94]

91. 【正确答案】C

【答案解析】乳癖是乳房部的慢性良性肿块，以乳房肿块和胀痛为主症，常见于中青年妇女，乳房肿块大小不等，形态不一，边界不清，推之活动。

92. 【正确答案】A

【答案解析】肝郁痰凝

[症状]多见于青壮年妇女，单侧或双侧乳房出现肿块，或月经前增大，乳房胀痛或溢乳，乳房肿块随喜怒消长，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。舌苔薄黄，脉弦滑。

[治法]疏肝理气，化痰消坚。

[方剂应用]逍遥蒺贝散加减（当归，白芍，茯苓，白术，瓜蒌，贝母，半夏，南星，生牡蛎，山慈菇）加减。

[中成药选用]乳核散结片、乳疾灵胶囊、乳癖消片（胶囊、颗粒）合加味逍遥丸。

93. 【正确答案】E

【答案解析】肝郁痰凝

[症状]多见于青壮年妇女，单侧或双侧乳房出现肿块，或月经前增大，乳房胀痛或溢乳，乳房肿块随喜怒消长，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。舌苔薄黄，脉弦滑。

[治法]疏肝理气，化痰消坚。

[方剂应用]逍遥蒺贝散加减（当归，白芍，茯苓，白术，瓜蒌，贝母，半夏，南星，生牡蛎，山慈菇）加减。

[中成药选用]乳核散结片、乳疾灵胶囊、乳癖消片（胶囊、颗粒）合加味逍遥丸。

94. 【正确答案】D

**【答案解析】肝郁痰凝**

[症状]多见于青壮年妇女，单侧或双侧乳房出现肿块，或月经前增大，乳房胀痛或溢乳，乳房肿块随喜怒消长，伴有胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。舌苔薄黄，脉弦滑。

[治法]疏肝理气，化痰消坚。

[方剂应用]逍遥蒺贝散加减（当归，白芍，茯苓，白术，瓜蒌，贝母，半夏，南星，生牡蛎，山慈菇）加减。

[中成药选用]乳核散结片、乳疾灵胶囊、乳癖消片（胶囊、颗粒）合加味道遥丸。

[95~98]

95. **【正确答案】D**

**【答案解析】**从患者的症状上判断，患者属于鼻渊。

96. **【正确答案】E**

**【答案解析】**从患者的症状上判断，患者属于风热蕴肺导致的鼻渊，可见鼻塞，涕黄稠而量多，嗅觉差，鼻黏膜红肿，可伴头痛，发热，汗出，胸闷，咳嗽，痰多。舌红苔黄，脉浮数。

97. **【正确答案】E**

**【答案解析】**对于风热蕴肺导致的鼻渊，应采取祛风清热宣窍的治法。

98. **【正确答案】B**

**【答案解析】**对于风热蕴肺导致的鼻渊，应选取泻白散合辛夷清肺饮治疗。

风热蕴肺

[症状]鼻塞，涕黄稠而量多，嗅觉差，鼻黏膜红肿，可伴头痛，发热，汗出，胸闷，咳嗽，痰多。舌红苔黄，脉浮数。

[治法]祛风清热宣窍。

[方剂应用]泻白散合辛夷清肺饮（桑白皮，地骨皮，粳米，甘草，辛夷花，石膏，知母，山梔，黄芩，枇杷叶，升麻，百合，麦冬）加减。

[中成药的选用]辛芳鼻炎胶囊、鼻炎通喷雾剂、辛芳鼻炎丸（主治风热上攻、热毒蕴肺证）、鼻炎片、鼻窦炎口服液（主治风热犯肺、湿热内蕴证）。

[99~100]



99. 【正确答案】B

【答案解析】风热感冒的症状如下：身热较著，微恶风，头胀痛，或咳嗽少痰，或痰出不爽，咽痛咽红，口渴。舌边尖红，苔薄白或微黄，脉浮数。

100. 【正确答案】A

【答案解析】风热感冒

[症状]身热较著，微恶风，头胀痛，或咳嗽少痰，或痰出不爽，咽痛咽红，口渴。舌边尖红，苔薄白或微黄，脉浮数。

[治法]清热宣肺解表。

[方剂应用]银翘散（金银花、连翘、竹叶、荆芥、牛蒡子、薄荷、桔梗、淡豆豉、甘草）加减。

[中成药选用]银翘解毒丸（片）、复方金黄连颗粒、桑菊感冒片、双黄连口服液。

[101~102]

101. 【正确答案】D

【答案解析】从症状判断该患者属于痰瘀痹阻导致的胸痹，治疗可采取豁痰化瘀之法。

102. 【正确答案】E

【答案解析】治疗痰瘀痹阻导致的胸痹可运用瓜蒌薤白半夏汤合丹参饮（瓜蒌，薤白，半夏，白酒，丹参，檀香，砂仁）加减。

[103~106]

103. 【正确答案】D

【答案解析】含麻黄的中成药忌与降血压的中成药如复方罗布麻片、降压片、珍菊降压片、牛黄降压丸等并用；也忌与扩张冠脉的中成药如速效救心丸、山海丹、活心丹、心宝丸、益心丸、滋心阴液、补心气液等联用。因麻黄中麻黄碱的化学结构与肾上腺素相似，能直接与肾上腺素受体结合，同时还能促使肾上腺素能神经末梢释放介质，从而使血管收缩、血压升高。

104. 【正确答案】A

【答案解析】珍菊降压片所含的西药组分是盐酸可乐定和氢氯噻嗪

105. 【正确答案】B

【答案解析】珍菊降压片成分为珍珠层粉、野菊花、槐花米、盐酸可乐定、氢氯噻嗪（双氢克尿噻），有较好的降压及改善症状的作用。若以常用量每次 1 片，每日 3 次计，盐酸可乐定比单用剂量减少 60%。

106. 【正确答案】E

【答案解析】麻黄的中成药忌与降血压的中成药如复方罗布麻片、降压片、珍菊降压片、牛黄降压丸等并用；也忌与扩张冠脉的中成药如速效救心丸、山海丹、活心丹、心宝丸、益心丸、滋心阴液、补心气液等联用。因麻黄中麻黄碱的化学结构与肾上腺素相似，能直接与肾上腺素受体结合，同时还能促使肾上腺素能神经末梢释放介质，从而使血管收缩、血压升高。

[107~110]

107. 【正确答案】A

【答案解析】平时易感冒、多汗，属于气虚的儿童，可服用补气固表的黄芪、太子参、白术等。故本题答案选 A。

108. 【正确答案】D

【答案解析】小儿消瘦、面色萎黄、厌食、大便溏稀，属于脾虚，可选用健脾和胃消食的山药、茯苓、白术、白扁豆、稻芽等。故本题答案选 D。

109. 【正确答案】C

【答案解析】老人慎泻，小儿慎补，所以 C 项说法错误，故本题答案选 C。

110. 【正确答案】C

【答案解析】对于体虚夹湿热，而有口臭、便秘、舌苔黄腻的患儿应先用清热除湿的藿香、黄芩、黄连、薏苡仁、陈皮等，使热清湿化，然后再服调补中药。所以 C 项说法错误，故本题答案选 C。

#### 四、多项选择题

111. 【正确答案】BCD

【答案解析】根据相克关系来确定治则治法

治则：“抑强扶弱”，即泻其克者之强，补其被克者之弱，多用于因为相克关系紊乱而导致的乘侮病证。治法：抑木扶土法、培土制水法、佐金平木法、泻南补北法。

112. 【正确答案】ADE

【答案解析】 本题考查对五行属性特点的掌握。

“土爰稼穡”，引申为凡是具有生化、承载、受纳作用的事物，其属性均可归纳为“土”。

113. 【正确答案】 AB

【答案解析】 痰热郁肺

[症状] 喘咳气涌，胸部胀痛，痰稠黏色黄，或夹血痰，伴胸中烦闷，身热，有汗，口渴喜冷饮，咽干，面红，尿赤，便秘。舌质红，苔薄黄腻，脉滑数。

[治法] 清热化痰，宣肺止咳。

[方剂应用] 桑白皮汤（桑白皮、半夏、苏子、杏仁、贝母、黄芩、黄连、山栀子）加减。

[中成药选用] 清肺化痰丸、清肺消炎丸。

114. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 肝胃郁热型胃痛可选用的中成药有：加味左金丸、左金丸、胃逆康胶囊。

115. 【正确答案】 ACDE

【答案解析】 某些药物的相互作用问题 含麻黄的中成药忌与降压药的中成药如复方罗布麻片、降压片、珍菊降压片、牛黄降压丸等并用；也忌与扩张冠脉的中成药如速效救心丸、山海丹、活心丹、心宝丸、益心丸、滋心阴液、补心气液等联用。因麻黄中麻黄碱的化学结构与肾上腺素相似，能直接与肾上腺素受体结合，同时还能促使肾上腺素能神经末梢释放介质，从而使血管收缩、血压升高；另一方面，又能兴奋心脏，增强心肌收缩力，使心肌耗氧量增加。若同时并用，可产生拮抗作用。

116. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 维 C 银翘片中含有的西药成分包括对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、维生素 C。

117. 【正确答案】 ABDE

【答案解析】 婴幼儿患者合理应用中药的原则主要有以下几点：

① 用药及时，用量宜轻；

② 宜用轻清之品；

③宜佐健脾和胃之品；

④宜佐凉肝定惊之品；

⑤不宜滥用滋补之品。

118. 【正确答案】ABCDE

【答案解析】引起中药不良反应发生的因素包括：

(1) 药物和使用因素。

(2) 机体因素。

(3) 病理因素。

其中，药物和使用因素涉及：品种混乱、炮制不当、剂量过大、疗程过长、辨证不准、配伍失度。

119. 【正确答案】AE

【答案解析】老年慢性支气管炎日久会出现肺阴虚象，宜用西洋参、沙参等，益气养阴清热，若用红参，偏于甘温，反而使余邪复燃，病情加重。

120. 【正确答案】AB

【答案解析】含对乙酰氨基酚成分中成药的使用注意对乙酰氨基酚也称扑热息痛，是乙酰苯胺类解热镇痛药，可用于感冒或其他原因引起的高热和缓解轻中度疼痛，一般剂量较少引起不良反应。长期大量使用对乙酰氨基酚，尤其是肾功能低下时，可出现肾绞痛或急性肾衰竭、少尿、尿毒症。若与肝药酶诱导剂尤其是巴比妥类并用时，发生肝脏毒性反应的危险增加。肝肾功能不全的患者应慎用，有增加肝脏、肾脏毒性的危险。服用超量可出现恶心、呕吐、胃痛、胃痉挛、腹泻、多汗等症状。有不少中成药含有对乙酰氨基酚，若在治疗感冒发热使用这类中成药时再服用对乙酰氨基酚制剂，则使对乙酰氨基酚的剂量过大，增加药物的不良反应。