

2019 年中西医执业医师-模拟试题（第四单元）

一、A1 型题

1. 下列镇痛方法中，属于椎管内镇痛的是

- A. 口服给药镇痛
- B. 硬膜外腔镇痛
- C. 肌肉注射镇痛
- D. 静脉注射镇痛
- E. 其他途径镇痛

【正确答案】B

【答案解析】椎管内镇痛方法包括：蛛网膜下腔镇痛与硬膜外腔镇痛。

2. 下列各项中，不属于肺癌按组织学分类的是

- A. 腺癌
- B. 大细胞癌
- C. 鳞状细胞癌
- D. 中央型肺癌
- E. 小细胞肺癌

【正确答案】D

【答案解析】肺癌根据组织学分类，分为非小细胞肺癌（鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌）和小细胞肺癌。其中，小细胞肺癌恶性程度高，生长快，较早出现淋巴和血行转移，对放射和化学疗法虽比较敏感，但在各型肺癌中预后最差。中央型肺癌是属于肺癌按肿瘤发生的部位分类。

3. 具有痛、呕、胀、闭的表现的是

- A. 胆石病
- B. 急性阑尾炎
- C. 典型肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性胆道感染

【正确答案】C

【答案解析】典型的肠梗阻具有痛、呕、胀、闭四大症状。

4. 下列关于门静脉高压症的叙述不正确的是

- A. 需要做肝活检
- B. 碱性磷酸酶和谷氨酸转肽酶显著升高
- C. 血浆蛋白降低而球蛋白增高，白蛋白/球蛋白倒置
- D. 凝血酶原时间延长
- E. 门静脉高压性腹水一般为渗出液

【正确答案】E

【答案解析】门静脉高压性腹水一般为漏出液。

5. 胃、十二指肠溃疡大出血气阴两虚证选用的治法为

- A. 温中健脾，和胃降逆
- B. 涤痰化浊，和胃降逆
- C. 清泻胃热，和中降逆
- D. 益气生津，降逆止呕
- E. 法瘀软坚，兼调脾胃

【正确答案】D

【答案解析】气阴两虚证。证候：病程日久，反复呕吐，形体消瘦，神疲乏力，唇干口燥，小便短少，大便干结；舌红少津，脉细数。治法：益气生津，降逆止呕。方药：麦门冬汤加减。

6. 腹股沟斜疝与直疝的区别叙述正确的是

- A. 斜疝多见于老年体弱者，直疝多见于儿童及青壮年
- B. 斜疝是经腹股沟三角直接由后向前突出，不进入阴囊，斜疝是经腹股沟突出，由外上向右下前斜进入阴囊
- C. 斜疝疝块回纳后压住内环疝块仍突出，直疝疝块不再突出
- D. 直疝精索在疝囊前方，斜疝是精索在疝囊后方
- E. 直疝较高，斜疝较低

【正确答案】D

【答案解析】直疝精索在疝囊前方，斜疝是精索在疝囊后方，其他选项都是颠倒过来的。

7. 甲亢患者出现突眼征的比例为

- A. 70%~80%
- B. 60%~70%
- C. 50%~60%
- D. 40%~50%
- E. 30%~40%

【正确答案】B

【答案解析】甲亢患者 60%~70% 有突眼征，女性多见。

8. 下列各项中，不属于局部麻醉的是

- A. 局部浸润麻醉
- B. 直肠灌注麻醉
- C. 黏膜表面麻醉
- D. 区域阻滞麻醉
- E. 神经阻滞麻醉

【正确答案】B

【答案解析】局部麻醉可分为表面麻醉、局部浸润麻醉、局部区域阻滞、神经及神经节阻滞。选项 B 中直肠灌注麻醉属于全身麻醉中的非吸入性麻醉。

9. 胃、十二指肠溃疡吻合口出血的处理原则是

- A. 保守治疗

- B. 胃大部切除术
- C. 迷走神经切断术
- D. 全胃切除术
- E. 先保守再手术

【正确答案】E

【答案解析】一旦发生吻合口出血，处理原则是先予保守治疗，只有极个别病人经严格保守治疗无效，方考虑再次手术止血。

10. 关于等渗性缺水，以下说法正确的是

- A. 水和钠按其在血液中的正常比例丢失
- B. 外科临床中较少见
- C. 也称慢性缺水
- D. 血清钠浓度明显降低
- E. 血清钠浓度明显增高

【正确答案】A

【答案解析】等渗性缺水又称急性缺水或混合性缺水，指血钠浓度正常而细胞外液容量减少的一种缺水。

11. 肿势高突，根盘收束，常见于正盛邪实之疮疡的是

- A. 湿肿
- B. 痰肿
- C. 气肿
- D. 实肿
- E. 虚肿

【正确答案】D

【答案解析】实肿：肿势高突，根盘收束。常见于正盛邪实之疮疡。

12. 尿道轻度裂伤，治疗时保留导尿管的时间是

- A. 1周
- B. 2~3周
- C. 4周
- D. 6周
- E. 2个月

【正确答案】A

【答案解析】尿道损伤或轻度裂伤者排尿有困难时，予以保留导尿1周，并用抗生素。

13. 患处已化脓，用手按压时有波动感属于

- A. 根盘
- B. 根脚
- C. 应指
- D. 护场
- E. 袋脓

【正确答案】C

【答案解析】应指：患处已化脓，或有其他液体，用手按压时有波动感。

14. 黄癣皮损直接镜检可见

- A. 发内菌丝孢子
- B. 羊毛状小孢子菌
- C. 铁锈色小孢子菌
- D. 链状排列的小孢子
- E. 环状排列的小孢子

【正确答案】A

【答案解析】黄癣皮损为以毛发为中心的黄癣痂，伴鼠尿臭味，发展缓慢，毛发脱落，形成永久性脱发。直接镜检为发内菌丝孢子，滤过紫外线检查显示暗绿色荧光，培养为许兰毛癣菌。

15. 下列各项中，属于Ⅰ类切口的是

- A. 肠道手术
- B. 阑尾穿孔切除术
- C. 胃大部分切除术
- D. 开放骨折手术
- E. 甲状腺大部分切除术

【正确答案】E

【答案解析】切口的分类：一般可分为三类。第一类，清洁切口（Ⅰ类切口）：指缝合的无菌切口，如甲状腺大部分切除术、大隐静脉剥脱术等。第二类，可能污染切口（Ⅱ类切口）：指手术时可能带有污染的缝合切口，如胃大部分切除术、肠道手术等。第三类，污染切口（Ⅲ类切口）：指临近感染区或组织暴露于感染处的切口，如阑尾穿孔切除术、开放骨折手术、肠梗阻坏死的手术等。

16. 脾虚湿盛型宫颈炎常用治法是

- A. 清热利湿，解毒杀虫
- B. 健脾益气，升阳除湿
- C. 清热解毒，燥湿止带
- D. 疏肝清热，利湿止带
- E. 温肾助阳，涩精止带

【正确答案】B

【答案解析】宫颈炎之脾虚湿盛证。证候：带下量多，色白或淡黄，质稀或如涕如唾，无臭味，面色萎黄，精神倦怠，小腹坠胀，纳差便溏；舌淡胖有齿痕，苔薄白或腻，脉缓弱。治法：健脾益气，升阳除湿。方药：完带汤。

17. 以下哪项是我国孕产妇死亡的主要原因

- A. 泄泻
- B. 呕吐
- C. 产后腹痛

D. 产后感染

E. 产后出血

【正确答案】E

【答案解析】产后出血指胎儿娩出后 24 小时内失血量超过 500ml。居我国孕产妇死亡原因的首位。

18. 湿热蕴结型经期延长，治法宜选用

A. 养阴清热，凉血调经

B. 清热利湿，固冲调经

C. 清热利湿，止血调经

D. 养阴清热，固冲调经

E. 滋肾养阴，固冲止血

【正确答案】C

【答案解析】经期延长之湿热蕴结证。证候：行经时间延长，量少，色深红，混杂黏液，质稠，平时带下量多、色黄臭秽，腰腹胀痛，小便短赤，大便黏滞；舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热利湿，止血调经。方药：固经丸。

19. 下列关于葡萄胎最重要的组织学特征叙述正确的是

A. 绒毛间质水肿

B. 黄素化囊肿

C. 绒毛构型完好

D. 滋养细胞不同程度增生

E. 间质内胚源性血管消失

【正确答案】D

【答案解析】滋养细胞呈不同程度增生，是葡萄胎最重要的组织学特征。

20. 下列关于宫颈癌的转移途径最常见的是

A. 直接蔓延

B. 淋巴转移

C. 血行转移

D. 间接转移

E. 种植性转移

【正确答案】A

【答案解析】宫颈癌的转移途径：直接蔓延最常见，可有淋巴转移，血行转移极少见。晚期可转移至肺、肝或骨骼等。

21. 治疗痰湿型不孕症，应首选的方剂是

A. 启宫丸

B. 温胞饮

C. 瓜蒌丸

D. 开郁种玉汤

E. 五子衍宗丸

【正确答案】A

【答案解析】不孕症之痰湿证。证候：婚久不孕，经行后期，量少或闭经，带下量多质稠，形体肥胖，头晕，心悸，胸闷呕恶，苔白腻，脉滑。治法：燥湿化痰，调理冲任。方药：启宫丸。

22. 正常恶露持续的时间为

- A. 2~3 周
- B. 2~4 周
- C. 3~5 周
- D. 4~6 周
- E. 4~7 周

【正确答案】D

【答案解析】正常恶露有血腥味，但无臭味，持续 4~6 周。总量约 250~500ml。

23. 产褥感染发热一般出现在产后

- A. 2~4 天
- B. 2~5 天
- C. 3~7 天
- D. 4~7 天
- E. 5~7 天

【正确答案】C

【答案解析】产褥感染发热的临床表现一般出现在产后 3~7 天。

24. 产后小便不通的主要病机为

- A. 气机阻滞，清浊升降失常
- B. 膀胱失约
- C. 膀胱气化不利
- D. 脾肺气虚，不能通调水道
- E. 肾阳不振，气化失司

【正确答案】C

【答案解析】产后排尿异常中医的病因病机：1. 产后尿潴留的主要病机：膀胱气化不利。常见病因病机有气虚、肾虚、血瘀、气滞。2. 产后小便频数与失禁的主要病因病机：气虚、肾虚。

25. 不属于宫内节育器放置的禁忌证的是

- A. 子宫畸形
- B. 重度宫颈糜烂
- C. 月经过多过频
- D. 生殖器急性炎症
- E. 正常产后 6 个月

【正确答案】E

【答案解析】放置宫内节育器的禁忌证：（1）生殖器官急性炎症。（2）月经紊乱、月经过多、月经频发或不规则阴道流血、重度痛经等。（3）生殖器官肿瘤、畸形、宫腔过大或过小、重度子宫脱垂等。（4）宫颈过松、重度裂伤、重度狭窄等。（5）有较严重的全身急、慢性疾患，如心力衰竭、重度贫血、血液病以及各种疾病的急性期等。（6）妊娠或可疑妊娠者。（7）有铜过敏史者，不能放置载铜节育器。

26. 排卵多发生在下次月经来潮前几日左右

- A. 7 日
- B. 10 日
- C. 12 日
- D. 14 日
- E. 18 日

【正确答案】D

【答案解析】排卵多发生在下次月经来潮前 14 日左右。

27. 见红一般出现在

- A. 临产前 6~8 小时
- B. 临产前 10~12 小时
- C. 临产前 12~18 小时
- D. 临产前 18~24 小时
- E. 临产前 24~48 小时

【正确答案】E

【答案解析】见红在临产前 24~48 小时，因宫颈内口附近的胎膜与该处的子宫壁分离，毛细血管破裂经阴道排出少许血液，与宫颈黏液相混排出，称见红，是分娩即将开始比较可靠的征象。

28. 气血虚弱型胎儿生长受限的治法宜选用

- A. 补肾益气，填精养胎
- B. 益气养血，滋养胎元
- C. 滋阴清热，养血育胎
- D. 温肾扶阳，养血育胎
- E. 补肾益气，养血育胎

【正确答案】B

【答案解析】胎儿生长受限之气血虚弱证。证候：妊娠中晚期腹形明显小于妊娠月份，胎儿存活，面色（白光）白或萎黄，神疲懒言，气短乏力，头晕心悸；舌淡，苔少，脉细弱。治法：益气养血，滋养胎元。方药：胎元饮。

29. 妊娠剧吐之脾胃虚弱证的治法为

- A. 调气和中，降逆止呕
- B. 健脾和胃，降逆止呕
- C. 清肝和胃，降逆止呕
- D. 调气和胃，降逆止呕

E. 补脾益胃，降逆止呕

【正确答案】B

【答案解析】妊娠剧吐之脾胃虚弱证。证候：妊娠早期，恶心呕吐，甚则食入即吐，口淡，吐出物为清水或食物，头晕，神疲倦怠，嗜睡；舌淡，苔白，脉缓滑无力。治法：健脾和胃，降逆止呕。方药：香砂六君子汤加生姜。

30. 妊娠合并急性病毒性肝炎之湿热蕴结证的首选方剂是

- A. 胃苓汤
- B. 逍遥散
- C. 茵陈蒿汤
- D. 犀角地黄汤
- E. 黄连解毒汤

【正确答案】C

【答案解析】妊娠合并急性病毒性肝炎之湿热蕴结证。证候：妊娠期间身目俱黄，色鲜明如橘子色，右胁胀痛，恶心厌食，口苦咽干，胸胁痞满，倦怠乏力，尿黄便坚；舌质红，苔黄腻，脉弦滑或濡数。治法：清热利湿，佐以安胎。方药：茵陈蒿汤。

31. 以下哪项不可以判断为高危儿

- A. 出生体重<2500g
- B. 孕龄<38周
- C. 产时感染
- D. 高危产妇的新生儿
- E. 手术产儿

【正确答案】B

【答案解析】高危儿包括：①孕龄<37周或≥42周；②出生体重<2500g；③大于孕龄儿；④出生后1分钟内Apgar评分≤3分；⑤产时感染；⑥高危产妇的新生儿；⑦手术产儿；⑧新生儿的兄姐有新生儿期死亡。

32. 不属于小儿反复呼吸道感染诊断标准的是

- A. 0~2岁，上呼吸道感染每年6次
- B. 年龄3~5岁，上呼吸道感染每年6次
- C. 年龄6~12岁，上呼吸道感染每年5次
- D. 年龄3~5岁，下呼吸道感染每年2次
- E. 年龄6~12岁，下呼吸道感染每年2次以上

【正确答案】A

【答案解析】小儿反复呼吸道感染诊断标准：0~2岁，上呼吸道感染每年7次，下呼吸道感染每年3次；年龄3~5岁，上呼吸道感染每年6次，下呼吸道感染每年2次；年龄6~12岁，上呼吸道感染每年5次，下呼吸道感染每年2次以上。

33. 小儿唇干樱红多见于

- A. 邪热壅肺
- B. 暴泻伤阴

- C. 风邪入络
- D. 肝风内动
- E. 肺热伤津

【正确答案】B

【答案解析】小儿望口唇唇干樱红，多为暴泻伤阴。

34. 幼儿急疹邪郁肺卫治宜

- A. 辛凉解表，清宣肺卫
- B. 疏风透疹，清热解毒
- C. 清热解毒，佐以透发
- D. 宣肺开闭，清热解毒
- E. 清热解毒，利咽消肿

【正确答案】A

【答案解析】幼儿急疹之邪郁肺卫证。证候：突然高热，纳差，尿黄，或见呕吐，腹痛，泄泻，咽红目赤，但精神如常，舌红，苔薄黄，指纹浮紫。治法：辛凉解表，清宣肺卫。方药：银翘散加减。

35. 小儿遗尿之肺脾气虚证常用方剂是

- A. 菟丝子散
- B. 沙参麦冬汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 交泰丸合导赤散
- E. 补中益气汤合缩泉丸

【正确答案】E

【答案解析】遗尿之肺脾气虚证。证候：睡中遗尿，尿频量多，面色无华，神疲乏力，少气懒言，食欲不振，大便溏薄，自汗出，易感冒，舌淡，苔薄白，脉缓弱。治法：补肺健脾，固涩止遗。方药：补中益气汤合缩泉丸加减。

36. 营养性缺铁性贫血肝肾阴虚证的常用方剂是

- A. 桃仁汤
- B. 归脾汤
- C. 左归丸
- D. 右归丸
- E. 参苓白术散

【正确答案】C

【答案解析】营养性缺铁性贫血之肝肾阴虚证。证候：头晕目涩，面色苍白，肌肤不泽，毛发枯黄，爪甲易脆，四肢震颤抽动，两颧潮红，潮热盗汗，发育迟缓，舌红，苔少或光剥，脉弦数或细数。治法：滋阴肝肾，益精生血。方药：左归丸加减。

37. 流行性腮腺炎的并发症是

- A. 心肌炎
- B. 腮腺炎

- C. 脑膜脑炎
- D. 睾丸炎或卵巢炎
- E. 以上都是

【正确答案】E

【答案解析】流行性腮腺炎并发症。（1）脑膜脑炎：一般发生在腮腺炎发病后4~5天，个别患儿脑膜脑炎先于腮腺炎。一般预后良好。临床主要表现为发热、头痛、呕吐、嗜睡、颈强直等。重症患儿有高热、谵妄、抽搐、昏迷，甚至可引起死亡。（2）睾丸炎或卵巢炎：睾丸炎常见于较大的患儿，多数在腮腺肿大开始消退时，患儿又出现发热，头痛、睾丸明显肿胀疼痛，可并发附睾炎。卵巢炎的发生率比睾丸炎少，可能与起病不易被临床发现有关。临床可见腰部酸痛、下腹疼痛和压痛。（3）胰腺炎：常发生于腮腺肿大数日后。表现为中上腹疼痛和压痛，伴有体温骤然上升、恶心和呕吐等症。B超提示胰腺肿大，血清淀粉酶、脂肪酶升高有助于胰腺炎诊断。（4）其他并发症：如心肌炎、乳腺炎、甲状腺炎、听力丧失、视神经乳头炎等并发症均可在腮腺炎前后发生。部分患儿遗留耳聋、视力障碍等后遗症。

38. 病毒性脑炎痰瘀阻络证的首选方是

- A. 涤痰汤
- B. 导痰汤
- C. 二陈汤
- D. 清瘟败毒饮
- E. 指迷茯苓丸合桃红四物汤

【正确答案】E

【答案解析】病毒性脑炎之痰瘀阻络证。证候：神识不明，肢体不用，僵硬强直，或震颤抖动，肌肉萎软，或见面瘫、斜视，舌紫暗或有瘀点，舌苔薄白，脉弦滑。治法：涤痰通络，活血化瘀。方药：指迷茯苓丸合桃红四物汤加减。

39. 麻疹见形期治宜

- A. 辛凉透表，清宣肺卫
- B. 清热解毒，佐以透发
- C. 清热解毒，息风开窍
- D. 宣肺开闭，清热解毒
- E. 清热解毒，利咽消肿

【正确答案】B

【答案解析】麻疹之邪入肺胃证（见形期）。证候：发热持续，起伏如潮，每潮一次，疹随外出，依序而现，疹点细小，由疏转密，稍觉凸起，触之碍手，疹色先红后暗红，伴烦渴嗜睡，目赤眵多，咳嗽加剧，大便秘结，小便短少，舌红苔黄，脉洪数。治法：清热解毒，佐以透发。方药：清解透表汤加减。

40. 心脾积热型鹅口疮治疗的首选方剂是

- A. 半夏泻心汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 清热泻脾散

E. 知柏地黄丸

【正确答案】D

【答案解析】鹅口疮心脾积热证。证候：口腔满布白屑，周围红较甚，面赤，唇红，或伴发热、烦躁、多啼，口干或渴，大便干结，小便黄赤，舌红，苔薄白，脉滑或指纹青紫。治法：清心泻脾。方药：清热泻脾散加减。

41. 下列关于风湿热硬化期的持续时间正确的是

- A. 1个月
- B. 1~2个月
- C. 2~3个月
- D. 3~4个月
- E. 4~5个月

【正确答案】C

【答案解析】风湿热硬化期：风湿小体中央变性和坏死物质被吸收，炎症细胞减少，纤维组织增生和疤痕形成，心瓣膜增厚形成疤痕。此期持续2~3个月。此外，大脑皮层、小脑、基底核可见散在非特异性细胞变性。

42. 下列各项，不属猩红热临床表现的是

- A. 发热数小时至一天出疹
- B. 初起发热，咽喉红肿糜烂
- C. 细小红色丘疹
- D. 恢复期皮肤有色素沉着
- E. 有环口苍白圈，草梅舌，皮肤皱褶处可见线状疹

【正确答案】D

【答案解析】猩红热恢复期表现：皮疹按出疹顺序消退，体温正常，情况好转。皮疹多在1周内消退，1周末至第2周开始脱皮，先从面部糠屑样脱皮，渐及躯干，最后四肢，可见大片状脱皮，轻症者脱皮较轻。脱皮后无色素沉着。

43. 下列各项中，可作为鉴别真性性早熟和假性性早熟的是

- A. FSH兴奋试验
- B. LH兴奋试验
- C. GnRH兴奋试验
- D. E2兴奋试验
- E. T兴奋试验

【正确答案】C

【答案解析】诊断真性性早熟和假性性早熟可以通过GnRH兴奋试验鉴别。GnRH兴奋试验亦称黄体生成素释放激素（LHRH）兴奋试验。

44. 下列各项中，不属于心搏呼吸骤停临床表现的是

- A. 突然昏迷
- B. 忽然失语
- C. 瞳孔扩大

- D. 大动脉搏动消失
- E. 心音消失或心跳过缓

【正确答案】B

【答案解析】心搏呼吸骤停临床表现：（1）突然昏迷；（2）大动脉搏动消失；（3）心音消失或心跳过缓；（4）瞳孔扩大；（5）呼吸停止或严重呼吸困难；（6）心电图表现；（7）眼底变化。

45. 治疗厌食脾胃气虚证的首选方剂是

- A. 保和丸
- B. 异功散
- C. 四君子汤
- D. 补中益气汤
- E. 不换金正气散

【正确答案】B

【答案解析】厌食之脾胃气虚证。证候：不思进食，食而不化，大便偏稀夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力，舌质淡，苔薄白，脉缓无力。治法：健脾益气，佐以助运。方药：异功散加味。

46. 小儿多发性抽动症的基本病理改变是

- A. 痰血阻窍
- B. 痰蒙清窍
- C. 痰瘀互阻
- D. 肝风内动
- E. 肝风痰火胶结成疾

【正确答案】E

【答案解析】小儿多发性抽动症其基本病理改变为肝风、痰火胶结成疾。

47. 引起小儿咽～结合膜热的病原是

- A. 腺病毒 3、7 型
- B. 溶血性链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 柯萨奇 A 组病毒
- E. 呼吸道合胞病毒

【正确答案】A

【答案解析】特殊类型上感：①疱疹性咽峡炎：由柯萨奇 A 组病毒所致。②咽-结合膜热：由腺病毒 3、7 型所致。

48. 足三阴经在足内踝上 8 寸以下的分布规律是

- A. 厥阴在前，少阴在中，太阴在后
- B. 少阴在前，太阴在中，厥阴在后
- C. 厥阴在前，太阴在中，少阴在后
- D. 太阴在前，少阴在中，厥阴在后

E. 太阴在前，厥阴在中，少阴在后

【正确答案】C

【答案解析】足三阴经在足内踝上 8 寸以下为厥阴在前，太阴在中，少阴在后，至内踝上 8 寸以上，太阴交出于厥阴之前。

49. 有关扭伤的针灸辨证论治，叙述不正确的是

- A. 以受伤局部腧穴为主
- B. 可配合循经远取
- C. 可在扭伤部位上下循经邻近取穴
- D. 陈旧性损伤不宜用灸法
- E. 扭伤多为关节伤筋，属经筋病

【正确答案】D

【答案解析】陈旧性损伤留针加灸法，或用温针灸。

50. 足太阳膀胱经在躯干部的循行部位是

- A. 上部
- B. 下部
- C. 前面
- D. 侧面
- E. 后背

【正确答案】E

【答案解析】足太阳膀胱经与督脉循行于躯干的后背，任脉、足少阴肾经、足厥阴肝经、足太阴脾经、足阳明胃经皆循行于躯干的前面。

51. 治疗产后乳少，应首选的腧穴是

- A. 涌泉
- B. 至阴
- C. 少泽
- D. 少商
- E. 中冲

【正确答案】C

【答案解析】少泽穴为手太阳小肠经的井穴，能清热、利咽、通乳，用于治疗产后乳少，再配以乳根、膻中穴。

52. 针刺浅薄部位腧穴，应用

- A. 舒张进针法
- B. 套管进针法
- C. 指切进针法
- D. 挟持进针法
- E. 提捏进针法

【正确答案】E

【答案解析】提捏进针法：用押手拇指、食二指将欲针刺腧穴部位的皮肤提起，刺手持针，从捏起皮肤的上端将针刺入。本法主要用于皮肉浅薄部位腧穴的进行，如印堂穴。

53. 属于十五络脉的是

- A. 任脉络、督脉络、胃之大络
- B. 任脉络、督脉络、冲脉之络
- C. 带脉之络、冲脉之络、脾之大络
- D. 带脉之络、冲脉之络、胃之大络
- E. 任脉络、督脉络、脾之大络

【正确答案】E

【答案解析】十二经脉和任、督二脉各自别出一络，加上脾之大络，总称十五络脉，或十五别络。

54. 以下各项中，不属于天枢穴主治病证的是

- A. 腹痛、腹胀
- B. 便秘、腹泻
- C. 痰气
- D. 痛经
- E. 月经不调

【正确答案】C

【答案解析】天枢主治：（1）腹痛、腹胀、便秘、腹泻、痢疾等胃肠病证；（2）月经不调、痛经等妇科疾患。

55. 提插补泻法中，补法的操作手法是

- A. 重插轻提，幅度小，频率慢
- B. 轻插重提，幅度小，频率慢
- C. 重插轻提，幅度大，频率快
- D. 轻插重提，幅度小，频率快
- E. 重插轻提，幅度小，频率快

【正确答案】A

【答案解析】提插补泻法之补法：针下得气后，先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短者为补法。

56. 手太阳小肠经的郄穴是

- A. 小海
- B. 阴郄
- C. 后溪
- D. 支正
- E. 养老

【正确答案】E

【答案解析】养老穴是手太阳小肠经的郄穴。

57. 胸剑联合中点至脐中的骨度分寸是

- A. 6 寸
- B. 8 寸
- C. 12 寸
- D. 9 寸
- E. 4 寸

【正确答案】B

【答案解析】考点：骨度分寸定位法。胸剑联合中点至脐中的骨度分寸是 8 寸。

58. 手少阴心经的原穴是

- A. 神门
- B. 少冲
- C. 太溪
- D. 合谷
- E. 阴郄

【正确答案】A

【答案解析】手少阴心经的原穴是神门。



59. 五输穴中所行为

- A. 经
- B. 井
- C. 输
- D. 合
- E. 荣

【正确答案】A

【答案解析】《灵枢·九针十二原》中指出所出为井，所溜为荣，所注为输，所行为经，所入为合。

60. 以下哪项不是照海穴的主治病证

- A. 失眠、癫痫
- B. 呕吐涎沫、吐舌
- C. 月经不调、带下
- D. 小便频数、癃闭
- E. 咽喉干痛、目赤肿痛

【正确答案】B

【答案解析】照海主治：（1）癫痫、失眠等精神、神志病证；（2）咽喉干痛、目赤肿痛等五官热性病证；（3）月经不调、痛经、带下、阴挺，阴痒等妇科病证；（4）小便频数，癃闭。

61. 雀啄灸属于

- A. 天灸
- B. 温针灸

- C. 艾炷灸
- D. 艾条灸
- E. 温灸器灸

【正确答案】D

【答案解析】雀啄灸属于艾条灸中的悬起灸。

62. 患者，男，28岁，既往有内痔史，近日大便带血，血色鲜红；舌红，苔薄白，脉浮数，其中医治法宜选用

- A. 清热利湿止血
- B. 补气升提止血
- C. 清热凉血祛风
- D. 通腑泄热化瘀
- E. 固脱润肠通便

【正确答案】C

【答案解析】患者为痔之风伤肠络证。证候：大便带血，滴血或呈喷射状出血，血色鲜红，或有肛门瘙痒；舌红，苔薄白或薄黄，脉浮数。治法：清热凉血祛风。方药：凉血地黄汤或槐花散加减。

63. 患者，女，38岁，颈前弥漫性肿大，性情急躁易激动，双眼突出，双手颤动，食欲亢进却见体重减轻，心率快。应首先考虑的是

- A. 甲状腺癌
- B. 甲状腺腺瘤
- C. 单纯性甲状腺肿
- D. 甲状腺功能亢进症
- E. 甲状腺功能减退症

【正确答案】D

【答案解析】结合患者症状，考虑该患者为甲亢。

64. 患者，男，50岁。左腿被蛇咬伤1小时，蛇种类不清，局部肿痛严重，有血疱，恶寒发热，烦躁，咽干口渴，胸闷心悸，肋胀胁痛，舌质红，苔黄，脉滑数。最可能所咬的蛇毒种类为

- A. 火毒
- B. 风毒
- C. 风火毒
- D. 热毒
- E. 湿毒

【正确答案】A

【答案解析】火毒（血液毒）证证候：局部肿痛严重，常有水疱、血疱或瘀斑，严重者出现局部组织坏死；全身症状可见恶寒发热，烦躁，咽干口渴，胸闷心悸，肋胀胁痛，大便干结，小便短赤或尿血；或五官、内脏出血，斑疹隐隐；舌质红，苔黄，脉滑数或结代。治法：泻火解毒，凉血活血。方药：龙胆泻肝汤合五味消毒饮加减。

65. 患者，女，39岁，肝区疼痛、腹胀、消瘦乏力、纳差、上腹肿块，诊断为原发性肝癌，最常用而有效的诊断方法是

- A. 甲胎蛋白检测
- B. 肝功能检查
- C. 超声检查
- D. X线检查
- E. CT

【正确答案】C

【答案解析】原发性肝癌的实验室及其他检查：（1）甲胎蛋白（AFP）检测：对原发性肝癌的诊断价值很大，特异性较高。（2）肝功能及酶学检查：晚期肝癌或合并肝硬化者可有肝功能损害，大多有血清碱性磷酸酶、 γ -GT增高。（3）超声检查，是肝癌诊断中最常用而有效的方法。（4）X线检查：肝右叶的癌肿可发现右膈肌抬高，运动受限或局部隆起；肝左叶或巨大肝癌在行胃肠钡餐造影时可见胃及结肠肝曲被推压现象。（5）CT：可以明确病灶的数目、位置、大小及与重要血管的关系。

66. 患者，男，65岁，皮肤瘙痒数年，皮肤干燥，抓破后血痕累累；伴头晕眼花，失眠多梦；舌红苔薄，脉细数。宜选用的方药是

- A. 当归饮子
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 桃红四物汤
- D. 凉血地黄汤
- E. 消风散和四物汤

【正确答案】A

【答案解析】皮肤瘙痒症之血虚肝旺证。证候：老年人为多见，病程较长，皮肤干燥，抓破后血痕累累；伴头晕眼花，失眠多梦；舌红苔薄，脉细数或弦数。治法：养血润燥，祛风止痒。方药：当归饮子加减。

67. 患者，女，36岁，因失血输入大量库血，导致出现四肢乏力、手足麻木，肌肉酸痛，查血清钾浓度为6.0mmol/L，血清钠浓度为140mmol/L，最可能的原因是患者出现了

- A. 低钠血症
- B. 高钠血症
- C. 低氯血症
- D. 低钾血症
- E. 高钾血症

【正确答案】E

【答案解析】根据患者输注库血史及血清钾浓度，并结合患者的症状不难判断。高钾血症致神经肌肉传导障碍：血钾轻度增高时仅有四肢乏力、手足感觉异常（麻木）、肌肉酸痛。当血清钾>7.0mmol/L时，可出现软瘫，先累及躯干，后波及四肢，最后累及呼吸肌，出现呼吸困难。

68. 患者，男，20岁，不慎跌入80℃热水池内，池水淹没下半身超过臀部，初步估计烫伤面积为

- A. 30%~34%
- B. 35%~39%
- C. 40%~44%
- D. 45%~50%
- E. >60%

【正确答案】D

【答案解析】按体表面积划分为 11 个 9% 的等份，另加 1%，构成 100% 的体表面积，即头颈部：1×9%；躯干：3×9%；两上肢：2×9%；双下肢：5×9%+1%，共为 11×9%+1%。

69. 患者，男，4 天前有外伤史，现症见烦躁不安，有恐惧或欣快感；皮肤、口唇变白，大量出汗，脉搏快速，体温逐步上升。伤口中有大量浆液性渗出物，皮下可触及捻发音，最可能的诊断为

- A. 瘢
- B. 痛
- C. 脓肿
- D. 气性坏疽
- E. 急性蜂窝织炎

【正确答案】D

【答案解析】气性坏疽临床表现：全身表现：创伤后并发此症的时间通常在伤后 1~4 日。临床特点是病情突然恶化，烦躁不安，有恐惧或欣快感；皮肤、口唇变白，大量出汗，脉搏快速，体温逐步上升。随着病情的发展，可发生溶血性贫血、黄疸、血红蛋白尿、酸中毒，全身情况可在 12~24 小时内全面迅速恶化。局部表现：伤肢沉重或疼痛，持续加重，犹如胀裂，止痛剂不能奏效；局部肿胀与创伤所能引起的程度不成比例，并迅速向上、下蔓延。伤口中有大量浆液性或浆液血性渗出物，有时可见气泡从伤口中冒出。皮下可触及捻发音。伤口可有恶臭。

70. 患者，男，中晚期胃癌合并幽门梗阻，现症见：头晕身重，呕吐痰涎，胃脘痞满疼痛；口淡少食，腹胀便溏，痰核累累；舌淡胖苔浊，脉濡滑。选用的治法为

- A. 疏肝和胃，降逆止痛
- B. 温中散寒，健脾和胃
- C. 养阴清热，和胃止痛
- D. 健脾化湿，软坚散结
- E. 补气养血，健脾补肾

【正确答案】D

【答案解析】根据患者的表现，辨证为胃癌之脾虚痰湿证。证候：多见于中、晚期胃癌合并贲门或幽门梗阻者。头晕身重，呕吐痰涎，胃脘痞满疼痛；口淡少食，腹胀便溏，痰核累累；舌淡胖苔浊，脉濡滑。治法：健脾化湿，软坚散结。方药：参苓白术散合二陈汤加减。

71. 患者，男，22 岁，出现急性持续性腹痛，阵发性加剧伴休克，最大可能是

- A. 输尿管结石、肾绞痛
- B. 单纯性机械性肠梗阻
- C. 急性阑尾炎

- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 肠扭转牵拉肠系膜

【正确答案】D

【答案解析】绞窄性肠梗阻往往出现剧烈的持续性腹痛伴有阵发性加重，梗阻晚期有脱水表现，绞窄性肠梗阻可出现休克表现。

72. 患者女，30岁，已婚。继发加重性痛经伴经量过多3年，经前小腹冷痛，拒按，得热痛减，下腹结块，固定不移，形寒肢冷，舌暗苔白，脉弦紧。已确诊为子宫内膜异位症，治疗应首选

- A. 生化汤
- B. 桃红四物汤
- C. 膀胱逐瘀汤
- D. 少腹逐瘀汤
- E. 血府逐瘀汤

【正确答案】D

【答案解析】此患者已确诊为子宫内膜异位症，根据症状及舌脉的表现当辨证为寒凝血瘀证，方用少腹逐瘀汤。

73. 患者，女，30岁。结婚2年一直同居而未孕，月经10/20~50天，量时多时少，妇科检查无异常，基础体温为单相。首先应考虑的诊断是

- A. 排卵期出血
- B. 有排卵性功血
- C. 黄体功能不全
- D. 无排卵性功血
- E. 子宫内膜不规则脱落

【正确答案】D

【答案解析】无排卵性功血临床表现主要是不规则子宫出血。常表现为月经周期紊乱，经期长短不一，经量时多时少，甚至大量出血。可继发贫血，伴有乏力、头晕等症状，甚至出现失血性休克。

74. 患者，女性，26岁，诊断为外阴炎，症见：阴部干涩、瘙痒，五心烦热，伴有头晕目眩，烘热汗出，腰酸耳鸣；舌红少苔，脉细数。其治疗首选方为

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 五味消毒饮
- C. 普济消毒饮
- D. 人参养荣汤
- E. 知柏地黄汤

【正确答案】E

【答案解析】外阴炎之肝肾阴虚证。证候：阴部干涩、瘙痒，五心烦热，头晕目眩，烘热汗出，腰酸耳鸣；舌红少苔，脉细数。治法：滋肾降火，调补肝肾。方药：知柏地黄汤。

75. 患者女，31岁。结婚4年未孕，经前乳房、小腹胀痛，月经周期先后不定，经血夹块，情志抑郁或急躁易怒，胸胁胀满；舌质黯红，脉弦。治疗应首选的方剂是

- A. 柴胡疏肝散
- B. 逍遥散
- C. 启宫丸
- D. 养精种玉汤
- E. 开郁种玉汤

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现辨证为不孕症之肝郁证。证候：婚久不孕，经前乳房、小腹胀痛，月经周期先后不定，经血夹块，情志抑郁或急躁易怒，胸胁胀满；舌质黯红，脉弦。治法：疏肝解郁，养血理脾。方药：开郁种玉汤。

76. 患者，女，30岁，已婚。月经停止1年余，形体肥胖，胸胁满闷，神疲倦怠，呕恶痰多，面浮足肿，带下量多、色白，舌苔腻，脉滑。妇科检查未见异常。其证型是

- A. 痰湿阻滞证
- B. 湿热下注证
- C. 气滞血瘀证
- D. 肝肾不足证
- E. 气虚血弱证

【正确答案】A

【答案解析】根据患者症状：月经停止1年余，拟诊断为闭经。形体肥胖，胸胁满闷，神疲倦怠，呕恶痰多，面浮足肿，带下量多、色白，舌苔腻，脉滑，为闭经之痰湿阻滞证的表现。

77. 患者，女性，26岁，已婚。产后5天出现发热，脉搏增快，下腹部有压痛，恶露增多，呈脓性，有臭味，并伴有下肢血栓静脉炎。妇检子宫大而软，有压痛，双侧附件区压痛。实验室检查：白细胞 $20 \times 10^9/L$ 。中性粒细胞80%。其考虑的诊断为

- A. 产褥感染
- B. 产褥中暑
- C. 呼吸道感染
- D. 急性乳腺炎
- E. 泌尿系统感染

【正确答案】A

【答案解析】根据患者的表现考虑为产褥感染的可能性大。产褥感染：临床表现为发热、下腹疼痛、恶露异常。体温升高，脉搏增快，下腹有压痛，或有反跳痛、肌紧张。妇科检查子宫大而软，有压痛，双侧附件区压痛或触及包块。实验室检查：白细胞总数明显升高，中性粒细胞增高。

78. 患者，女性，30岁，产后肢体、关节疼痛，屈伸不利，畏寒恶风，关节肿胀，麻木重着，恶寒，发热，头痛；舌淡，苔薄白，脉浮紧。诊断为产后关节痛，其中医证型为

- A. 外感证
- B. 血虚证
- C. 血瘀证

- D. 气滞证
- E. 气虚证

【正确答案】A

【答案解析】产后关节痛之外感证。证候：产后肢体、关节疼痛，屈伸不利，或痛处游走不定，或冷痛剧烈，畏寒恶风，或关节肿胀，麻木重着，恶寒，发热，头痛；舌淡，苔薄白，脉浮紧。故根据题干要求，此题的正确选项是A。

79. 患者，女，28岁，已婚。症见：产后血性恶露持续10日不止，量时多时少，色紫黯，有血块，小腹疼痛拒按，块下痛减；舌紫黯，脉沉涩。其中医证型为

- A. 气滞证
- B. 气虚证
- C. 血热证
- D. 血瘀证
- E. 阴虚证

【正确答案】D

【答案解析】此患者表现为晚期产后出血之血瘀证。证候：产后血性恶露持续10日不止，量时多时少，色紫黯，有血块，小腹疼痛拒按，块下痛减；舌紫黯或边尖有瘀斑、瘀点，脉沉涩。

80. 患者，女，49岁。经断前后，时而烘热汗出，时而畏寒肢冷，腰酸乏力，头晕耳鸣，浮肿便溏，月经紊乱，色淡，舌淡苔薄，脉沉弱。治疗首选方剂为

- A. 一贯煎
- B. 天王补心丹
- C. 知柏地黄丸
- D. 杞菊地黄丸
- E. 二仙汤合二至丸

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现可以诊断为绝经综合征肾阴阳两虚证。肾阴阳两虚证证候：经断前后，时而烘热汗出，时而畏寒肢冷，腰酸乏力，头晕耳鸣，浮肿便溏，月经紊乱，月经过多或过少，淋漓不断，或突然暴下如注，色淡或黯，舌淡，苔薄，脉沉弱。治法：滋阴补肾，调补冲任。方药：二仙汤合二至丸。

81. 患者，女，32岁，经期或经后小腹绵绵作痛，经色淡，量少，腰膝酸软，头晕耳鸣；舌质淡，脉沉细弱。中医诊断为痛经，其治疗首选方剂是

- A. 调肝汤
- B. 清经散
- C. 脊下逐瘀汤
- D. 清热调血汤
- E. 黄芪建中汤

【正确答案】A

【答案解析】痛经之肝肾亏损证。证候：经期或经后小腹绵绵作痛，经色淡，量少，腰膝酸软，头晕耳鸣；舌质淡，脉沉细弱。治法：滋肾养肝，调经止痛。方药：调肝汤加桑寄生、肉苁蓉。

82. 患儿，5岁。昨日突然出现高热，恶寒，伴见无汗，头痛，心烦，目赤咽红，肌肉酸痛，腹痛，舌质红，舌苔黄，脉数。西医诊断为急性上呼吸道感染，治疗方剂首选的是

- A. 银翘散
- B. 玉屏风散
- C. 新加香薷饮
- D. 荆防败毒散
- E. 银翘散合普济消毒饮

【正确答案】E

【答案解析】急性上呼吸道感染之时邪感冒。证候：起病急骤，全身症状重。高热，恶寒，无汗或汗出热不解，头痛，心烦，目赤咽红，肌肉酸痛，腹痛，或有恶心、呕吐，舌质红，舌苔黄，脉数。治法：清热解毒。方药：银翘散合普济消毒饮加减。对比A和E选项，E选项更完整，是首选方剂。

83. 患儿，9岁。哮喘病史3年。1天前出现发热，鼻流浊涕，今日突然咳喘哮鸣，声高息涌，痰稠色黄，渴喜冷饮，小便黄赤，大便干燥，舌苔黄腻，脉滑数。治疗首选方剂是

- A. 清气化痰丸
- B. 银翘散合礞石滚痰丸
- C. 射干麻黄汤合都气丸
- D. 麻杏石甘汤或定喘汤
- E. 小青龙汤合三子养亲汤

【正确答案】D

【答案解析】支气管哮喘之热性哮喘。证候：咳喘哮鸣，声高息涌，痰稠色黄，发热面红，胸闷膈满，渴喜冷饮，小便黄赤，大便干燥或秘结，舌红，舌苔黄腻，脉象滑数。治法：清热化痰，止咳定喘。方药：麻杏石甘汤或定喘汤加减。

84. 患儿，5岁，症见形体极度消瘦，皮肤干瘪起皱，大肉已脱，呈老人貌，毛发干枯，面色无华，精神萎靡，啼哭无泪，不思饮食，舌质淡嫩，苔少，脉细弱无力。首选方剂是

- A. 八珍汤
- B. 五苓散
- C. 肥儿丸
- D. 资生健脾丸
- E. 石斛夜光丸

【正确答案】A

【答案解析】干疳证候：形体极度消瘦，皮肤干瘪起皱，大肉已脱，呈老人貌，毛发干枯，面色无华，精神萎靡，啼哭无泪，不思饮食，或见肢体浮肿，或见皮肤瘀点、瘀斑等，舌质淡嫩，苔少，脉细弱无力。治法：补益气血。方药：八珍汤加减。

85. 患儿，1岁，大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，伴有恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。其中医证型为

- A. 湿热泻
- B. 风寒泻
- C. 伤食泻
- D. 脾虚泻
- E. 脾肾阳虚泻

【正确答案】B

【答案解析】风寒泻。证候：大便清稀，夹有泡沫，臭气不甚，肠鸣腹痛，或伴恶寒发热，鼻流清涕，咳嗽，舌质淡，苔薄白，脉浮紧，指纹淡红。治法：疏风散寒，化湿和中。方药：藿香正气散加减。

86. 患儿，6岁，腹痛绵绵，时作时止，痛处喜温喜按，面白少华，精神倦怠，手足不温，饮食减少，食后腹胀，大便稀溏，唇舌淡白，脉沉缓。其治宜

- A. 温中理脾，缓急止痛
- B. 消食导滞，行气止痛
- C. 温中散寒，理气止痛
- D. 消食导滞，理气止痛
- E. 温中健脾，行气止痛

【正确答案】A

【答案解析】腹痛之脾胃虚寒证。证候：腹痛绵绵，时作时止，痛处喜温喜按，面白少华，精神倦怠，手足不温，乳食减少，或食后腹胀，大便稀溏，唇舌淡白，脉沉缓，或指纹淡红。治法：温中理脾，缓急止痛。方药：小建中汤合理中丸加减。

87. 患儿，5岁，突然高热，烦躁萎靡，症见：伴有恶心呕吐，反复惊厥，神志昏迷，下痢脓血，舌质红，苔黄厚，脉数。诊断为中毒型细菌性痢疾，其治疗应首选的方剂是

- A. 清营汤
- B. 黄连解毒汤
- C. 清瘟败毒饮
- D. 普济消毒饮
- E. 参附龙牡救逆汤

【正确答案】B

【答案解析】根据患儿的表现，诊断为中毒型细菌性痢疾之毒邪内闭证。证候：突然高热，烦躁萎靡，或恶心呕吐，反复惊厥，神志昏迷或见呼吸困难，节律不整，可有下痢脓血，或虽未见下痢脓血，但用棉签在肛门内检查到黏液粪便，舌质红，苔黄厚或灰糙，脉数。治法：清肠解毒，泄热开窍。方药：黄连解毒汤加味。

88. 患儿，8岁，2天前出现壮热、烦躁不安，口渴引饮，现症见：面赤唇红，口舌生疮，痘疹密布，疹色紫暗，大便干结，小便黄赤，舌质红绛，舌苔黄糙而干，脉洪数。治疗首选方剂是

- A. 清营汤
- B. 凉营清气汤

- C. 化斑解毒汤
- D. 透疹凉解汤
- E. 黄连解毒汤

【正确答案】A

【答案解析】此患者为水痘之毒炽气营证的表现。证候：壮热烦躁，口渴引饮，面赤唇红，口舌生疮，痘疹密布，疹色紫暗，疱浆混浊，甚至出现出血性皮疹，大便干结，小便黄赤，舌质红绛，舌苔黄糙而干，脉洪数。治法：清气凉营，化湿解毒。方药：清营汤加减。

89. 患儿，出生 6 天。全身冰冷，皮肤暗红，僵卧少动，反应极差，气息微弱，哭声低弱，口吐白沫，呼吸不匀，肌肤板硬而肿，范围波及全身，少尿，唇舌色淡，指纹淡红。治疗首选方剂是

- A. 参附汤
- B. 四逆汤
- C. 理中汤
- D. 黄芪建中汤
- E. 附子理中汤

【正确答案】A

【答案解析】新生儿硬肿症之阳气虚弱证。证候：体质虚弱，全身冰冷，僵卧少动，气息微弱，哭声低微无力，吸吮困难，肢体关节活动不利，全身硬肿，皮肤暗红，尿少或无尿，舌质淡，苔薄白，指纹淡红或隐伏不现。治法：益气温阳，通经活血。方药：参附汤加减。

90. 患儿，4 岁，反复低热 2 个月，症见：关节酸痛，患处不红，遇寒加重，得温痛减，舌淡，苔白腻，治疗应首选的方剂是

- A. 清络汤
- B. 瘀痹汤
- C. 双合汤
- D. 乌头汤
- E. 防己黄芪汤

【正确答案】B

【答案解析】此患儿为风湿热寒湿阻络证的表现。寒湿阻络证证候：关节酸痛，局部不红，遇寒加剧，得温痛减，或有低热，气短乏力，心悸怔忡，舌质淡，苔白腻，脉濡缓。治法：散寒除湿，养血祛风。方药：蠲痹汤合独活寄生汤加减。

91. 患儿，2 个月。发热，时有呼吸暂停，心率偏慢，发绀，吐奶，时有尖叫，惊厥，查体前囟紧张，脑脊液检查压力增高，外观混浊，白细胞 $1200 \times 10^6/L$ 。应首先考虑的诊断是

- A. 颅内出血
- B. 呼吸衰竭
- C. 胆红素脑病
- D. 病毒性脑炎
- E. 化脓性脑膜炎

【正确答案】E

【答案解析】典型化脓性脑膜炎的脑脊液压力增高、外观混浊；白细胞总数明显增多，多在 $1000 \times 10^6 / L$ 以上。脑脊液沉渣涂片找菌是明确化脓性脑膜炎病原的重要方法。脑脊液培养是确定病原菌的可靠方法。

92. 患者，女，18岁。头痛，以后头部为重，痛如锥刺，舌淡。治疗除主穴外，应加用的配穴是

- A. 血海、合谷
- B. 血海、膈俞
- C. 上星、头维
- D. 百会、通天
- E. 率谷、太阳

【正确答案】B

【答案解析】头痛如锥刺为瘀血阻滞，瘀血头痛配血海、膈俞。

93. 患者，男性，31岁。口角歪向右侧，左眼不能闭合2天，左侧额纹消失，治疗应选取何经穴为主

- A. 手、足厥阴经
- B. 手、足阳明经
- C. 手、足少阳经
- D. 手、足太阴经
- E. 手、足太阳经

【正确答案】B

【答案解析】面瘫的治法：祛风通络，疏调经筋。取局部穴、手足阳明经穴为主。

94. 患者3年来腰部时常酸痛，腰部肌肉僵硬，久坐加重，舌质淡暗，边有瘀点。针灸治疗除主穴外，应加取

- A. 悬钟、太冲
- B. 肾俞、太溪
- C. 膻俞、次髎
- D. 肾俞、足三里
- E. 命门、腰阳关

【正确答案】C

【答案解析】根据题干症状辨证为瘀血腰痛。瘀血腰痛针灸配膻俞、次髎。

95. 患者，女性，25岁。痛经2年，经行不畅，小腹胀痛拒按，经色紫红，夹有瘀块，血块下后痛可缓解，舌有瘀斑，脉沉涩。治疗应以哪组经脉腧穴为主

- A. 冲脉、足阳明经
- B. 带脉、足厥阴经
- C. 任脉、足太阴经
- D. 督脉、足阳明经
- E. 任脉、足少阴经

【正确答案】C

【答案解析】该患者属痛经实证。痛经实证取足太阴经，任脉穴为主；虚证取足太阴，足阳明经穴为主。

96. 患者，女性，53岁。右上齿痛半年，隐隐作痛，时作时止，脉沉。针灸治疗在合谷、颊车、下关的基础上，应加取

- A. 太冲、二间
- B. 外关、风池
- C. 风池、太冲
- D. 风池、侠溪
- E. 太溪、行间

【正确答案】E

【答案解析】上述表现属于虚火牙痛，治疗应在主穴基础上加太溪和行间。

97. 患者，女性，50岁。两膝关节红肿热痛，尤以右膝部为重，痛不可触，关节活动不利，并见身热，口渴，舌苔黄燥，脉滑数。治疗除主穴外，还应加

- A. 脾俞、气海
- B. 肾俞、合谷
- C. 脾俞、胃俞
- D. 大椎、曲池
- E. 肾俞、关元

【正确答案】D

【答案解析】根据题干辨证为痹症之热痹。大椎属督脉，为退热要穴，治一切热病；曲池属手阳明大肠经，亦可治疗各种热病。题干中患者除膝痛外并见热证之象，故除选用治疗膝痛的穴位外，配伍取用清热泻火的大椎、曲池。

98. 患者，男性，45岁，近一个月出现腹胀，腹痛拒按，矢气后胀减，并见腹内包块，便下黏液脓血，排便困难，舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数。就诊后行直肠指诊检查，直肠指诊时触到质地坚硬、表面凹凸不平的肿块，退指见指套染血。根据患者情况西医初步诊断为

- A. 直肠癌
- B. 外痔
- C. 内痔
- D. 结肠癌
- E. 混合痔

【正确答案】A

【答案解析】直肠癌临床表现与检查：（1）排便习惯改变，是常见早期症状。（2）出血。（3）脓血便。（4）大便变细或变形，当出现肠管部分内容物通过障碍时，则有不全性肠梗阻表现。（5）转移征象，当肿瘤侵犯膀胱、前列腺时，可有尿频、尿痛、血尿等表现。骶前神经受侵犯可出现骶尾部持续性剧烈疼痛。直肠癌晚期或有肝转移时可出现肝大、黄疸、腹水、贫血、消瘦、浮肿及恶病质等。（6）检查，直肠指诊、直肠镜检查。根据患者的症状及直肠指诊检查情况可初步诊断为直肠癌。

99. 患者，男性，45岁，近一个月出现腹胀，腹痛拒按，矢气后胀减，并见腹内包块，便下黏液脓血，排便困难，舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数。就诊后行直肠指诊检查，直肠指诊时触到质地坚硬、表面凹凸不平的肿块，退指见指套染血。其中医辨证证型为

- A. 脾虚湿热证
- B. 湿热瘀毒证
- C. 脾肾寒湿证
- D. 肾阳不固，痰湿凝聚证
- E. 气滞血瘀证

【正确答案】B

【答案解析】湿热瘀毒证。证候：腹胀，腹痛或窜痛，拒按，矢气胀减，腹内包块，便下黏液脓血或里急后重，排便困难；舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数。治法：清热解毒，通腑化瘀，攻积祛湿。方药：木香分气丸加减

100. 患者，男性，45岁，近一个月出现腹胀，腹痛拒按，矢气后胀减，并见腹内包块，便下黏液脓血，排便困难，舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数。就诊后行直肠指诊检查，直肠指诊时触到质地坚硬、表面凹凸不平的肿块，退指见指套染血。其首选治法为

- A. 清热利湿，理气健脾
- B. 清热解毒，通腑化瘀，攻积祛湿
- C. 祛寒胜湿，健肺温肾
- D. 益肺补肾，祛湿化痰
- E. 祛瘀散结，理气降逆

【正确答案】B

【答案解析】湿热瘀毒证。证候：腹胀，腹痛或窜痛，拒按，矢气胀减，腹内包块，便下黏液脓血或里急后重，排便困难；舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数。治法：清热解毒，通腑化瘀，攻积祛湿。方药：木香分气丸加减

101. 患者，男性，45岁，近一个月出现腹胀，腹痛拒按，矢气后胀减，并见腹内包块，便下黏液脓血，排便困难，舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数。就诊后行直肠指诊检查，直肠指诊时触到质地坚硬、表面凹凸不平的肿块，退指见指套染血。其首选方剂为

- A. 四妙散合白头翁汤
- B. 参苓白术散合吴茱萸汤
- C. 导痰汤
- D. 木香分气丸
- E. 桃红四物汤

【正确答案】D

【答案解析】湿热瘀毒证。证候：腹胀，腹痛或窜痛，拒按，矢气胀减，腹内包块，便下黏液脓血或里急后重，排便困难；舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数。治法：清热解毒，通腑化瘀，攻积祛湿。方药：木香分气丸加减

102. 患者，女性，30岁，已婚。经间期见阴道少量流血，色深红，质稠，平素带下量多，色黄，质黏腻，有臭气，伴小腹时痛，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。根据患者症状，此病的中医证型为

- A. 脾气虚证
- B. 湿热证
- C. 肾阴虚证
- D. 血瘀证
- E. 阳盛血热证

【正确答案】B

【答案解析】患者为经间期出血之湿热证。证候：经间期少量阴道流血，色深红，质稠，平时带下量多，色黄，或赤白带下，质黏腻，或有臭气，小腹时痛，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热除湿，凉血止血。方药：清肝止淋汤去阿胶、红枣，加茯苓、炒地榆。

103. 患者，女性，30岁，已婚。经间期见阴道少量流血，色深红，质稠，平素带下量多，色黄，质黏腻，有臭气，伴小腹时痛，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。治疗时采用的治法为

- A. 滋肾养阴，固冲止血
- B. 清热凉血，止血调经
- C. 清热除湿，凉血止血
- D. 健脾益气，固冲摄血
- E. 活血化瘀，理血归经

【正确答案】C

【答案解析】患者为经间期出血之湿热证。证候：经间期少量阴道流血，色深红，质稠，平时带下量多，色黄，或赤白带下，质黏腻，或有臭气，小腹时痛，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热除湿，凉血止血。方药：清肝止淋汤去阿胶、红枣，加茯苓、炒地榆。

104. 患者，女性，30岁，已婚。经间期见阴道少量流血，色深红，质稠，平素带下量多，色黄，质黏腻，有臭气，伴小腹时痛，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。治疗首选方剂是

- A. 两地汤
- B. 固经丸
- C. 举元煎
- D. 清肝止淋汤
- E. 补中益气汤

【正确答案】D

【答案解析】患者为经间期出血之湿热证。证候：经间期少量阴道流血，色深红，质稠，平时带下量多，色黄，或赤白带下，质黏腻，或有臭气，小腹时痛，小便短赤；舌红，苔黄腻，脉滑数。治法：清热除湿，凉血止血。方药：清肝止淋汤去阿胶、红枣，加茯苓、炒地榆。

105. 患者，女，26岁。诊断为无排卵性功血，症见：经血非时暴下不止，色深红，质稠，口渴烦热，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。根据患者症状，其中医证型为

- A. 脾虚证
- B. 血瘀证
- C. 肾阳虚证
- D. 肾阳虚证

E. 实热证

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现辨证为崩漏之实热证。证候：经血非时暴下不止，或淋漓日久不断，色深红，质稠，口渴烦热，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。治法：清热凉血，止血调经。方药：清热固经汤加沙参、麦冬

106. 患者，女，26岁。诊断为无排卵性功血，症见：经血非时暴下不止，色深红，质稠，口渴烦热，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。其首选治法为

- A. 滋阴清热，止血调经
- B. 清热凉血，止血调经
- C. 活血化瘀，止血调经
- D. 补气摄血，固冲调经
- E. 滋肾养阴，调经止血

【正确答案】B

【答案解析】根据患者的表现辨证为崩漏之实热证。证候：经血非时暴下不止，或淋漓日久不断，色深红，质稠，口渴烦热，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。治法：清热凉血，止血调经。方药：清热固经汤加沙参、麦冬

107. 患者，女，26岁。诊断为无排卵性功血，症见：经血非时暴下不止，色深红，质稠，口渴烦热，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。其首选方剂为

- A. 保阴煎
- B. 安冲汤
- C. 举元煎
- D. 逐瘀止血汤
- E. 清热固经汤

【正确答案】E

【答案解析】根据患者的表现辨证为崩漏之实热证。证候：经血非时暴下不止，或淋漓日久不断，色深红，质稠，口渴烦热，溲黄便结；舌红，苔黄，脉滑数。治法：清热凉血，止血调经。方药：清热固经汤加沙参、麦冬

108. 患儿，6岁。双侧腮腺肿胀已5天。近日热退腮肿渐消退，现又出现睾丸肿痛，痛引睾腹。患者辨证为

- A. 邪陷心肝证
- B. 毒窜睾腹证
- C. 温毒在表证
- D. 热毒蕴结证
- E. 邪侵肺卫证

【正确答案】B

【答案解析】患者为流行性腮腺炎之毒窜睾腹证。证候：腮部肿胀渐消，男性多有一侧或两侧睾丸肿胀疼痛，女性多有一侧或两侧少腹疼痛，伴有发热、呕吐，舌质红，舌苔黄，脉数。治法：清肝泻火，活血止痛。方药：龙胆泻肝汤加减。

109. 患儿，6岁。双侧腮腺漫肿已5天。近日热退腮肿渐消退，现又出现睾丸肿痛，痛引睾腹。其治法是

- A. 清肝泻火，活血止痛
- B. 养阴生津，清热润喉
- C. 疏风清热，散结消肿
- D. 清热解毒，软坚散结
- E. 清热解毒，息风开窍

【正确答案】A

【答案解析】患者为流行性腮腺炎之毒窜睾腹证。证候：腮部肿胀渐消，男性多有一侧或两侧睾丸肿胀疼痛，女性多有一侧或两侧少腹疼痛，伴有发热、呕吐，舌质红，舌苔黄，脉数。治法：清肝泻火，活血止痛。方药：龙胆泻肝汤加减。

110. 患儿，6岁。双侧腮腺漫肿已5天。近日热退腮肿渐消退，现又出现睾丸肿痛，痛引睾腹。治疗应首选方剂是

- A. 银翘散
- B. 导赤散
- C. 温胆汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 丹栀逍遥丸

【正确答案】D

【答案解析】患者为流行性腮腺炎之毒窜睾腹证。证候：腮部肿胀渐消，男性多有一侧或两侧睾丸肿胀疼痛，女性多有一侧或两侧少腹疼痛，伴有发热、呕吐，舌质红，舌苔黄，脉数。治法：清肝泻火，活血止痛。方药：龙胆泻肝汤加减。

111. 患儿，女，5岁，1周前出现发热，咳嗽，流清涕等上呼吸道感染症状，在家中自服药物略见好转。昨日夜间突然出现全身皮肤瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有鼻出血，牙龈出血，面红目赤，烦躁口渴，尿少，舌红，苔黄，脉数。查血常规：血小板 $19 \times 10^9/L$ ，骨髓检查：巨核细胞计数增多，胞体大小不一，以小型为多，幼稚型巨核细胞比例增加。根据患者情况西医初步诊断为

- A. 过敏性紫癜
- B. 再生障碍性贫血
- C. 缺铁性贫血
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 急性白血病

【正确答案】D

【答案解析】特发性血小板减少性紫癜诊断要点：本病根据病史、临床表现和实验室检查，即可做出诊断。临床以出血为主要症状，血小板计数 $<100 \times 10^9/L$ ，急性型大多 $<20 \times 10^9/L$ 。骨髓巨核细胞计数增多或正常，胞体大小不一，以小型为多，幼稚型和/或成熟未释放型巨核细胞比例增加。血清中检出抗血小板抗体。

112. 患儿，女，5岁，1周前出现发热，咳嗽，流清涕等上呼吸道感染症状，在家中自服药物略见好转。昨日夜间突然出现全身皮肤瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有鼻出血，牙龈出血，面

红目赤，烦躁口渴，尿少，舌红，苔黄，脉数。查血常规：血小板 $19 \times 10^9/L$ ，骨髓检查：巨核细胞计数增多，胞体大小不一，以小型为多，幼稚型巨核细胞比例增加。其中医治法首选为

- A. 清热解毒，凉血止血
- B. 益气健脾，摄血养血
- C. 滋阴清热，凉血宁络
- D. 活血化瘀，理气止血
- E. 补脾养心，益气生

【正确答案】A

【答案解析】血热伤络。证候：起病急骤，皮肤出现瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有齿衄鼻衄，偶有尿血，面红目赤，心烦口渴，便秘尿少，舌红，苔黄，脉数。治法：清热解毒，凉血止血。方药：犀角地黄汤加减

113. 患儿，女，5岁，1周前出现发热，咳嗽，流清涕等上呼吸道感染症状，在家中自服药物略见好转。昨日夜间突然出现全身皮肤瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有鼻出血，牙龈出血，面红目赤，烦躁口渴，尿少，舌红，苔黄，脉数。查血常规：血小板 $19 \times 10^9/L$ ，骨髓检查：巨核细胞计数增多，胞体大小不一，以小型为多，幼稚型巨核细胞比例增加。其首选方剂为

- A. 归脾汤
- B. 大补阴丸合茜根散
- C. 犀角地黄汤
- D. 桃仁汤
- E. 异功散

【正确答案】C

【答案解析】血热伤络。证候：起病急骤，皮肤出现瘀斑瘀点，色红鲜明，伴有齿衄鼻衄，偶有尿血，面红目赤，心烦口渴，便秘尿少，舌红，苔黄，脉数。治法：清热解毒，凉血止血。方药：犀角地黄汤加减

114. 皮疹多沿某一周围神经分布，排列呈带状，发于身体一侧，不超过正中线，疼痛剧烈的是

- A. 带状疱疹
- B. 湿疹
- C. 银屑病
- D. 梅毒
- E. 白癜风

【正确答案】A

【答案解析】带状疱疹皮疹多沿某一周围神经分布，排列呈带状，发于身体一侧，不超过正中线，好发部位为肋间神经、颈部神经、三叉神经及腰骶神经支配区。

115. 局部色素脱失斑，呈乳白色斑点或斑片，境界清楚，边缘褐色，无疼痛的是

- A. 带状疱疹
- B. 湿疹
- C. 银屑病

- D. 梅毒
- E. 白癜风

【正确答案】E

【答案解析】白癜风皮损为局部色素脱失斑，呈乳白色斑点或斑片，境界清楚，边缘褐色，皮损区内毛发可变白，但无皮肤萎缩、硬化及脱屑等变化，无自觉症状。

116. 柔软的分叶状肿物是

- A. 脂肪瘤
- B. 纤维瘤
- C. 皮脂腺囊肿
- D. 神经纤维瘤
- E. 蔓状血管瘤

【正确答案】A

【答案解析】脂肪瘤大小不等，呈圆形、扁圆形或分叶状，边界清楚，基部较广泛，质软，有假性波动感。

117. 与皮肤粘连的肿物是

- A. 脂肪瘤
- B. 纤维瘤
- C. 皮脂腺囊肿
- D. 神经纤维瘤
- E. 蔓状血管瘤

【正确答案】C

【答案解析】皮脂腺囊肿略隆起，质软，界清，表面与皮肤粘连，稍可移动，肿物中央皮肤表面可见一小孔，有时可见有一黑色粉样小栓。

118. 乳腺癌冲任失调证者，治宜选用

- A. 人参养荣汤
- B. 逍遥散
- C. 二仙汤
- D. 失笑散合开郁散
- E. 清瘟败毒饮合桃红四物汤

【正确答案】C

【答案解析】乳腺癌之冲任失调证。证候：乳中结块，皮核相连，坚硬如石，推之不移；伴有腰膝酸软，女子月经不调，男子遗精阳痿，五心烦热；舌淡无苔，少有龟裂，脉沉无力。治法：调摄冲任，理气散结。方药：二仙汤加味。

119. 乳腺癌毒热蕴结证者，治宜选用

- A. 人参养荣汤
- B. 逍遥散
- C. 二仙汤

- D. 失笑散合开郁散
- E. 清瘟败毒饮合桃红四物汤

【正确答案】E

【答案解析】乳腺癌之毒热蕴结证。证候：身微热，乳房结块增大快，已破溃，状如山岩，形似莲蓬，乳头内陷；舌红绛，苔中剥，脉濡数。治法：清热解毒，活血化瘀。方药：清瘟败毒饮合桃红四物汤加减。

120. 慢性疼痛的治疗中用抗癫痫药治疗属于

- A. 神经阻滞
- B. 椎管内注药
- C. 痛点注射
- D. 针灸疗法
- E. 药物治疗

【正确答案】E

【答案解析】慢性疼痛的药物治疗包括：（1）麻醉性镇痛药；（2）解热镇痛抗炎药；（3）催眠镇静药；（4）抗癫痫药；（5）抗抑郁药。

121. 慢性疼痛的治疗中硬脊膜外腔注药属于

- A. 神经阻滞
- B. 椎管内注药
- C. 痛点注射
- D. 针灸疗法
- E. 药物治疗

【正确答案】B

【答案解析】慢性疼痛的椎管内注药包括：（1）蛛网膜下腔注药；（2）硬脊膜外腔注药。

122. 产后出血的气虚证治法为

- A. 补气固冲，摄血止崩
- B. 活血化瘀，理血归经
- C. 补气固冲，活血化瘀
- D. 活血化瘀，理气通络
- E. 疏肝理气，活血化瘀

【正确答案】A

【答案解析】产后出血之气虚证。证候：新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，头晕目花，心悸怔忡，气短懒言，肢冷汗出，面色苍白；舌淡，脉虚数。治法：补气固冲，摄血止崩。方药：升举大补汤。

123. 产后出血的血瘀证治法为

- A. 补气固冲，摄血止崩
- B. 活血化瘀，理血归经
- C. 补气固冲，活血化瘀

- D. 活血化瘀，理气通络
- E. 疏肝理气，活血化瘀

【正确答案】B

【答案解析】产后出血之血瘀证。证候：新产后，突然阴道大量下血，色黯红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫黯，或有瘀点瘀斑，脉沉涩。治法：活血化瘀，理血归经。方药：化瘀止崩汤。

124. 月经先期的肾气不固证方剂首选

- A. 固阴煎
- B. 清经散
- C. 两地汤
- D. 举元煎
- E. 固经丸

【正确答案】A

【答案解析】月经先期之肾气不固证。证候：月经周期提前，量少，色淡黯，质稀薄，腰膝酸软，头晕耳鸣，夜尿频多；舌淡黯，苔薄白，脉沉细。治法：补肾益气，固冲调经。方药：固阴煎。

125. 月经先期的阳盛血热证方剂首选

- A. 固阴煎
- B. 清经散
- C. 两地汤
- D. 举元煎
- E. 固经丸

【正确答案】B

【答案解析】月经先期之阳盛血热证。证候：月经提前，量多，经色深红或紫红，质稠，面红颧赤，心烦口渴，溲黄便结；舌红苔黄，脉滑数。治法：清热降火，凉血调经。方药：清经散。

126. 产后关节痛之血虚证治宜

- A. 养血益气，温经通络
- B. 养血活络，行瘀止痛
- C. 养血祛风，散寒除湿
- D. 养血活络，散寒除湿
- E. 养血益气，行瘀止痛

【正确答案】A

【答案解析】产后关节痛之血虚证。证候：产后遍身酸痛，肢体麻木，关节酸楚，面色萎黄，头晕心悸；舌淡，苔少，脉细弱。治法：养血益气，温经通络。方药：黄芪桂枝五物汤。

127. 产后关节痛之血瘀证治宜

- A. 养血益气，温经通络
- B. 养血活络，行瘀止痛

- C. 养血祛风，散寒除湿
- D. 养血活络，散寒除湿
- E. 养血益气，行瘀止痛

【正确答案】B

【答案解析】产后关节痛之血瘀证。证候：产后遍身疼痛，或关节刺痛，按之痛甚，恶露量少色黯，小腹疼痛拒按；舌紫黯，脉涩。治法：养血活络，行瘀止痛。方药：生化汤。

128. 胎头围绕骨盆纵轴旋转，使其矢状缝与中骨盆及出口前后径相一致的动作称为

- A. 仰伸
- B. 内旋转
- C. 俯屈
- D. 下降
- E. 衔接

【正确答案】B

【答案解析】内旋转：胎头围绕骨盆纵轴旋转，使其矢状缝与中骨盆及出口前后径相一致的动作称为内旋转。胎头在第一产程末完成内旋转动作。

129. 胎头沿骨盆轴前进的动作称为

- A. 仰伸
- B. 内旋转
- C. 俯屈
- D. 下降
- E. 衔接

【正确答案】D

【答案解析】下降：胎头沿骨盆轴前进的动作称下降。下降动作贯穿于分娩全过程。临幊上以胎头下降的程度作为判断产程进展的重要标志。

130. 小儿积滞之乳积者，首选方剂是

- A. 消乳丸
- B. 保和丸
- C. 健脾丸
- D. 理中丸
- E. 小建中汤

【正确答案】A

【答案解析】小儿积滞之乳食内积证。证候：不思乳食，嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满，疼痛拒按，大便酸臭，或便秘夜眠不安，苔白厚腻，脉象弦滑，或指纹紫滞。治法：消乳化食，和中导滞。方药：乳积者，选消乳丸加减。食积者，选保和丸加减。

131. 小儿积滞之食积者，首选方剂是

- A. 消乳丸
- B. 保和丸
- C. 健脾丸

D. 理中丸

E. 小建中汤

【正确答案】B

【答案解析】小儿积滞之乳食内积证。证候：不思乳食，嗳腐酸馊或呕吐食物、乳片，脘腹胀满，疼痛拒按，大便酸臭，或便秘夜眠不安，苔白厚腻，脉象弦滑，或指纹紫滞。治法：消乳化食，和中导滞。方药：乳积者，选消乳丸加减。食积者，选保和丸加减。

132. 治疗气阴两伤型小儿腹泻首选方剂是

A. 人参乌梅汤

B. 参苓白术散

C. 补中益气汤

D. 附子理中汤

E. 生脉散合参附龙牡救逆汤

【正确答案】A

【答案解析】腹泻之气阴两伤证。证候：泻下过度，质稀如水，精神萎软或心烦不安，目眶及囟门凹陷，皮肤干燥或枯瘪，啼哭无泪，口渴引饮，小便短少，甚至无尿，唇红而干，舌红少津，苔少或无苔，脉细数。治法：健脾益气，酸甘敛阴。方药：人参乌梅汤加减。

133. 治疗阴竭阳脱型小儿腹泻首选方剂是

A. 人参乌梅汤

B. 参苓白术散

C. 补中益气汤

D. 附子理中汤

E. 生脉散合参附龙牡救逆汤

【正确答案】E

【答案解析】腹泻之阴竭阳脱证。证候：泻下不止，次数量多，精神萎靡，表情淡漠，面色青灰或苍白，哭声微弱，啼哭无泪，尿少或无，四肢厥冷，舌淡无津，脉沉细欲绝。治法：挽阴回阳，救逆固脱。方药：生脉散合参附龙牡救逆汤加减。

134. 流行性腮腺炎热毒蕴结常用治疗方剂为

A. 柴胡葛根汤

B. 普济消毒饮

C. 龙胆泻肝汤

D. 清瘟败毒饮

E. 凉营清气汤

【正确答案】B

【答案解析】流行性腮腺炎之热毒蕴结证。证候：高热不退，多见两侧腮部肿胀疼痛，坚硬拒按，张口、咀嚼困难，口渴引饮，烦躁不安，或伴头痛，咽红肿痛，食欲不振，呕吐，便秘溲赤。舌质红，舌苔黄，脉滑数。治法：清热解毒，软坚散结。方药：普济消毒饮加减。

135. 流行性腮腺炎邪陷心肝常用治疗方剂为

- A. 柴胡葛根汤
- B. 普济消毒饮
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 清瘟败毒饮
- E. 凉营清气汤

【正确答案】D

【答案解析】流行性腮腺炎之邪陷心肝证。证候：在腮部尚未肿大或腮肿后5~7天，壮热不退，头痛项强，嗜睡，严重者昏迷，惊厥，抽搐，舌质绛，舌苔黄，脉数。治法：清热解毒，息风开窍。方药：清瘟败毒饮加减。

136. 皮肤黏膜淋巴结综合征卫气同病的治法是

- A. 辛温辟秽，清热解毒
- B. 清热解毒，辛凉透表
- C. 养阴润燥，清肺凉营
- D. 清热解毒，凉营化瘀
- E. 清热解毒，活血化瘀

【正确答案】B

【答案解析】皮肤黏膜淋巴结综合征之卫气同病证。证候：病起急骤，持续发热，不恶寒或微恶风，口渴喜饮，无汗，微咳，目赤头痛，口咽潮红，手掌足底潮红，面部、躯干部初现皮疹，颈部核肿大，胃纳减退，或有吐泻，舌边尖红，苔薄白或薄黄，脉浮数。治法：清热解毒，辛凉透表。方药：银翘散合白虎汤。

137. 皮肤黏膜淋巴结综合征气营两燔的治法是

- A. 辛温辟秽，清热解毒
- B. 清热解毒，辛凉透表
- C. 养阴润燥，清肺凉营
- D. 清热解毒，凉营化瘀
- E. 清热解毒，活血化瘀

【正确答案】D

【答案解析】皮肤黏膜淋巴结综合征之气营两燔证。证候：壮热不已，汗出不畅，渴欲冷饮，目赤唇红，斑疹鲜红，偶有瘙痒，单侧或双侧颈部核肿大，坚硬触痛，表面不红，不化脓，手足呈坚实性肿胀，掌跖及指趾端潮红，杨梅舌，指纹紫或脉细数。治法：清热解毒，凉营化瘀。方药：清营汤。

138. 痰气郁结型郁证，在主方的基础上加

- A. 丰隆、阴陵泉、天突
- B. 心俞、脾俞、足三里、三阴交
- C. 膻中、期门
- D. 通里、心俞、三阴交、太溪
- E. 行间、侠溪、外关

【正确答案】A

【答案解析】郁证之痰气郁结证配丰隆、阴陵泉、天突。

139. 肝气郁结型郁证，在主方的基础上加

- A. 丰隆、阴陵泉、天突
- B. 心俞、脾俞、足三里、三阴交
- C. 膻中、期门
- D. 通里、心俞、三阴交、太溪
- E. 行间、侠溪、外关

【正确答案】C

【答案解析】郁证之肝气郁结证配膻中、期门。

140. 在八脉交会穴中，通阴维脉的是

- A. 列缺
- B. 内关
- C. 外关
- D. 公孙
- E. 太渊

【正确答案】B

【答案解析】八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的 8 个腧穴，均分布于腕踝部上下。公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

141. 在八脉交会穴中，通阳维脉的是

- A. 列缺
- B. 内关
- C. 外关
- D. 公孙
- E. 太渊

www.med66.com

【正确答案】C

【答案解析】八脉交会穴是奇经八脉与十二经之气相交会的 8 个腧穴，均分布于腕踝部上下。公孙通冲脉、内关通阴维脉；后溪通督脉、申脉通阳跷脉；足临泣通带脉、外关通阳维脉；列缺通任脉、照海通阴跷脉。

142. 从耳后，入耳中至目外眦之下的经脉是

- A. 手少阳三焦经
- B. 手太阳小肠经
- C. 足阳明胃经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 足少阳胆经

【正确答案】A

【答案解析】足阳明胃经起于鼻翼两侧上行到鼻根部，与足太阳经交会到前额；太阳膀胱经起于目内眦，上额，交于巅顶；足少阳胆经耳部支脉，从耳后进入耳中，出走耳前，达目外

眦后方；手少阳三焦经耳后支脉，从耳后进耳中，出走耳前，与前脉交叉与面颊部，到达目外眦；手太阳小肠经缺盆部支脉，沿着颈部，上达面颊，至目外眦，转入耳中。

143. 从耳后进入耳中，出走耳前，达目外眦后方的经脉是

- A. 手少阳三焦经
- B. 手太阳小肠经
- C. 足阳明胃经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 足少阳胆经

【正确答案】E

【答案解析】足阳明胃经起于鼻翼两侧上行到鼻根部，与足太阳经交会到前额；太阳膀胱经起于目内眦，上额，交于巅顶；足少阳胆经耳部支脉，从耳后进入耳中，出走耳前，达目外眦后方；手少阳三焦经耳后支脉，从耳后进耳中，出走耳前，与前脉交叉与面颊部，到达目外眦；手太阳小肠经缺盆部支脉，沿着颈部，上达面颊，至目外眦，转入耳中。

144. 手太阴肺经的原穴是

- A. 列缺
- B. 孔最
- C. 少商
- D. 太渊
- E. 鱼际

【正确答案】D

【答案解析】手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。



145. 手太阴肺经的输穴是

- A. 列缺
- B. 孔最
- C. 少商
- D. 太渊
- E. 鱼际

【正确答案】D

【答案解析】手太阴肺经的输穴及原穴都是太渊。

www.med66.com

146. 悬钟穴的定位是

- A. 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处
- B. 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中
- C. 外踝高点上 2 寸，腓骨前缘
- D. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘
- E. 外踝高点上 4 寸，腓骨前缘

【正确答案】D

【答案解析】悬钟穴：外踝高点上 3 寸，腓骨前缘。

147. 丘墟穴的定位是

- A. 内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点处
- B. 外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中
- C. 外踝高点上 2 寸，腓骨前缘
- D. 外踝高点上 3 寸，腓骨前缘
- E. 外踝高点上 4 寸，腓骨前缘

【正确答案】B

【答案解析】丘墟穴：在外踝前下方，趾长伸肌腱的外侧凹陷中。

148. 设区的市级地方医学会负责组织

- A. 处理医疗事故工作
- B. 首次医疗事故技术鉴定工作
- C. 再次医疗事故技术鉴定工作
- D. 申请再次鉴定
- E. 医疗事故赔偿

【正确答案】B

【答案解析】《医疗事故处理条例》第二十一条规定：“设区的市级地方医学会和省、自治区、直辖市直接管辖的县（市）地方医学会负责组织首次医疗事故技术鉴定工作。省、自治区、直辖市地方医学会负责组织再次鉴定工作。”

149. 造成患者明显人身损害的其他后果的属于

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 五级医疗事故

【正确答案】D

【答案解析】根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍的；三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

150. 造成患者死亡、重度残疾的属于

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故
- E. 五级医疗事故

【正确答案】A

【答案解析】根据对患者人身造成的损害程度，医疗事故分为四级：一级医疗事故：造成患者死亡、重度残疾的；二级医疗事故：造成患者中度残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍

的；三级医疗事故：造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的；四级医疗事故：造成患者明显人身损害的其他后果的。

