

2019 年口腔执业助理医师第 2 单元

一、A1 型题

1. 恒牙牙根未发育完全的死髓牙应采用的促使根尖继续形成的治疗方法是

- A. 活髓切断术
- B. 根管治疗术
- C. 牙髓摘除术
- D. 根尖诱导成形术
- E. 倒充填术

2. 年轻恒牙根尖敞开、牙根未发育完全的死髓牙，应采用

- A. 牙髓切断术
- B. 盖髓术
- C. 牙髓摘除术
- D. 根尖诱导成形术
- E. 根管治疗术

3. 乳牙根管充填可用下列哪种材料

- A. 氧化锌丁香油糊剂
- B. 牙胶尖碘仿糊剂
- C. 氧化锌和牙胶尖
- D. 酚醛树脂
- E. 热牙胶

4. 年轻恒牙的根尖周病多由以下哪种疾病发展而来

- A. 龋坏
- B. 牙龈炎
- C. 继发龋
- D. 牙髓炎
- E. 牙外伤

5. 属于年轻恒牙牙髓的特点的是

- A. 组织疏松
- B. 血运丰富
- C. 防御修复功能强
- D. 抗病能力强
- E. 以上都是

6. 引起乳牙根尖周病的主要病因是

- A. 乳牙外伤
- B. 重度磨耗
- C. 牙髓感染
- D. 化学烧伤
- E. 先天畸形

7. 下列哪一项不属于乳牙牙髓炎的特点

- A. 上、下乳磨牙好发
- B. 炎症扩展迅速
- C. 去腐未净露髓表明牙髓有慢性炎症
- D. 牙髓感染波及根髓时可有叩痛
- E. 牙髓感染可伴发牙根吸收

8. 乳牙常用的根管充填材料是

- A. 氧化锌丁香油糊剂+银尖
- B. 氧化锌丁香油糊剂+牙胶尖
- C. 氢氧化钙制剂+牙胶尖
- D. 氢氧化钙制剂+银尖
- E. 氢氧化钙制剂

9. 乳牙接近替换期的表现错误的一项是

- A. 恒牙胚位置已接近乳牙根分叉
- B. 临床比较松动
- C. 恒牙胚牙根已完全形成
- D. 牙体破坏大
- E. 有乳牙根吸收

10. 乳牙龋齿治疗原则如下，除外

- A. 降低咬合高度
- B. 去除病变组织
- C. 恢复牙体外形
- D. 提高咀嚼功能
- E. 利于恒牙列的形成

11. 群组研究的主要目的是

- A. 描述疾病分布特征，寻找病因线索
- B. 探讨暴露组与非暴露组的发病情况及其差别，并验证病因假说
- C. 探讨干预措施在干预组与非干预组的效果及差别，评价干预效果
- D. 探讨病例组与对照组之间对某些因素暴露的差别，检验病因假说
- E. 描述疾病组与对照组的分布特征，进行临床比较

12. 描述性流行病学研究方法之一的横断面调查也称

- A. 现况调查
- B. 现场实验
- C. 常规资料分析
- D. 病例-对照研究
- E. 群组研究

13. 口腔流行病学定义包括

- A. 研究人群中口腔疾病发生
- B. 研究人群中口腔疾病发展
- C. 研究口腔健康及其影响因素
- D. 探讨口腔疾病的病因和流行因素
- E. 以上都正确

14. 下列选项中哪一项是影响龋病流行的最主要因素

- A. 钙磷摄入的比例与摄入量
- B. 刷牙的时间与频率
- C. 钙的摄入量与摄入频率
- D. 糖的摄入量与摄入频率
- E. 就诊的医疗级别与次数



15. DMFT 中的 D 所指的是

- A. 缺失的牙数
- B. 因龋丧失的牙数
- C. 龋坏的牙
- D. 因牙周病丧失的牙数
- E. 因龋充填的牙



16. Dean 分类依据中不包括下列哪项

- A. 釉质表面光泽度
- B. 颜色改变程度
- C. 釉质缺损的程度
- D. 釉质的硬度
- E. 侵犯面积



17. 诊断口腔念珠菌病的实验室检测方法包括

- A. 涂片法
- B. 培养法
- C. 活检法
- D. 免疫学法
- E. 以上均正确



18. 更易患口腔念珠菌病的人群为

- A. 嗜烟者
- B. 嗜酒者
- C. 更年期妇女
- D. 患有胆道疾病者
- E. 长期大量应用抗生素者



19. 临床怀疑口腔念珠菌感染时，临床上最常用的辅助诊断技术为

- A. 涎液及血清念珠菌抗体测定
- B. 血清铁及维生素 B<sub>12</sub> 测定
- C. 活体组织检查
- D. 唾液培养
- E. 直接在病损区涂片镜检



20. 下列哪一项是疱疹性龈口炎的病原体

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 真菌



- D. 衣原体
- E. 立克次体

21. 下列哪一项不是口腔念珠菌病的诱因

- A. 长期使用免疫抑制剂
- B. 患有慢性消耗性疾病
- C. 酸性口腔环境
- D. 长期使用广谱抗生素
- E. 碱性口腔环境



22. 下列有关复发性阿弗他溃疡治疗措施中，能够起到促进愈合的作用的是

- A. 口腔局部消炎，止痛、促愈合
- B. 手术切除
- C. 外用重组人表皮生长因子
- D. 针对与发病有关的全身和局部因素治疗
- E. 补充营养



23. 可能与光照有关的疾病是

- A. 血管神经性水肿
- B. 黏膜良性类天疱疮
- C. 营养不良性口角炎
- D. 手-足-口病
- E. 慢性非特异性唇炎



24. 口腔白斑分型如下，除外

- A. 均质型
- B. 溃疡型
- C. 疣状型
- D. 颗粒型
- E. 增生型




25. 下列口腔黏膜病中癌变风险最高的一项是

- A. 白色海绵状斑痣
- B. 带状疱疹
- C. 天疱疮
- D. 白斑
- E. 轻型阿弗他溃疡



26. 口腔白斑病可发生于

- A. 舌腹黏膜
- B. 面部皮肤
- C. 唇红及唇黏膜
- D. 口底黏膜
- E. 软、硬腭黏膜



27. 下列有关白斑的发病病因中，不正确的是

- A. 与吸烟有关

- B. 与金黄色葡萄球菌感染有关
- C. 与食物刺激有关
- D. 与机械刺激有关
- E. 与不良修复体有关

28. 关于白斑的发病因素，下列哪项最可能引起白斑

- A. 菌斑牙石可导致白斑
- B. 戒烟可导致白斑
- C. 高血压易患白斑
- D. 咀嚼槟榔可导致白斑
- E. 白斑有家族遗传倾向

29. 关于白斑的临床分型下列哪项说法是错误的

- A. 非均质性分为疣状型、颗粒型和溃疡型
- B. 均质型表现为均质斑块或表面有皱褶
- C. 非均质性包括疣状型、颗粒型和萎缩性
- D. 分为均质型和非均质型
- E. 疣状型属于非均质型

30. 以下关于口腔白斑病恶变倾向，说法不正确的是

- A. 年龄越大，得病时间越长，越易恶变
- B. 女性患者恶变率较高
- C. 位于舌缘、舌腹、口底及口角区的病损恶变率较高
- D. 均质型易恶变
- E. 伴有上皮异常增生的病损恶变率较高

31. 舌乳头炎中丝状乳头炎表现为

- A. 水肿，充血
- B. 褶皱加深，红肿
- C. 该处可发生恶性肿瘤
- D. 萎缩，舌背光滑
- E. 以上均不正确

32. 下颌智齿冠周炎导致下颌前庭沟骨膜下形成的脓肿常发生在

- A. 第一前磨牙
- B. 第二前磨牙
- C. 第一磨牙
- D. 第二磨牙
- E. 第三磨牙

33. 下列哪一项是急性龋的临床表现为

- A. 龋坏牙本质着色深
- B. 进展与全身情况无关
- C. 多见于中、老年人
- D. 病变进展较平稳
- E. 龋洞内腐质湿软

34. 根面龋中最易找到的细菌为下列哪一项

- A. 韦永菌
- B. 变形链球菌
- C. 乳杆菌
- D. 螺旋体
- E. 放线菌

35. 龋病按照病变侵入牙齿的深度的分类正确的是

- A. 窝沟龋、平滑面龋、根面龋
- B. 干性龋、湿性龋
- C. 急性龋、慢性龋、静止性龋
- D. 浅龋、中龋、深龋
- E. 窝沟龋、平滑面龋

36. 牙周探诊深度(PD)说法不正确的是

- A. 炎症时探针过结合上皮进入炎症的结缔组织
- B. 炎症时探针止于炎症的结缔组织下方正常纤维的冠方
- C. 健康组织探针进入结合上皮的 1/3~1/2
- D. PD>组织学上的龈沟或牙周袋深度
- E. 健康组织探针止于结合上皮冠方

37. 牙周病的局部促进因素，除外

- A. 牙石
- B. 食物嵌塞
- C. 创伤性(牙合)力
- D. 细菌
- E. 不良修复体

38. 下列因素能改变牙周组织对菌斑的刺激反应，除外

- A. 性激素
- B. 肾上腺激素
- C. 甲状旁腺激素
- D. (牙合)创伤
- E. 糖尿病

39. 用有刻度的牙周探针探测牙周袋时应注意下列几点，除了

- A. 支点应稳
- B. 探测力量应掌握恰当
- C. 探测角度要垂直
- D. 探测位置和角度要恰当
- E. 按顺序探测

40. 与牙周组织破坏关系最为密切的菌斑是

- A. 龈下菌斑
- B. 龈上菌斑
- C. 附着菌斑

D. 非附着性龈下菌斑

E. 光滑面菌斑

41. 下列有关氟牙症的叙述中，不正确的是

- A. 6~7 岁后才进入高氟区生活，不会出现氟牙症
- B. 氟牙症多发生在恒牙，乳牙很少见
- C. 氟牙症牙数目多少取决于牙发育矿化时期在高氟区生活时间的长短
- D. 氟牙症是由于氟的急性中毒造成的
- E. 氟牙症属于地方性慢性氟中毒

42. 牙周炎患者最适宜使用刷牙方式是

- A. 横刷牙
- B. 圆弧法
- C. 竖刷牙
- D. 旋转刷牙法
- E. 巴斯刷牙法

43. 最有利于检查牙隐裂的方法是

- A. 碘染色
- B. X 线片
- C. 视诊
- D. 探诊
- E. 热诊

44. 关于慢性闭锁性牙髓炎病理变化，哪项除外

- A. 淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞浸润
- B. 肉芽组织形成
- C. 脓肿形成
- D. 血管扩张充血
- E. 上皮增生

45. 根管最狭窄处理解错误的一项是

- A. 距根尖 0.5~1mm
- B. X 线片上根尖的位置
- C. 根尖狭窄
- D. 根尖牙本质-牙骨质界
- E. 生理性根尖孔

46. 对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行定期考核，依法享有定期考核权的单位是

- A. 县级以上人民政府
- B. 县级以上卫生行政部门
- C. 医师所在的医疗、预防、保健机构
- D. 医师所在地的医学会或医师协会
- E. 受卫生行政部门委托的机构或者组织

47. 下列哪种情形中可以准予医师执业资格注册
- A. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止不满两年的
  - B. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止已满两年的
  - C. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满两年的
  - D. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请之日止不满一年的
  - E. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满一年的
48. 因考核不合格，暂停执业活动期满，经培训后再次考核仍不合格的
- A. 再次接受培训
  - B. 在执业医师指导下从事执业活动
  - C. 注销注册，收回医师执业证书
  - D. 可再试用一年
  - E. 暂停执业活动三年
49. 具有高等学校医学专科学历，参加执业助理医师资格考试，至少应在医疗、预防、保健机构中试用期满
- A. 六个月
  - B. 一年
  - C. 十八个月
  - D. 二年
  - E. 三年
50. 以师承方式学习传统医学至少满多长时间，经卫生行政部门指定的组织考核合格并推荐，才可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试
- A. 二年
  - B. 三年
  - C. 五年
  - D. 一年
  - E. 四年
51. 下列哪一项不予医师执业注册
- A. 受过刑事处罚的
  - B. 受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止满 3 年的
  - C. 不具有完全民事行为能力的
  - D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的
  - E. 受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚之日起至申请注册之日止不满 3 年的
52. 下列哪一项是医师在执业活动中享有的权利
- A. 宣传普及卫生保健知识
  - B. 尊重患者隐私权
  - C. 人格尊严、人身安全不受侵犯
  - D. 努力钻研业务，及时更新知识
  - E. 爱岗敬业，努力工作
53. 下列哪种情形无须注销执业医师注册



- A. 医师被宣告失踪
- B. 医师负有民事责任
- C. 医师中止执业活动满二年
- D. 医师死亡
- E. 医师受吊销医师执业证书的行政处罚

54. 当事人对首次医疗事故技术鉴定结论不服，自收到首次鉴定结论之日起几日内提出再次鉴定申请

- A. 5 日
- B. 7 日
- C. 10 日
- D. 15 日
- E. 30 日

55. 未经医师（士）亲自诊查患者或亲自接产，医疗机构不得出具的证明文件是

- A. 健康证明书
- B. 死产报告书
- C. 死亡证明书
- D. 疾病诊断书
- E. 以上均需要

二、A2 型题

56. 患儿，女，5 岁。下颌乳中切牙Ⅲ° 松动，拟拔除，最佳的表面麻醉麻醉药物是

- A. 4%阿替卡因
- B. 0.25%~0.5%盐酸丁卡因
- C. 2%普鲁卡因
- D. 2%利多卡因
- E. 0.5%布比卡因

57. 患者，女，50 岁，既往体健。右侧下颌第二磨牙残冠拟行拔除，如行下牙槽神经阻滞麻醉口内法的进针点应在

- A. 下颌牙咬合面上方 1.0cm
- B. 磨牙后垫上方 1.0cm 处
- C. 下颌韧带中央稍内侧
- D. 磨牙后窝最后部
- E. 颊脂垫尖

58. 患者，女，28 岁，拔除右下第三磨牙，拟行切开拔除阻生智齿的切口设计，手术操作过程中，不正确的是

- A. 远中切口尽量偏舌侧
- B. 颊侧切口与远中切口的末端成 45° 角向下，勿超过前庭沟
- C. 应作黏骨膜全层切开，紧贴骨面将瓣翻起
- D. 如用远中切口就可以消除阻力，可不作颊侧切口
- E. 缝合后切口下应有足够骨支持

59. 患者，男，23 岁。左下颌第三磨牙拔除后 3 小时，出血不止，否认有全身性疾病。以下出血的原因中，不可能是

- A. 软组织撕裂
- B. 牙槽骨骨折
- C. 拔牙创感染后出血
- D. 牙槽窝内残留炎性肉芽组织
- E. 患者自行漱口，血块脱落

60. 患者，女，26 岁。初孕，妊娠第 12 周牙痛。检查：右下第一磨牙牙体破坏大，无法保留，需拔除，抗炎治疗后最佳的拔除时间是

- A. 即刻拔除
- B. 1 周后
- C. 2 周后
- D. 3 周后
- E. 4 周后

61. 患者，男，19 岁。1 小时前踢球时跌伤来院急诊。检查见唇部撕裂伤，有明显活动性出血，最佳的止血方法是

- A. 钳夹、结扎止血
- B. 阻断止血
- C. 压迫止血
- D. 药物止血
- E. 低温止血

62. 患儿，6 个月，右上唇不完全裂，鼻底正常，左侧红唇至鼻底完全裂开，对该患者的诊断分类属于

- A. 单侧不完全性唇裂

- B. 单侧完全性唇裂
- C. 双侧不完全性唇裂
- D. 双侧完全性唇裂
- E. 双侧混合性唇裂

63. 患儿，男，8岁。颈部曾受到冲击伤，进行性开口困难2年。检查见右面部丰满，右侧下颌体、下颌支短小，开口度10mm，开口型偏右，右髁突无滑动。最可能的诊断是

- A. 右喙突肥大
- B. 左关节外强直
- C. 右关节内强直
- D. 左髁突良性肥大
- E. 右关节盘不可复性前移位

64. 患儿，男，2岁。双侧完全性腭裂，其临床表现不包括

- A. 常与双侧唇裂同时发生
- B. 裂隙在前颌骨部分
- C. 向两侧斜裂，直达牙槽突
- D. 鼻中隔、前颌突及前唇部分孤立于中央
- E. 腭垂可完整

65. 某患者，男，40岁。颧骨骨折，检查：颧面部塌陷，开口受限。颧骨骨折移位后，可因眼球移位。X线片检查常用

- A. 鼻颧位
- B. (牙合)翼片
- C. 下颌下腺造影侧位片
- D. 上颌骨升支切线位片
- E. 上颌前部(牙合)片

66. 患者女，囊肿发生于牙冠或牙根形成之后，在缩余釉上皮与牙冠面之间出现液体渗出形成，可来自一个牙胚，也有来自多个牙胚，最可能的诊断为

- A. 含牙囊肿
- B. 残余囊肿
- C. 根端囊肿

D. 始基囊肿

E. 根尖周囊肿

67. 某患者，三叉神经痛，检查“扳机点”位置为下眼睑、鼻唇沟、鼻翼、上唇、鼻孔下方或口角区，根据此位置判断分支为

A. 眼支

B. 鼻支

C. 口支

D. 上颌支

E. 下颌支

68. 某患者女性，口腔一般检查，X 线表现为牙冠严重磨损，变短小，牙本质在髓腔侧的异常形成，致使髓室和根管部分或全部闭塞，根据此检查诊断为

A. 根尖周囊肿

B. 根尖周脓肿

C. 根尖周肉芽肿

D. 根尖致密性骨炎

E. 遗传性乳光牙本质

69. 患者男颅脑损伤，上颌骨骨折。颅面分离，常使面中部凹陷、变长。出现耳、鼻出血或脑脊液漏。诊断为

A. LeFort I 型骨折

B. LeFort II 型骨折

C. 水平骨折

D. 锥形骨折

E. 上颌骨高位骨折

70. 某患者，男，48 岁，口腔颌面部外伤，有昏迷史，患者昏迷一段后清醒，随后头痛加剧、不安，进而嗜睡，再次进入昏迷状态，伤侧瞳孔散大，对光反射消失，根据上述症状该患者应首先考虑

A. 脑震荡

B. 脑水肿

C. 脑挫裂伤

D. 蛛网膜下血肿

E. 硬脑膜外血肿

71. 患者，男，22 岁，因外伤导致下唇正中撕裂，形成楔状缺损，其范围约为下唇的 1/5。

以下处理原则中哪项是不正确的

A. Z 成形术

B. 直接拉拢缝合

C. 采用上唇组织瓣转移修复下唇缺损

D. 应用抗生素

E. 注射破伤风抗毒素

72. 患者，男，22 岁。左侧面颊部皮下一肿物，缓慢生长，穿刺检查可抽出乳白色豆渣样分泌物，有时大体标本可见毛发。在镜下可见有脱落的上皮细胞、毛囊和皮脂腺等结构。可诊断为

A. 皮脂腺囊肿

B. 皮样囊肿

C. 根尖囊肿

D. 表皮样囊肿

E. 鳃裂囊肿

73. 一口腔颌面部损伤患者，如出现瞳孔变大，并伴有意识障碍，常提示同侧颅内

A. 脑震荡

B. 脑挫裂伤

C. 蛛网膜下血肿

D. 硬脑膜外血肿

E. 血肿或水肿

74. 某医学生希望毕业后成为一名骨科医生，在临床实习中主动向老师请教，并能结合临床案例查阅相关文献。他的行为表现在意志品质中属于

A. 坚韧性

B. 果断性

C. 随意性

D. 自制力

E. 自觉性

75. 一名医生在与患者交流时，不仅与患者进行言语上的沟通，同时，在倾听患者表达时，也通过“点头”“微笑”等表情动作与患者互动，同时，也通过目光交流感受患者的心理状态，这些表情动作、目光交流属于医患沟通中的

A. 言语沟通

B. 非言语沟通

C. 信息互动

D. 医生的同情心

E. 主动-被动关系模式

76. 患者，后牙游离缺失十余年，颊部软组织向内凹陷。行可摘局部义齿修复后，咬颊黏膜。处理中正确的是

A. 应减小后牙覆盖

B. 加厚基托推开颊肌

C. 升高下颌平面

D. 磨除下颌人工牙的舌面

E. 重新排列后牙

77. 患者，男性，67岁，患牙左下6因重度磨耗露髓，拟行根管治疗，常规根管治疗的步骤为

A. 根管清理、预备和充填

B. 根管封药和充填

C. 根管清理和充填

D. 根管预备、消毒和充填

E. 根管清理、封药和充填

78. 患者女，44岁，因右上后牙自发痛就诊。放散性痛，牵扯至头面部，两天来加重，夜间痛明显，无法入睡。检查：右上第一磨牙牙体未见明显异常，温度测试迟发性疼痛，X线显示髓腔内有阻射的钙化物，实施治疗正确的方法是

A. 活髓切断

B. 根管治疗

C. 安抚治疗

D. 牙拔除术

E. 口服卡西平

79. 某知名品酒师，55 岁，因牙齿疼痛就诊。一周前曾于外院治疗，未见好转，反而加重，右上后牙夜间剧烈疼痛，疼痛不能定位。检查右上第一磨牙近中邻（牙合）面复合树脂充填，探诊边缘密合，温度测试剧烈疼痛，含冷水可短时间缓解疼痛，叩痛（±），正确处理为

A. 去除原充填物，氧化锌丁香油粘固粉暂封

B. 去除原充填物，更换玻璃离子充填

C. 开髓，冠髓切断术

D. 开髓引流

E. 拔除患牙

80. 患者男，9 岁。体育课上跑步比赛中摔倒，致上前牙切角折断，暴露针尖大小穿髓孔。若患者就诊及时，最佳处理方式为

A. 间接盖髓术

B. 活髓切断术

C. 直接盖髓术

D. 根管治疗术

E. 根尖诱导成形术

81. 女，50 岁。下前牙松动 1 年。检查：1|1 松动 I 度，牙石(+++)，牙龈退缩 3mm，探诊深度 4mm。全口其他牙结石(++)，牙龈缘及乳头暗红，探诊出血(+)，探诊深度普遍 5~6mm，有附着丧失。最可能的诊断为

A. 龈乳头炎

B. 慢性牙周炎

C. 慢性龈缘炎

D. 牙周-牙髓联合病变

E. 侵袭性牙周炎

82. 男性患者，42 岁，建筑工人，因左下后牙肿痛，口服“华素片”、止疼药无效，赴医院求治。检查：全口附着丧失约 3mm，牙龈红肿，36 牙周袋溢脓，可扪及波动感，温度测试正常。37 远中邻面龋，龋洞深大近髓，探诊敏感，温度测试正常。38 近中水平阻生，牙龈无红肿，见少量食物残渣。导致疼痛主要原因在于

- A. 36 牙龈脓肿
- B. 36 牙槽脓肿
- C. 36 牙周脓肿
- D. 37 牙髓炎
- E. 38 冠周炎

83. 患者男，63 岁，退休教师，近期全口牙齿松动。高血压，坚持服药，三年前检查有糖尿病，坚持吃药及体育锻炼，血糖控制良好。口腔检查：牙周袋=6mm，附着丧失 3~4mm，X 线片显示牙槽骨角型吸收超过根长的 1/3，但不超过根长的 1/2。最有可能诊断为

- A. 药物性牙龈增生
- B. 急性牙周脓肿
- C. 慢性牙周炎（轻度）
- D. 慢性牙周炎（中度）
- E. 慢性牙周炎（重度）

84. 某患者，女，28 岁，牙齿松动，牙龈肿大求治。检查：全口卫生一般，牙龈鲜红，下颌前牙区、磨牙区牙石覆盖 I°，上颌腭侧牙乳头肿胀明显，探诊易出血。33-43 松动 II°，附着丧失 5mm。35、36、37、45、46、47 附着丧失 4~5mm，松动 II°。导致患者牙齿松动的主要疾病是

- A. 慢性牙龈炎
- B. 慢性牙周炎
- C. 妊娠期龈炎
- D. 局限型侵袭性牙周炎
- E. 广泛型侵袭性牙周炎

85. 在非典疫情突发时，及时公开相关信息，对于增强群众的防范意识、有效控制疫情的措施等方面非常的必要，这体现了公共卫生伦理原则中的

- A. 全社会参与原则
- B. 社会公益原则
- C. 社会公正原则
- D. 互助协同原则
- E. 信息公开原则



86. 为急诊患者开具的麻醉药品缓释剂，每张处方不得超过

- A. 1 日用量
- B. 2 日用量
- C. 3 日用量
- D. 5 日用量
- E. 7 日用量

87. 《精神卫生法》规定，能够为精神障碍患者提供康复的场所和条件的机构是

- A. 患者自己家庭
- B. 患者旁系亲属家庭
- C. 社区康复机构
- D. 省级精神类医院
- E. 当地儿童福利院

88. 患儿 9 岁，上中切牙间有 2mm 间隙，上颌侧切牙萌出 2/3，首要的处理是

- A. 不做任何处理观察
- B. 固定矫治器矫治关闭间隙
- C. 活动矫治器关闭间隙
- D. 橡皮圈矫治关闭间隙
- E. 拍 X 线片查看有无多生牙

89. 患儿 5 岁，下颌乳中切牙 II 度松动，舌侧有恒中切牙萌出三分之一，应该诊断为

- A. 下颌恒中切牙移位
- B. 下前牙拥挤
- C. 下颌恒中切牙早萌
- D. 下颌乳中切牙滞留
- E. 以上都不是

90. 某患儿 8 岁，因上颌中切牙形状异常赴医院就诊，检查发现左上中切牙弯曲，弯曲牙形成最常见的原因是

- A. 遗传
- B. 营养不良
- C. 乳牙外伤

D. 乳牙慢性根尖周炎伤及恒牙胚

E. 多生牙

91. 某小学开展科普讲座，指导小学生在发生牙齿外伤意外脱出时，应该妥善保管脱出牙齿。

其中保存脱出牙的方法正确的是

A. 放在果汁里

B. 放在可乐里

C. 放在食用油里

D. 含在嘴里，唾液浸泡

E. 冲洗干净，擦干包在干布里

92. 患儿 7 岁，因右下牙龋洞长期嵌塞食物，近期出现嵌塞痛就诊求治。检查：右下第一恒磨牙萌出 2/3，（牙合）面深龋洞，龋损边缘位与龈缘在同一水平，下列治疗计划合理的是

A. 拔除患牙

B. 常规去腐充填

C. 切除牙龈，备洞充填

D. 冠延长术后，去腐充填

E. 再矿化治疗

93. 患者，男，55 岁，右颊黏膜出现一白色斑块，均质状，不能被擦去，触诊无明显疼痛，涂片镜检三次未找到芽孢或菌丝，右下尖牙至第一磨牙为不良修复体，无吸烟、酗酒史，治疗措施不妥的是

A. 硝酸银局部处理白色斑块，以促进斑块消退

B. 定期随诊，如出现恶变指征，可考虑早期手术切除

C. 去除不良修复体

D. 0.2% 维甲酸局部涂擦

E. 口服维生素 A

94. 患者，男性，19 岁，诉腭部溃疡 2 个月余，口服消炎类药物未愈，曾有多次类似发作史。

口腔检查：右上软腭部黏膜可见一直径 1~2cm 溃疡面，深及黏膜肌层，溃疡中央部可探穿，边缘清晰，稍隆起，似弹坑状，溃疡基底硬结，触痛明显。可诊断为

A. 复发性坏死性黏膜腺周围炎

B. 癌性溃疡

- C. 结核性溃疡
- D. 创伤性溃疡
- E. 坏死性涎腺化生

95. 患者，女性，18 岁，上下唇红部反复糜烂、渗出、结痂、灼痛伴瘙痒一年，时轻时重，秋冬季较重。考虑诊断为

- A. 过敏性唇炎
- B. 慢性光化性唇炎
- C. 慢性糜烂性唇炎
- D. 慢性脱屑性唇炎
- E. 浆细胞性唇炎

96. 患儿，8 月龄，因患儿哭闹，舌下部有溃疡来院就诊。检查见患儿下颌萌出两颗乳中切牙，切缘较锐，舌系带较短，舌系带及周围粘膜处有充血、肿胀、溃疡。家长自述患儿每次吸奶时间都比较长，考虑该溃疡属于

- A. 复发性阿弗他溃疡
- B. Riga-Fede 溃疡
- C. 压疮性溃疡
- D. 白塞病
- E. 结核性溃疡

### 三、A3/A4 型题

(97~99 题共用题干)

为了预防学校儿童（7 岁）龋病的发生，拟采用氟水漱口防龋。

97. 使用氟水漱口的剂量是每次用

- A. 1ml
- B. 5ml
- C. 10ml
- D. 15ml
- E. 20ml

98. 每次含漱的时间是

- A. 4 分钟

B. 3 分钟

C. 2 分钟

D. 1 分钟

E. 半分钟

99. 氟水漱口的氟化物主要是

A. 氟化亚锡

B. 酸性磷酸氟

C. 单氟磷酸钠

D. 氟化铵

E. 中性或酸性氟化钠

(100~102 题共用题干)

患者，男性，42 岁，数月来右下后牙常进食后疼痛，偶自发痛及冷、热刺激痛，自服抗生素可缓解，1 天前进食后复发。检查：见口腔卫生差，龈上、下结石多，牙龈轻度充血水肿，右下 678 牙体完整，右下 7 叩(+)，右下 8 颊向错位，伸长无对颌，右下 8 与右下 7 之间有较多食物残渣，龈乳头中度充血水肿，压痛，未探及牙周袋，右下 678X 线片未见异常。

100. 导致该症状出现的促进因素是

A. 牙石

B. 食物嵌塞

C. (牙合) 创伤

D. 错(牙合) 畸形

E. 牙菌斑

101. 最可能的诊断是

A. 右下 7 牙髓炎

B. 右下 8 牙髓炎

C. 右下 7、8 龈乳头炎

D. 右下 7、8 单纯性龈炎

E. 右下 7 牙周-牙髓联合病变

102. 最根本的处理办法是

A. 拔除右下 8

- B. 拔除右下 8，根管治疗右下 7
- C. 全口龈上、下洁治
- D. 右下 7、8 牙周冲洗上药
- E. 以上都不对

(103~105 题共用题干)

女性患者，43 岁，更年期综合征，心烦急躁，因牙齿咬硬物出血而前来就诊。自述一年前牙龈肿痛，使用某牌牙膏，有所减轻，但是在上星期吃桃子口腔出血，遂前来就诊。查：全口牙龈广泛红肿，探诊出血，龈上牙石较少，但是龈下牙石较多，全口牙牙周探诊深度平均为 5mm，且探及釉牙骨质界下。牙间隙嵌塞食物。全口牙齿颈部楔状缺损，探诊探查敏感。口腔黏膜无异常，右上 4（牙合）面为全瓷嵌体修复，左下 6（牙合）面龋洞仅波及牙釉质，探诊质软，不敏感。

103. 针对患者的检查情况，以下实施的治疗方法错误的是

- A. 龈上洁治
- B. 龈下刮治
- C. 修复楔缺
- D. 龋洞充填
- E. 根管治疗

104. 若上颌 6 的颊侧牙周袋探诊深度为 6mm，附着丧失为 3.5mm，且根尖片显示牙槽骨水平吸收未超过根长的 1/2，牙齿有轻度松动。则慢性牙周炎的分度应该为

- A. 极轻度
- B. 轻度
- C. 中度
- D. 重度
- E. 极重度

105. 对于此患者的主要诊断应该为

- A. 牙龈炎
- B. 牙槽脓肿
- C. 慢性牙周炎
- D. 食物嵌塞

E. 楔状缺损

(106~108 题共用题干)

患儿 8 岁，上颌中切牙一周前因车祸导致牙冠折裂，近 3 天牙齿疼痛明显求治。检查：上颌双侧中切牙中 1/3 处折断，穿髓孔大，深探诊剧烈疼痛，有脓液流出，冷热刺激痛剧烈。牙齿不松动，叩痛 (++)，X 线显示根尖呈喇叭口状。全口卫生差，有腐败臭味。

106. 对于患牙治疗首选治疗方案是

A. 直接盖髓术

B. 冠髓切断术

C. 根管治疗术

D. 根尖诱导成形术

E. 牙拔除术

107. 对于急性期处理正确的是

A. 脓肿切开引流

B. 局麻下拔髓、开放引流

C. 局麻下拔髓、扩通根尖以便引流

D. 口服止痛药、消炎药，炎症消除拔除患牙

E. 局麻下拔髓扩管、氢氧化钙封药

108. 根管消毒药物选择不当的是

A. CP

B. FC

C. 碘仿

D. 抗生素

E. 木榴油

(109~111 题共用题干)

患者，女性，23 岁，口腔多处溃疡十余年，复发一周，疼痛影响进食。口腔检查：双颊、舌及口底黏膜可见粟米样溃疡十余个，散在分布，周围黏膜充血明显，患者以往多次类似发作史。

109. 该疾病可以诊断为

A. 疱疹性咽峡炎

B. 疱疹性龈口炎

C. 白塞病

D. 带状疱疹

E. 疱疹样口疮

110. 以下哪些可能是该疾病的病因

A. 免疫因素

B. 遗传因素

C. 感染因素

D. 环境因素

E. 以上病因均有可能

111. 对于该疾病的诊断，一般不需要

A. 询问病史

B. 检查临床体征

C. 询问复发性规律

D. 询问相关系统疾病

E. 活检

(112~114 题共用题干)

某患者，女，30 岁。牙列缺损，左下 4 和右下 5 缺失。检查：患者口腔卫生差，大量牙石菌斑，牙槽骨水平吸收。患者要求高，要求固定义齿修复。

112. 此患者修复前必要的处理是

A. 全口洁治

B. 拔除患牙

C. 控制血糖

D. 控制血压

E. 服用抗生素

113. 患者下颌牙列属于肯氏分类的

A. 第一类

B. 第二类

C. 第三类

D. 第四类

E. 第三类的第一亚类

114. 若行左下 345 双端固定桥修复，X 线显示左下 3 的牙槽骨吸收，若作为基牙，则要求吸收最多不超过根长的

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1/4

E. 3/4

四、B 型题

(115~117 题共用题干)

A. 血肿

B. 感染

C. 感觉异常

D. 暂时性面瘫

E. 暂时性牙关紧闭

115. 下牙槽神经阻滞麻醉时，注射针偏向后外，致麻药注入腮腺内麻醉面神经发生

116. 下牙槽神经阻滞麻醉时注射不准确，麻药注入翼内肌或咬肌内，使肌肉失去收缩功能，会出现

117. 上牙槽后神经阻滞麻醉时刺伤静脉丛，出现

(118~120 题共用题干)

A. 下颌骨粉碎性骨折，引起舌后坠阻塞呼吸道

B. 昏迷患者直接将呕吐物吸入气管

C. 及早清除口鼻腔异物

D. 悬吊下坠的上颌骨骨块

E. 立即行气管切开术

118. 属于吸入性窒息的是

119. 对吸入性窒息的急救措施是

120. 属于阻塞性窒息的是



(121~123 题共用题干)

- A. 全身疾病及腹部大手术后
- B. 与遗传因素、免疫功能低下、细菌逆行感染有关
- C. 导管狭窄或异物堵塞，唾液淤滞引起
- D. 腺体损伤引起
- E. 最好发于下颌下腺

121. 儿童复发性腮腺炎的发病因素

122. 涎痿的形成多因为

123. 急性化脓性腮腺炎多见于

(124~126 题共用题干)

- A. 保密原则
- B. 守信原则
- C. 标准化原则
- D. 客观性原则
- E. 保守性原则

124. 心理学测验中，贯彻于始终的原则是

125. 心理测验中的一条道德标准是

126. 对心理测验的结果作出评价时应遵循

(127~129 题共用题干)

- A. 癫痫持续状态的首选药物
- B. 治疗晕动症
- C. 治疗尿崩症
- D. 局部组织缺血坏死
- E. 禁用于重度房室传导阻滞患者

127. 苯海拉明

128. 地西洋

129. 普萘洛尔

(130~132 题共用题干)

- A. 特布他林

B. 色甘酸钠

C. 氨苄西林

D. 胰岛素

E. 氨茶碱

130. 能有效抑制速发型超敏反应的是

131. 可以选择性激动 $\beta_2$ 受体，松弛支气管平滑肌的药物是

132. 非选择性抑制磷酸二酯酶(PDE)，从而舒张支气管平滑肌的是

(133~135 题共用题干)

A.  $33^\circ$  或  $30^\circ$

B.  $25^\circ$

C.  $20^\circ$

D.  $15^\circ$

E.  $0^\circ$

133. 非解剖式牙的牙尖斜度为

134. 解剖式牙的牙尖斜度

135. 半解剖式牙的牙尖斜度约为

(136~139 题共用题干)

A. 单纯型舌下腺囊肿

B. 口外型舌下腺囊肿

C. 哑铃型舌下腺囊肿

D. 外渗性黏液囊肿

E. 潴留性黏液囊肿

136. 囊肿表现为下颌下区肿物，低头时肿物稍有增大，属于

137. 多由创伤引起，囊肿无上皮衬里的是

138. 占舌下腺囊肿的大多数，紧贴口底黏膜，呈浅紫蓝色的是

139. 多由微小涎石或导管系统弯曲导致导管部分阻塞形成的囊肿是

(140~141 题共用题干)

A. 石膏绷带

B. 面部绷带

C. 四头带

D. 交叉十字绷带

E. 颅颌弹性绷带

140. 主要用于颌面部和上颈部术后的包扎固定的是

141. 可用于包扎鼻部、下颌下创口，压迫术后创口的是

142. 常用于上颌骨、面、颊部手术后的创口包扎的是

(143~145 题共用题干)

A. 化脓性淋巴结炎

B. 结核性淋巴结炎

C. 面部疔痈

D. 颌面部放线菌病

E. 放射性骨坏死

143. 口腔颌面部最容易发生全身并发症的是

144. 可形成冷脓肿的是

145. 可形成死骨，但死骨与周围骨常界限不清的疾病是

(146~148 题共用题干)

A. 急性化脓性腮腺炎

B. 慢性复发性腮腺炎

C. 下颌下腺炎

D. 流行性腮腺炎

E. 慢性阻塞性腮腺炎

146. 不宜做腮腺造影的是

147. 导管口可流出“雪花样”唾液的是

148. 腮腺造影显示末梢导管点、球状扩张，主导管无明显异常的是

(149~150 题共用题干)

A. 丁卡因

B. 普鲁卡因

C. 利多卡因

D. 布比卡因

E. 阿替卡因

149. 多用作表面麻醉的药物

150. 心律失常患者首选的局麻药



参考答案：



2019 年口腔执业助理医师第 2 单元



一、A1 型题

1. 【正确答案】D

【答案解析】根尖诱导成形术适应证：牙髓病已经波及根髓，而不能保留或不能全部保留根髓的年轻恒牙。牙髓全部坏死或并发根尖周病的年轻恒牙。患牙为死髓牙，不能再保存活髓的治疗，根管治疗术和牙髓摘除术不用于牙根未发育完成的患牙。充填术不用于治疗牙髓病变。

2. 【正确答案】D

【答案解析】根尖诱导成形术适应证：牙髓病已经波及根髓，而不能保留或不能全部保留根髓的年轻恒牙。牙髓全部坏死或并发根尖周病的年轻恒牙。

3. 【正确答案】A

【答案解析】乳牙在根管充填操作时应该采用可吸收的，不影响乳牙替换的根管充填材料，常用材料有氧化锌丁香油糊剂、碘仿糊剂、氧化锌碘仿糊剂、氢氧化钙糊剂等。

4. 【正确答案】D

【答案解析】年轻恒牙的根尖周病多是牙髓炎症或牙髓坏死的继发病。牙髓感染通过宽阔的根尖孔引起根尖周组织的炎症和病变。

5. 【正确答案】E

【答案解析】年轻恒牙牙髓组织和根尖周组织疏松，血运丰富，炎症感染易于扩散，如治疗及时，炎症也易控制和恢复。

6. 【正确答案】C

【答案解析】乳牙根尖周病变主要来源于牙髓的感染，其次是牙齿外伤以及牙髓治疗过程中药物或充填材料使用不当造成根尖周组织的严重损伤。

7. 【正确答案】A

【答案解析】乳牙牙髓病多由深龋感染引起，为龋病的并发症。除龋病感染外，牙齿外伤也可引起。乳牙牙髓病临床症状不明显，以慢性炎症为主，急性炎症往往是慢性炎症急性发作引起。临床上往往见到深龋洞，一定要进行深龋和慢性牙髓炎的鉴别。龋蚀未去净露髓，往往说明牙髓已经感染。没有疼痛并不能说明牙髓没有感染，一定要结合临床检查综合判断。乳牙牙髓感染可伴发牙根吸收，感染波及根髓时可有叩痛。

8. 【正确答案】E

【答案解析】乳牙的根管充填应该采用可吸收的，不影响乳牙替换的根管充填材料，常用材料有氧化锌丁香油糊剂、碘仿糊剂、氧化锌碘仿糊剂、氢氧化钙糊剂等。

9. 【正确答案】C

【答案解析】年轻恒牙牙根发育完成在萌出后 3~5 年左右。

10. 【正确答案】A

【答案解析】乳牙龋齿治疗的目的是终止龋蚀的发展、保护牙髓的正常活力，避免因龋而引发的并发症；恢复牙体的外形和咀嚼功能，维持牙列的完整性，使乳牙能够正常替换，有利于颌骨的生长发育。恢复牙体的外形和咀嚼功能并不是降低咬合高度。

11. 【正确答案】B

【答案解析】群组研究又称队列研究，将特定人群按其是否暴露于某因素分为两组，追踪观察一定时间，比较两组的发病率，以检验该因素与某疾病联系的假设。如果暴露组人群的发病率显著高于对照组人群，统计学检验有显著意义，则可认为这种暴露因素与某种疾病有联系。这种研究方法是在疾病出现以前分组，追踪一段时间以后才出现疾病，在时间上是先有“因”，后有“果”，属前瞻性研究。

12. 【正确答案】A

【答案解析】横断面研究又称现况调查，调查目标人群中某种疾病或现象在某一特定时间点（较短的时间内）的情况。它的作用在于了解疾病的患病情况和分布特点，以便制定预防措施和为研究病因提供线索。

13. 【正确答案】E

【答案解析】口腔流行病学即用流行病学的原则、基本原理和方法，研究人群中口腔疾病发生、发展和分布的规律及其影响因素，同时研究口腔健康及其影响因素，为探讨口腔疾病的病因和流行因素、制定口腔保健计划，选择防治策略和评价服务效果打下良好基础。

14. 【正确答案】D

【答案解析】影响龋病流行的主要因素有两点，一是氟的摄入状况，一是糖的摄入状况。钙、磷的摄入状况不是影响龋病流行的主要因素。单纯刷牙（不用含氟牙膏）主要影响的是牙周健康状况。就诊的医疗级别与次数显然不是影响龋病流行的主要因素。

15. 【正确答案】C

【答案解析】DMFT 是龋均即龋失补的平均牙数。D 代表龋坏的牙，M 代表因龋丧失的牙，F 代表因龋充填的牙。

16. 【正确答案】D

【答案解析】WHO 推荐的氟牙症诊断标准：为 Dean 指数，以釉质表面光泽度、颜色改变程度、缺损程度和侵犯面积作为依据。

17. 【正确答案】E

【答案解析】口腔念珠菌病实验室检查的方法包括：涂片法、培养法、免疫法、活检法、分子生物学法，一般来说临床上常用的为前三项。

18. 【正确答案】E

【答案解析】口腔念珠菌病与宿主的防御能力有关，长期、滥用广谱抗生素造成体内菌群失调以及内分泌紊乱等均可成为宿主发病的易感因素。由此可见，相对于嗜烟者、嗜酒者、更年期妇女和患有胆道疾病者来说，长期大量应用抗生素者更易患口腔念珠菌病。

19. 【正确答案】E

【答案解析】口腔念珠菌病的诊断主要依靠病史、临床特点并结合真菌学检查。念珠菌实验室检测方法包括涂片法、分离培养、组织病理学检查、免疫学和基因诊断等。一般来说，临床上常用的方法是前三种。其中直接把病变区的标本直接涂片在临床上最常用。

20. 【正确答案】B

【答案解析】单纯疱疹是由单纯疱疹病毒（HSV）所致的皮肤黏膜病。有自限性，易复发。HSV 为有包膜的 DNA 病毒，可分为 HSV1 与 HSV2 两型，临床上可以引起原发性疱疹性龈口炎和复发性疱疹性龈口炎。其他均不是引起疱疹性龈口炎的病原微生物。

21. 【正确答案】E

【答案解析】口腔念珠菌病的局部治疗可以使用碳酸氢钠（小苏打）溶液，由于念珠菌不适合在碱性环境中生长繁殖，用该溶液漱口，可以起到抑制念珠菌生长繁殖的作用。其他均为口腔念珠菌病的诱因。

22. 【正确答案】C

【答案解析】复发性阿弗他溃疡局部治疗：止痛可选用复方甘菊利多卡因于溃疡局部涂布；促溃疡愈合可局部外用重组人表皮生长因子。

23. 【正确答案】E

【答案解析】慢性非特异性唇炎多与各种慢性长期持续性刺激有关，如干燥、寒冷、舔唇、咬唇、撕皮等不良习惯及日晒、烟酒、化妆品刺激等。血管神经性水肿是与鱼虾等过敏原有关的疾病，黏膜良性类天疱疮是自身免疫类疾病，营养不良性口角炎与维生素 B 缺乏有关，手-足-口病与肠道传染的柯萨奇病毒感染有关。

24. 【正确答案】E

【答案解析】口腔白斑病是发生于口腔黏膜上的以白色为主的损害，不能擦去，也不能以临床和组织病理学的方法诊断为其他可定义的损害，属于癌前病变或潜在恶性疾患范畴，不包括吸烟、局部摩擦等局部因素去除后可以消退的单纯性过角化病。其临床表现可分为均质型与非均质型两大类，均质型包括斑块状、皱纹纸状，非均质型包括颗粒状、疣状及溃疡状。增生型不属于口腔白斑疾病的分类。

25. 【正确答案】D

【答案解析】口腔白斑病是指口腔黏膜上的白色斑块或斑片，不能以临床和组织病理学的方法诊断为其他任何疾病者。世界卫生组织将白斑归类为癌前病变。

26. 【正确答案】E

【答案解析】口腔白斑病可发生在口腔的任何部位。好发部位包括牙龈、颊部黏膜咬合线区域和舌部，唇、前庭沟、腭、牙龈也有发生。

27. 【正确答案】B

【答案解析】口腔白斑的发病原因还不清楚，但已知与吸烟、饮酒、嚼槟榔、念珠菌感染和环境中的有毒物质及致癌剂有关。口腔中的机械刺激、温度刺激、电流刺激或不良修复体也可引起白斑。球菌性口炎与金黄色葡萄球菌感染有关。

28. 【正确答案】D

【答案解析】口腔白斑的发病原因还不清楚，但已知与吸烟、饮酒、嚼槟榔、念珠菌感染和环境中的有毒物质及致癌剂有关。口腔中的机械刺激、温度刺激、电流刺激或不良修复体也可引起白斑。

29. 【正确答案】C

【答案解析】口腔白斑病：均质型包括：斑块状皱纹纸状；非均质型包括：颗粒状、疣状和

溃疡状。

30. 【正确答案】D

【答案解析】白斑，属于癌前病变，但白斑不一定会癌变。有以下情况者有癌变倾向，应该定期随访：  
医学教育网 www.med66.com

①白斑的类型中，非均质型更易恶变。

②白斑的发病部位，常见的危险区有：舌腹、口底、舌侧缘、软腭复合体及口角联合区。

③年龄越大，得病时间越长，越易恶变。

④女性恶变率高于男性。

⑤与吸烟和念珠菌感染有关。伴有念珠菌感染的白斑更易恶变。

31. 【正确答案】D

【答案解析】丝状乳头炎临床表现：在维生素 B 族缺乏、贫血、真菌感染等情况下丝状乳头表现为萎缩，舌背光滑，有灼热、灼痛感。菌状乳头炎：菌状乳头水肿，充血，呈草莓样改变，疼痛明显。叶状乳头炎：表现为皱褶加深，红肿，舌运动时局部疼痛、刺激性痛，患者偶感局部灼痛。

32. 【正确答案】C

【答案解析】下颌智齿冠周炎导致下颌前庭沟骨膜下形成的脓肿常发生在第一磨牙处。

33. 【正确答案】E

【答案解析】急性龋临床表现为多发生在儿童和易感个体，进展速度很快，从发现到出现牙髓病变的时间可以很短，病变如果发生在窝沟，可在窝沟底部沿釉牙本质界向两侧和牙本质深层发展，形成临床上不易发现的隐匿性龋，进展情况和全身的抵抗力及局部环境因素有关，病变部位的牙本质质地较湿软。

34. 【正确答案】E

【答案解析】根面龋最容易找到的细菌为放线菌。乳酸杆菌能够产酸耐酸，与龋的进展有关，常在窝沟龋中检出。韦永菌为厌氧菌，在深龋和牙髓炎中可被检测出来。螺旋体在坏死性龈炎中可检出。变形链球菌在各个牙面均可发现，致龋力最强，其中窝沟龋和变形链球菌关系最紧密。

35. 【正确答案】D

【答案解析】根据病变侵入牙齿的深度分类：临床上以去除龋腐后洞底所在的组织位置分为浅、中、深龋。



36. 【正确答案】E

【答案解析】健康组织探针并非止于结合上皮冠方，而是进入结合上皮内 1/3~1/2。

37. 【正确答案】D

【答案解析】细菌以牙菌斑生物膜的形式构成牙周病的始动因子。牙石、食物嵌塞、(牙合)创伤、不良修复体等构成牙周病的局部促进因素。

38. 【正确答案】D

【答案解析】(牙合)创伤是牙周炎的促进因素，但不能改变牙周组织对菌斑的刺激反应。

39. 【正确答案】C

【答案解析】用有刻度的牙周探针探测牙周袋时应注意：支点要稳、探测力量恰当、探测位置和角度恰当、按顺序探测。备选答案中只有探测角度要垂直是错误的。因为探入时，探针应与牙体长轴平行，探针要紧贴牙面，不能简单理解为垂直。牙科所有操作中都强调支点的重要，以免损伤邻近牙周组织或邻牙。

40. 【正确答案】D

【答案解析】非附着性龈下菌斑与牙槽骨的快速破坏有关，与牙周炎的发生发展关系密切，被认为是牙周炎的“进展前沿”。

41. 【正确答案】D

【答案解析】氟牙症又称氟斑牙或斑釉症，是在牙发育矿化时期机体摄入过量的氟所引起的一种特殊的釉质发育不全，是地方性慢性氟中毒最早出现的体征。若出生后在高氟区居住多年，可使全口牙受侵害，若 6~7 岁以后再迁入高氟区，则不会出现氟牙症。其多发生在恒牙，乳牙较少。故其患牙数目的多少，取决于牙发育矿化时期在高氟区生活时间的长短。

42. 【正确答案】E

【答案解析】巴斯刷牙法又称为水平颤动法或龈沟法。作为一种有效的清除龈缘附近以及龈沟内菌斑的方法，巴斯法最为广泛接受，因为这个部位对控制牙龈与牙周感染最为重要。能去除龈缘附近与龈沟内的牙菌斑，特别是邻间区，牙颈部与暴露的根面区，适用于所有人群以及实施过牙周手术的患者。

43. 【正确答案】A

【答案解析】碘染色可以使越过边缘嵴的牙面裂纹清晰可见，定位明显，是最有助于检查牙隐裂的方法，所以 A 正确。

44. 【正确答案】E

【答案解析】慢性闭锁性牙髓炎没有穿髓孔，不含上皮成分。

45. 【正确答案】B

【答案解析】根管在接近根尖时有一个狭窄部位，就是牙本质牙骨质界，即生理性根尖孔，距离解剖性根尖孔约 0.5~1mm。

46. 【正确答案】E

【答案解析】受县级以上人民政府卫生行政部门委托的机构或者组织应当按照医师执业标准，对医师的业务水平、工作成绩和职业道德状况进行定期考核。对医师的考核结果，考核机构应当报告准予注册的卫生行政部门备案。

47. 【正确答案】B

【答案解析】有下列情形之一的，不予注册：①不具有完全民事行为能力的；②因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满两年的；③受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满两年的；④有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

48. 【正确答案】C

【答案解析】注销注册：医师注册后有下列情形之一的，其所在的医疗、预防、保健机构应当在 30 日内报告准予注册的卫生行政部门，卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书：

①死亡或者被宣告失踪的；

②受刑事处罚的；

③受吊销医师执业证书行政处罚的；

④因考核不合格，暂停执业活动期满，经培训后再次考核仍不合格的；

⑤中止医师执业活动满 2 年的；

⑥有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

49. 【正确答案】B

【答案解析】具有高等学校医学专科学历或者中等专业学校医学专业学历，在执业医师指导下，在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的，可以参加执业助理医师资格考试。

50. 【正确答案】B

【答案解析】以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的，经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐，

可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。考试的内容和办法由国务院卫生行政部门另行制定。

51. 【正确答案】C

【答案解析】有下列情形之一的，不予注册：

- ①不具有完全民事行为能力的；
- ②因受刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 2 年的；
- ③受吊销医师执业证书行政处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的；
- ④有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。受理申请的卫生行政部门对不符合条件不予注册的，应当自收到申请之日起 30 日内书面通知申请人，并说明理由。

52. 【正确答案】C

【答案解析】医师在执业活动中享有下列权利：

- ①在注册的执业范围内，进行医学检查、疾病调查、医学处置、出具相应的医学证明文件，选择合理的医疗、预防、保健方案；
- ②按照国务院卫生行政部门规定的标准，获得与本人执业活动相当的医疗设备基本条件；
- ③从事医学研究、学术交流，参加专业学术团体；
- ④参加专业培训，接受医学继续教育；
- ⑤在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯；
- ⑥获取工资报酬和津贴，享受国家规定的福利待遇；
- ⑦对所在机构的医疗、预防、保健工作和卫生行政部门的工作提出意见和建议，依法参与所在医疗机构的管理。

53. 【正确答案】B

【答案解析】医师注册后有下列情形之一的，其所在的医疗、预防、保健机构应当在 30 日内报告准予注册的卫生行政部门，卫生行政部门应当注销注册，收回医师执业证书：

- ①死亡或者被宣告失踪的；
- ②受刑事处罚的；
- ③受吊销医师执业证书行政处罚的；
- ④因考核不合格，暂停执业活动期满，经培训后再次考核仍不合格的；

⑤中止医师执业活动满 2 年的；

⑥有国务院卫生行政部门规定不宜从事医疗、预防、保健业务的其他情形的。

54. 【正确答案】D

【答案解析】当事人对首次医疗事故技术鉴定结论不服的，可以自收到首次鉴定结论之日起 15 日内向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定的申请。

55. 【正确答案】E

【答案解析】未经医师（士）亲自诊查病人，医疗机构不得出具疾病诊断书、健康证明书或者死亡证明书等证明文件；未经医师（士）、助产人员亲自接产，医疗机构不得出具出生证明书或者死产报告书。

二、A2 型题

56. 【正确答案】B

【答案解析】最常用的表面麻醉药为 0.25%~0.5% 的盐酸丁卡因。因丁卡因毒性较大，临床上还可使用 2%~5% 利多卡因进行表面麻醉，但其麻醉作用不及丁卡因。

57. 【正确答案】E

【答案解析】下牙槽神经阻滞麻醉病员大张口时，可见磨牙后方，舌腭弓（前柱）之前，有一索条样黏膜皱襞，即翼下颌皱襞。另在颊部有一由脂肪组织突起形成的三角形颊脂垫，其尖端正居翼下颌韧带中点而稍偏外处。此二者即为注射的重要标志。若遇颊脂垫尖不明显或磨牙缺失的病员，可在大张口时，以上下颌牙槽嵴相距的中点线上与翼下颌韧带外侧 3~4mm 的交点，作为注射标志。

58. 【正确答案】A

【答案解析】下颌第三磨牙拔除术注意事项：①远中切口如偏舌侧，易引起出血和水肿。②颊侧切口与远中切口的末端成 45° 角向下，勿超过前庭沟，否则将引起颊部肿胀。③应作黏骨膜全层切开，紧贴骨面将瓣翻起。④用锤凿法去骨时，为避免暴露第二磨牙牙根，应首先在第二磨牙颊远中角之后，与牙槽嵴垂直，凿透密质骨使成一沟。⑤用锤凿法劈开时，牙冠应已有足够的显露，且牙不松，在颊面近中发育沟处，用锐利而合适的器械劈开。⑥涡轮钻拔牙法是近年来较常使用的方法，具有无振动，创伤小，手术视野清楚，手术时间短，术后并发症减少等明显优点。

59. 【正确答案】C

【答案解析】出血原因：绝大多数为局部因素。局部因素有牙槽窝内残留炎性肉芽组织、软

组织撕裂、牙槽骨骨折、牙槽内小血管破裂、较大知名血管破损，如下牙槽血管或后上牙槽血管破裂等。血块脱落也可引起出血。发生在拔牙出血当时已停止，以后因创口感染等其他原因引起的出血，称为继发性出血。偶有全身因素引起的拔牙后出血。拔牙创感染出现于术后 3 天左右，不可能在术后 3 小时就出现感染问题。

60. 【正确答案】E

【答案解析】妊娠 4~6 月是相对安全的时间段，对引起较大痛苦、必须拔除的牙齿，可以考虑在此期手术。

61. 【正确答案】A

【答案解析】钳夹止血是使用最多、最普遍的方法，即用血管钳对看得见的出血点进行迅速和准确的钳夹。

62. 【正确答案】E

【答案解析】患儿右上唇不完全裂，左上唇完全裂开。双侧混合性唇裂（一侧完全裂，另一侧不完全裂）。

63. 【正确答案】C

【答案解析】关节内强直：①进行性开口困难。②面下部发育畸形，表现为面部两侧不对称，颏部偏向患侧；患侧下颌体、下颌支短小，患侧面部丰满；双侧强直者形成特殊的小颌畸形面容。发病年龄愈小，颜面部发育畸形愈严重，严重者可致阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。③咬合关系紊乱，如果关节强直发病于成年人或青春发育期以后，则面部和咬合关系无明显畸形，仅有开口受限。④髁突活动减弱或消失。⑤X 线检查有助于诊断并鉴别纤维性强直和骨性强直。CT 及三维重建检查可判断粘连范围、部位及程度。

64. 【正确答案】E

【答案解析】双侧完全性腭裂：双侧完全性腭裂在临床上常与双侧唇裂同时发生，裂隙在前颌骨部分，各向两侧斜裂，直达牙槽突；鼻中隔、前颌突及前唇部分孤立于中央。可见腭垂缺损甚至缺失。

65. 【正确答案】A

【答案解析】颧骨骨折 X 线片检查常用鼻颏位（华氏位）和颧弓切线位。

66. 【正确答案】A

【答案解析】含牙囊肿又称滤泡囊肿。发生于牙冠或牙根形成之后，在缩余釉上皮与牙冠面之间出现液体渗出而形成含牙囊肿。可来自一个牙胚（含一个牙）；也有来自多个牙胚（含

多个牙)者。

67. 【正确答案】D

【答案解析】上颌支：眶下孔、下眼睑、鼻唇沟、鼻翼、上唇、鼻孔下方或口角区、上颌结节或腭大孔等部位。

68. 【正确答案】E

【答案解析】遗传性乳光牙本质又称牙本质发育不全，X线表现为牙冠严重磨损，变短小，邻牙间隙增大。牙本质在髓腔侧的异常形成，致使髓室和根管部分或全部闭塞，牙根短而尖细。

69. 【正确答案】E

【答案解析】LeFort III型骨折：又称上颌骨高位骨折或颧弓上骨折。骨折线自鼻额缝向两侧横过鼻梁、眶部，经颧额缝向后达翼突，形成颅面分离，常使面中部凹陷、变长。此型骨折多伴有颅底骨折或颅脑损伤，出现耳、鼻出血或脑脊液漏。

70. 【正确答案】E

【答案解析】如患者昏迷一段后清醒，随后头痛加剧、不安，进而嗜睡，再次进入昏迷状态，伤侧瞳孔散大，对光反射消失，呼吸、脉搏变慢，血压上升时，是硬脑膜外血肿的典型表现。（拓展了解）

71. 【正确答案】C

【答案解析】缺损较小，不需要组织瓣转移修复。

72. 【正确答案】B

【答案解析】皮样囊肿囊壁较厚，由皮肤和皮肤附件所构成。囊腔内有脱落的上皮细胞、皮脂腺、汗腺和毛发等结构，中医称为“发瘤”。囊壁中无皮肤附件者，则为表皮样囊肿。皮样囊肿的诊断除根据病史及临床表现外，穿刺检查可抽出乳白色豆渣样分泌物，有时大体标本可见毛发。在镜下可见有脱落的上皮细胞、毛囊和皮脂腺等结构。

73. 【正确答案】E

【答案解析】颌面部特别是面中部的患者，观察 24~72 小时对于避免颅脑并发症是必要的。严密观察其神志、脉搏、呼吸、血压及瞳孔的变化。瞳孔的变化常能反映颅内损伤的程度，如一侧瞳孔变大，并伴有意识障碍，常提示同侧颅内血肿或水肿的可能。如出现典型的“两慢一高”，即血压升高、脉搏徐缓有力、呼吸慢而深时，表明存在急性颅内血肿的可能。

74. 【正确答案】E

【答案解析】自觉性是指一个人有明确的行动目的，能主动的支配自己的行为，使其能达到既定目标的心理过程。它具体表现在意志行动过程中确定目的的自觉性、行动过程中克服困难的自觉性、行动结果时自我评价的自觉性。意志自觉性的品质，贯穿于意志行动过程中的全过程。

75. 【正确答案】B

【答案解析】医患沟通过程主要是以言语沟通和非言语沟通两种方式进行。非言语沟通可以通过表情动作、目光接触、周围环境信息等手段表达自己的情感，从而达到沟通的目的。

76. 【正确答案】B

【答案解析】咬颊黏膜、咬舌：由于上颌后牙的覆盖过小或缺牙后，颊部软组织向内凹陷，天然牙牙尖锐利都会造成咬颊黏膜，应加大后牙覆盖，调磨过锐的牙尖，加厚基托推开颊肌。咬舌多因下颌后牙排列偏向舌侧或因平面过低造成，可适当升高下颌平面，磨除下颌人工牙的舌面或重新排列后牙。

77. 【正确答案】D

【答案解析】对患牙施行根管治疗时，一般遵循根管预备，根管消毒与根管充填三个步骤进行。

78. 【正确答案】B

【答案解析】放散痛、自发痛、夜间痛属于典型牙髓炎表现，根据 X 线检查指示髓腔内有钙化物，且温度测试为迟发性疼痛，符合慢性闭锁性牙髓炎表现。治疗首选根管治疗。

79. 【正确答案】D

【答案解析】造成患者牙髓炎的病因可能为第一次治疗时操作不当或牙髓状态判断错误，导致牙髓化脓性感染，应及时开髓引流，释放髓腔内压力，缓解疼痛。

80. 【正确答案】C

【答案解析】直接盖髓术适应症：根尖孔未形成，因机械性或外伤性因素暴露的年轻恒牙；意外穿髓，穿髓孔直径不超过 0.5mm 者。本题中患者 9 岁，上前牙为年轻恒牙，外伤露髓应尽量保髓。前牙折断致针尖大小穿髓孔，牙髓还未感染，所以最佳治疗方案为直接盖髓术。

81. 【正确答案】B

【答案解析】牙周炎诊断特征包括菌斑、牙石刺激因素存在，牙周袋 > 3mm 且有牙周附着丧失，牙周袋探诊后出血、牙松动或移位等，本病例均存在以上表现，故诊断为慢性牙周炎；牙龈炎无牙槽骨吸收及附着丧失；牙周-牙髓联合病变应有牙髓炎及牙根尖周炎症的表现，

且应检查到深达根尖的牙周袋；侵袭性牙周炎一般出现在 35 岁以下人群，且病程进展较快。此题患者年龄为 50 岁，且病史较长，可以排除。

82. 【正确答案】C

【答案解析】由于牙髓活力测试 36、37 均正常，不可能为牙髓炎或根尖周病导致后牙肿痛，下颌智齿虽然水平阻生，但冠周牙龈无红肿，提示患者疼痛非智齿冠周炎导致。36 牙周附着丧失，牙周袋溢脓，且有波动感，说明牙周脓肿已经形成，应及时切开排脓，缓解疼痛。

83. 【正确答案】D

【答案解析】根据牙周袋深度、结缔组织附着丧失和骨吸收的程度可将慢性牙周炎分为轻、中、重度。以附着丧失为重点。(1) 轻度：牙龈有炎症和探诊出血，牙周袋 $\leq 4\text{mm}$ ，附着丧失 1~2mm，X 线片显示牙槽骨吸收不超过根长的 1/3。可有或无口臭。(2) 中度：牙周袋 $\leq 6\text{mm}$ ，附着丧失 3~4mm，X 线片显示牙槽骨水平型或角型吸收超过根长的 1/3，但不超过根长的 1/2。牙齿可能有轻度松动，多根牙的根分叉区可能有轻度病变，牙龈有炎症和探诊出血，也可有脓。(3) 重度：牙周袋 $> 6\text{mm}$ ，附着丧失 $\geq 5\text{mm}$ ，X 线片显示牙槽骨吸收超过根长的 1/2 甚至根尖 2/3，多根牙有根分叉病变，牙多有松动。炎症较明显或可发生牙周脓肿。

84. 【正确答案】E

【答案解析】广泛型侵袭性牙周炎临床特点有以下方面：通常发生于 30 岁以下者，但也可见于年龄更大者；广泛的邻面附着丧失，累及除切牙和第一磨牙以外的恒牙至少 3 颗；有严重而快速的附着丧失和牙槽骨破坏，呈明显的阵发性；在活动期，牙龈有明显的炎症，呈鲜红色，并可伴有龈缘区肉芽性增殖，易出血，可有溢脓。但有些病例虽有深牙周袋，牙龈表面炎症却不明显，可能处于静止期。

85. 【正确答案】E

【答案解析】在遇到突发公共卫生事件时，及时公开相关信息是非常必要和重要的，信息及时发布不仅可以增强群众的防范意识，还可以取得群众对政府所采取的某些处理措施的理解、支持和配合。所以，在公共卫生实践中，公共卫生工作人员应坚持信息公开原则。

86. 【正确答案】E

【答案解析】为门（急）诊患者开具的麻醉药品注射剂，每张处方为一次常用量；控缓释制剂，每张处方不得超过 7 日常用量；其他剂型，每张处方不得超过 3 日常用量。

87. 【正确答案】C

【答案解析】《精神卫生法》规定，社区康复机构应当为需要康复的精神障碍患者提供场所



和条件，对患者进行生活自理能力和社会适应能力等方面的康复训练。

88. 【正确答案】E

【答案解析】首先应先判断是否有多生牙，如有应及时拔除多生牙后，再行关闭间隙。

89. 【正确答案】C

【答案解析】一般下颌中切牙萌出时间在 6~7 岁，5 岁过早，属于恒牙早萌。

90. 【正确答案】C

【答案解析】弯曲牙常由乳牙外伤导致，乳牙慢性根尖周炎伤及恒牙胚时常见特纳牙。特纳牙：个别恒牙的釉质发育不全，常与其先行乳牙有关。因前磨牙的牙胚处在乳磨牙牙根分歧下方，难以避免乳磨牙根尖周炎症的影响，故个别牙的釉质发育不全，多见于前磨牙。

91. 【正确答案】D

【答案解析】牙齿脱出后应该妥善保存牙齿，尽快到医院治疗。储存条件和储存时间的长短对于成功的愈合是非常重要的。生理盐水较好，其他液体如血液，组织培养液，牛奶和唾液也可作为储存液。

92. 【正确答案】B

【答案解析】龋洞洞缘与龈缘在同一水平，可仅去除龋蚀进行充填治疗。

93. 【正确答案】A

【答案解析】根据患者临床表现可以诊断患者的疾病为白斑均质型，则在治疗的时候不能使用刺激性药物来刺激已经病变的口腔黏膜。其他措施均为白斑的治疗措施。

94. 【正确答案】A

【答案解析】复发性坏死性黏膜腺周围炎又称为腺周口疮，重型阿弗他溃疡。患者有反复发作史，溃疡直径较大，边缘清晰，似弹坑状，因此诊断为重型阿弗他溃疡。

95. 【正确答案】C

【答案解析】根据患者病程反复，时轻时重，秋冬季好发，唇红反复糜烂、痛胀痒、渗出结痂等表现，诊断为慢性糜烂性唇炎。

96. 【正确答案】B

【答案解析】若有乳切牙萌出后切缘较锐，吸奶时间长，舌系带、舌腹与牙切嵴摩擦也会发生溃疡，初起时仅局部充血，继之出现小溃疡，不断刺激的结果不但溃疡扩大，疼痛加重甚至可见组织增生，称 Riga-Fede 溃疡。

三、A3/A4 型题

(97~99 题共用题干)

97. 【正确答案】C

【答案解析】5~6 岁儿童每次用 5ml，6 岁以上儿童每次用 10ml，一般认为漱口水的氟浓度和漱口频率对防龋效果没有影响，如果漱口水剂量过高误吞会引起氟中毒的概率比较大，而且大剂量没有增加防龋的效果。漱口水的浓度过小会导致防龋的效果显著降低。

98. 【正确答案】D

【答案解析】使用漱口水时，根据儿童的年龄，用量筒或注射器取 5ml 或 10ml 配好的溶液于漱口杯中，5~6 岁儿童每次用 5ml，6 岁以上儿童每次用 10ml，嘱儿童将溶液含入口中，鼓漱 1 分钟后吐出，半小时内不进食或漱口。

99. 【正确答案】E

【答案解析】氟化亚锡等会对牙有轻度着色。氟水漱口的氟化物种类主要是中性或酸性氟化钠。

(100~102 题共用题干)

100. 【正确答案】B

【答案解析】题示右下 7、8 间食物残渣较多，且龈乳头中度充血水肿，进食后痛，均符合急性龈乳头炎临床表现。且该患者导致急性龈乳头炎的主要促进因素为食物嵌塞。

101. 【正确答案】C

【答案解析】题示右下 7、8 间食物残渣较多，且龈乳头中度充血水肿，以往进食后痛，均符合急性龈乳头炎临床表现。且该患者导致急性龈乳头炎的主要原因为食物嵌塞。

102. 【正确答案】A

【答案解析】解除龈乳头炎的根本在于解决食物嵌塞问题，本题食物嵌塞原因是右下 8 颊向错位，伸长牙无对颌导致，应及时拔除解除食物嵌塞。右下 7 无牙髓异常，不必做根管治疗。局部洁治仅能达到短期清除食物嵌塞的目的，而不能根本上解除食物嵌塞。

(103~105 题共用题干)

103. 【正确答案】E

【答案解析】题目当中患者的患牙没有牙髓炎的症状，故不需进行根管治疗。

104. 【正确答案】C

【答案解析】中度牙周炎：牙周袋 $\leq 6\text{mm}$ ，附着丧失 3~4mm，X 线片显示牙槽骨水平型或角型吸收超过根长的 1/3，但不超过根长的 1/2。牙齿可能有轻度松动，多根牙的根分叉区可

能有轻度病变，牙龈有炎症和探诊出血，也可有脓。

105. 【正确答案】C

【答案解析】牙周袋探诊深度大于 3mm，探及釉牙骨质界、且有附着丧失，其主要诊断应该为慢性牙周炎。楔状缺损为非主要诊断。

(106~108 题共用题干)

106. 【正确答案】D

【答案解析】根尖诱导成形术适应证：牙髓病已经波及根髓，而不能保留或不能全部保留根髓的年轻恒牙。牙髓全部坏死或并发根尖周病的年轻恒牙。题示根管内无脓液流出，且深探剧烈疼痛推测患牙感染已波及根髓，行冠髓切断术已无意义，对于牙根尚未形成的患牙，应行根尖诱导成形术。

107. 【正确答案】B

【答案解析】急性牙髓炎时，应先做应急处理，开放根管，有效引流，待消炎后继续治疗。

108. 【正确答案】B

【答案解析】根管消毒：吸干根管，封刺激性小的药物于根管内，如樟脑酚、木榴油、碘仿糊剂、抗生素糊剂等。甲醛甲酚（FC）杀菌能力最强，但由于这类药物挥发性强，有效作用时间短，毒副作用较大，可作为半抗原，与牙髓根尖周围组织的宿主蛋白结合，形成免疫原引起抗原免疫反应，国际上不推荐使用。尤其对于年轻恒牙治疗时不可使用，避免药物刺激根尖，影响牙根继续发育。

(109~111 题共用题干)

109. 【正确答案】E

【答案解析】患者有反复发作史，在双颊、舌及口底黏膜可见粟米样大小的溃疡十余个，类似“满天星”，因此诊断为疱疹样口疮，亦称疱疹样阿弗他溃疡。

110. 【正确答案】E

【答案解析】复发性口疮的病因目前尚不清楚，与该病有关的因素有：免疫因素、遗传因素、系统性疾病因素、感染因素、环境因素及其他因素。

111. 【正确答案】E

【答案解析】复发性阿弗他溃疡根据病史和临床体征即可诊断，无需活检。

(112~114 题共用题干)

112. 【正确答案】A

【答案解析】根据题干“患者口腔卫生差，大量牙石菌斑，”可判断修复前必要的处理为全口洁治。

113. 【正确答案】E

【答案解析】第三类：缺隙位于牙弓一侧，缺隙前后均有余留牙，即单侧非游离缺失。

114. 【正确答案】B

【答案解析】固定义齿基牙牙根应长大、稳固，以多根牙的支持最好，不应存在病理性松动。若基牙牙根周围牙槽骨退缩，最多不超过根长的 1/3，必要时，需增加基牙数目。

四、B 型题

(115~117 题共用题干)

115. 【正确答案】D

【答案解析】下牙槽神经口内阻滞麻醉时，由于注射针偏向外后不能触及骨面，或偏上越过乙状切迹，而致麻药注入腮腺内麻醉面神经而发生暂时性面瘫。

116. 【正确答案】E

【答案解析】下牙槽神经口内阻滞麻醉时由于注射不准确，麻醉药注入翼内肌或咬肌内，使肌肉失去收缩与舒张的功能，并停滞于收缩状态，因而出现牙关紧闭，一般都是暂时性的，大多在 2~3 小时内自行恢复。

117. 【正确答案】A

【答案解析】上牙槽后神经、眶下神经阻滞麻醉时，在刺伤静脉丛后，可发生组织内出血，在黏膜下或皮下出现紫红色瘀斑或肿块。数日后，血肿处颜色逐渐变浅呈黄绿色，并缓慢吸收消失。

(118~120 题共用题干)

118. 【正确答案】B

【答案解析】吸入性窒息：主要见于昏迷患者，直接将血液、唾液、呕吐物或其他异物吸入气管、支气管或肺泡内而引起。

119. 【正确答案】E

【答案解析】吸入性窒息的急救：应立即行气管切开术，通过气管导管，充分吸出进入下呼吸道的血液、分泌物及其他异物，解除窒息。

120. 【正确答案】A

【答案解析】阻塞性窒息：①异物阻塞咽喉部。②组织移位：上颌骨横断骨折时，骨块向下

后方移位，可堵塞咽腔，压迫舌根而引起窒息。下颌骨颏部粉碎性骨折或双发骨折时，由于口底降颌肌群的牵拉，可使下颌骨前部向下后移位及舌后坠而阻塞呼吸道。③肿胀与血肿。

(121~123 题共用题干)

121. 【正确答案】B

【答案解析】儿童复发性腮腺炎发病机制尚不十分清楚，可能是多方面因素综合作用的结果，一般认为与以下因素有关：(1) 先天性发育异常；(2) 自身免疫功能异常；(3) 细菌逆行感染。

122. 【正确答案】D

【答案解析】涎瘘是指唾液不经导管系统排入口腔而流向面颊皮肤表面。腮腺是最常见的部位，损伤是主要的原因。

123. 【正确答案】A

【答案解析】急性化脓性腮腺炎常见于全身疾病及腹部外科手术后。基本因素是机体严重脱水致唾液分泌减少或停止。

(124~126 题共用题干)

124. 【正确答案】C

【答案解析】因为心理学测验是一种数量化手段，因此这一原则必须贯彻于始终。

125. 【正确答案】A

【答案解析】保密原则是心理测验的一条道德标准。

126. 【正确答案】D

【答案解析】心理测验的结果只是测出来的东西，所以对结果作出评价时要遵循客观性原则。

(127~129 题共用题干)

127. 【正确答案】B

【答案解析】用于晕动病、放射病等引起的呕吐，常用苯海拉明和异丙嗪。

128. 【正确答案】A

【答案解析】静脉注射地西洋，是治疗癫痫持续状态的首选药。

129. 【正确答案】E

【答案解析】严重心功能不全、窦性心动过缓、重度房室传导阻滞者及哮喘病人慎用或禁用普萘洛尔。

(130~132 题共用题干)

130. 【正确答案】B

【答案解析】色甘酸钠对速发型过敏反应具有明显的抑制作用。能抑制肥大细胞由抗原诱发的过敏介质的释放过程，从而阻断速发型过敏反应。临床上主要用于预防哮喘的发作。

131. 【正确答案】A

【答案解析】特布他林选择性激动 $\beta_2$ 受体，松弛支气管平滑肌，用于支气管哮喘、喘息型支气管炎；还可用于肺气肿、慢性阻塞性肺病引起的支气管痉挛。

132. 【正确答案】E

【答案解析】茶碱非选择性抑制磷酸二酯酶（PDE），使细胞内 cAMP、cGMP 水平升高，而舒张支气管平滑肌。

（133~135 题共用题干）

133. 【正确答案】E

【答案解析】非解剖式牙：人工牙的颊、舌轴面与解剖式牙类似，但（牙合）面仅有溢出沟，而没有牙尖，或者说牙尖斜度为 $0^\circ$ ，又称无尖牙。无尖牙咀嚼效率较低，但侧向（牙合）力小，有利于义齿稳定，对牙槽骨的损害小。

134. 【正确答案】A

【答案解析】解剖式牙：人工牙的（牙合）面形态与初萌的天然牙（牙合）面相似，牙尖斜度为 $33^\circ$ 或 $30^\circ$ 。正中（牙合）时，上、下颌牙齿的尖凹锁结关系好，咀嚼效率高，但侧向（牙合）力大。

135. 【正确答案】C

【答案解析】半解剖式牙：人工牙的牙尖斜度约为 $20^\circ$ ，上、下颌牙间有一定的锁结关系。侧向（牙合）力较解剖式牙小。

（136~139 题共用题干）

136. 【正确答案】B

【答案解析】口外型舌下腺囊肿又称潜突型。主要表现为下颌下区肿物。触诊柔软，与皮肤无粘连，不可压缩，低头时因重力关系，肿物稍有增大。穿刺可抽出蛋清样黏稠液体。

137. 【正确答案】D

【答案解析】外渗性黏液囊肿占黏液囊肿的 80%以上，组织学表现为黏液性肉芽肿或充满黏液的假囊，无上皮衬里。外渗性黏液囊肿多是由创伤引起的。

138. 【正确答案】A

【答案解析】单纯型舌下腺囊肿，占舌下腺囊肿的大多数。由于囊壁菲薄并紧贴口底黏膜，囊肿呈浅紫蓝色，扪之柔软有波动感。较大的囊肿可将舌抬起，状似“重舌”。

139. 【正确答案】E

【答案解析】潴留性黏液囊肿的发病原因主要是导管系统的部分阻塞，可由微小涎石、分泌物浓缩或导管系统弯曲等原因所致。

(140~141 题共用题干)

140. 【正确答案】D

【答案解析】交叉十字绷带亦称环绕法，被广泛用于颌面部（例如耳前区、耳后区、腮腺区、下颌下区、颞下区）和上颈部术后和损伤的包扎固定。

141. 【正确答案】C

【答案解析】四头带应用技术的用途如下：1) 包扎鼻部创口；2) 包扎下颌、颞部创口；3) 压迫术后创口。

142. 【正确答案】B

【答案解析】面部绷带常用于上颌骨、面、颊部手术后的创口包扎。

(143~145 题共用题干)

143. 【正确答案】C

【答案解析】在口腔颌面部感染中面部疔痈最易发生全身并发症。这是由于疔痈的病原菌毒力较强，上唇与鼻部“危险三角区”内的静脉又常无瓣膜，颜面表情肌和唇部的生理性运动易使感染扩散等因素所致。

144. 【正确答案】B

【答案解析】结核性淋巴结炎淋巴结中心因有干酪样坏死，组织溶解变软，液化破溃。炎症波及周围组织时，淋巴结可彼此粘连成团。皮肤表面无红、热及明显压痛，扪之有波动感。此种液化现象称为冷脓肿。

145. 【正确答案】E

【答案解析】放射性颌骨坏死放射后的颌骨破骨细胞与成骨细胞的再生能力低下，致死骨分离的速度非常缓慢，因此，死骨与正常骨常常界限不清。

(146~148 题共用题干)

146. 【正确答案】A

【答案解析】急性化脓性腮腺炎不宜做腮腺造影，因造影剂可通过薄弱的导管壁，进入导管

周围组织，使炎症扩散。

147. 【正确答案】E

【答案解析】慢性阻塞性腮腺炎挤压腮腺可从导管口流出混浊的“雪花样”或黏稠的蛋清样唾液，有时可见黏液栓子。

148. 【正确答案】B

【答案解析】慢性复发性腮腺炎：腮腺造影显示末梢导管呈点状、球状扩张，排空迟缓，主导管及腺内导管无明显异常。

(149~150 题共用题干)

149. 【正确答案】A

【答案解析】丁卡因对黏膜的穿透力强，常用于表面麻醉。

150. 【正确答案】C

【答案解析】利多卡因有迅速、安全的抗室性心律失常作用，在治疗各种原因的室性心律失常时效果显著，因而对心律失常病员常作为首选的局部麻醉药。

