

医学教育网初级护师：《答疑周刊》2020 年第 36 期

1. 【问题】输卵管官腔最狭窄的部位是间质部还是峡部？

【解答】峡部

根据输卵管的形态由内向外可分为 4 部分：

①间质部，长约 1cm；

②峡部，管腔最狭窄的部分，长约 2~3cm；

③壶腹部，管腔较宽大，为正常情况下受精部位，长约 5~8cm；

④伞端，形似漏斗，是输卵管的末端，长约 1~1.5cm，开口于腹腔，有“拾卵”作用。

2. 【问题】如何根据中心静脉压和血压判断如何补液？

【解答】

CVP	BP	原因	处理原则
低	低	血容量严重不足	充分补液
低	正常	血容量不足	适当补液
高	低	心功能不全	给强心药，减慢输液
高	正常	容量血管过度收缩	舒张血管
正常	低	心功能不全或血容量不足	补液试验

3. 【问题】麻烦老师总结一下小儿体重计算公式？

【解答】1~6 个月：体重（kg）= 出生体重（kg）+ 月龄 × 0.7

7~12 月：体重（kg）= 6（kg）+ 月龄 × 0.25

2~青春期前：体重（kg）= 年龄 × 2 + 8kg

4. 【问题】囟门闭合时间是多少？

【解答】前囟为顶骨与额骨边缘形成的菱形间隙，其对边中点连线的长度在出生时为 1.5~2cm，6 个月后逐渐骨化变小，1~1 岁半时应闭合。后囟出生时已很小或闭合，最迟生后 6~8 周闭合。

5. 【问题】请问子宫各个韧带的作用？

【解答】圆韧带：呈圆索状，起于两侧子宫角的前面，向前方伸展达两侧骨盆壁，再穿越股沟，终止于大阴唇前端，有维持子宫前倾位的作用。

阔韧带：由子宫两侧至骨盆壁的一对翼形的腹膜皱襞，将骨盆分为前、后两部分，维持子宫

在盆腔的正中位置。子宫动脉、静脉和输尿管均从阔韧带基底部穿过。

主韧带：又称子宫颈横韧带，横行于子宫颈两侧和骨盆侧壁之间，为一对坚韧的平滑肌与结缔组织纤维束，是固定子宫颈正常位置的重要组织。

宫骶韧带：从子宫颈后上侧方，向两侧绕过直肠达第 2、3 骶椎前面的筋膜，韧带含平滑肌和结缔组织，将宫颈向后上牵引，间接保持子宫前倾的位置。

