

中西医内科学 50 题



1. 肺脓肿与癌性空洞继发感染的鉴别主要是
 - A. 咳嗽，咯脓痰
 - B. 血的白细胞检查
 - C. 发热的轻重
 - D. 脓痰的多少
 - E. X线检查或痰液细胞学检查
2. 下列有关急性上呼吸道感染的发病机制，说法错误的是
 - A. 多由细菌引起，少数为病毒所致
 - B. 全年皆可发病，以冬春季多发
 - C. 病毒和细菌等可通过飞沫传播
 - D. 发病与年龄、体质密切相关
 - E. 病程较短，预后较好
3. 慢性支气管炎 X 线检查可见
 - A. 两肺纹理增粗，呈网状或条索状，以下肺野较明显
 - B. 肺纹理增粗或呈卷发状
 - C. 两肺野透亮度增加，肺血管纹理外带纤细、稀疏和变直，内带的血管纹理可增粗或紊乱
 - D. 块状阴影或结节状影
 - E. 肺动脉影增宽
4. COPD 的标志性症状是
 - A. 慢性咳嗽
 - B. 咳痰
 - C. 气短、喘息或呼吸困难
 - D. 体温升高
 - E. 食欲减退
5. 哮病发病的夙根是
 - A. 宿痰伏肺
 - B. 先天不足
 - C. 饮食不当
 - D. 气候变化
 - E. 外邪侵袭
6. 支气管哮喘早期发作时 X 线表现为

- A. 肺纹理增多
- B. 可见两肺透亮度增加
- C. 患侧透亮度增强，肺纹理消失
- D. 左心大，肺淤血征
- E. 肺纹理增多及炎症浸润影

7. 诊断原发性支气管肺癌最可靠的手段是

- A. 病史及体征
- B. 胸部影像学检查
- C. 癌标志物检测及基因诊断
- D. 痰脱落细胞学、组织病理学检查
- E. 放射性核素扫描检查

8. 不属于肺炎链球菌肺炎病理改变分期的是

- A. 充血期
- B. 红色肝变期
- C. 灰色肝变期
- D. 消散期
- E. 吸收期

9. 发现肺癌的最基本的检查是

- A. 胸部X线检查
- B. 痰脱落细胞学检查
- C. 放射性核素扫描检查
- D. 癌标志物检测
- E. 纤维支气管镜检查

10. 治疗慢性肺源性心脏病痰蒙神窍证选用的治法是

- A. 健脾益肺，化痰降气
- B. 清肺化痰，降逆平喘
- C. 涤痰开窍，息风止痉
- D. 温肺健脾，化饮利水
- E. 补肺纳肾，降气平喘

11. 冠心病与下列哪项因素关系不大

- A. 高脂血症
- B. 高血压病
- C. 吸烟
- D. 睡眠
- E. 糖尿病

12. 急性心肌梗死合并心源性休克的主要机制是

- A. 收缩期排血受阻
- B. 舒张期充盈不足
- C. 心肌广泛坏死，心排血量急剧下降
- D. 血容量不足
- E. 神经反射机制

13. 急性心衰的中医学范畴不包括

- A. 喘脱

- B. 心悸
- C. 心水
- D. 水肿
- E. 亡阳

14. 以下属于心力衰竭的发展阶段中为阶段B的是

- A. 器质性心脏病患者伴运动耐量下降
- B. 有器质性心脏病，既往或目前有心力衰竭的症状和/或体征
- C. 已发展成器质性心脏病，但从无心力衰竭的症状和/或体征
- D. 无心脏结构或功能异常，无心力衰竭症状和/或体征
- E. 需要特殊干预治疗的难治性心衰

15. 急性心肌梗死与心绞痛的临床表现，主要鉴别点是

- A. 疼痛的部位
- B. 疼痛持续时间长短
- C. 疼痛的性质
- D. 疼痛的程度
- E. 是否合并休克

16. 恶性高血压病人大多数以下列哪个器官的功能损害最为严重

- A. 肾脏
- B. 肝脏
- C. 心脏
- D. 眼底
- E. 脑组织

17. 急性肾小球肾炎多见于

- A. 老年人
- B. 青少年
- C. 儿童
- D. 壮年
- E. 各类人群

18. 最常见的心脏性猝死的病因是

- A. 冠心病
- B. 高血压
- C. 病态窦房结综合征
- D. QT间期延长综合征
- E. 肥厚梗阻型心肌病

19. 男性肝硬化患者常出现性欲减退，睾丸萎缩，乳房发育，蜘蛛痣。主要是由于

- A. 垂体功能减低
- B. 雌激素过多
- C. 孕激素过多
- D. 肾上腺皮质激素过多
- E. 以上均不是

20. 肝硬化患者最严重的并发症和最常见的死亡原因是

- A. 上消化道出血

- B. 原发性肝癌
- C. 感染
- D. 肝肾综合征
- E. 肝性脑病

21. 溃疡性结肠炎的腹痛特点是

- A. 疼痛-饮食-缓解
- B. 饮食-疼痛-缓解
- C. 疼痛-休息-缓解
- D. 疼痛-便意-缓解
- E. 疼痛-缓解-便意

22. 治疗溃疡性结肠炎脾肾阳虚证首选

- A. 四神丸
- B. 实脾散
- C. 痛泻要方
- D. 参苓白术散
- E. 腹下逐瘀汤

23. 上消化道出血主要病因是

- A. 胃炎
- B. 胃癌
- C. 曲张的食管静脉破裂
- D. 消化性溃疡
- E. 胃黏膜脱垂症

24. 胃癌最常见的转移途径是

- A. 直接蔓延
- B. 腹腔内种植
- C. 血行转移
- D. 胃肠道播散
- E. 淋巴结转移

25. 目前根治原发性肝癌的最好方法是

- A. 放射治疗
- B. 免疫治疗
- C. 抗癌药物局部治疗
- D. 冷冻治疗
- E. 手术切除

26. 中晚期胃癌体征中最常见的是

- A. 早饱
- B. 纳差
- C. 腹胀
- D. 上腹压痛
- E. 体重下降

27. 慢性胃炎主要病理学特征是

- A. 炎症，萎缩，异常增生
- B. 萎缩，化生，异常增生

- C. 炎症，萎缩和肠化生
D. 萎缩和化生
E. 以上均不是

28. 治疗溃疡性结肠炎气滞血瘀证首选

- A. 四神丸
B. 驻车丸
C. 桃红四物汤
D. 仙方活命饮
E. 脾下逐瘀汤

29. 消化性溃疡的临床主要特征是

- A. 反酸明显
B. 恶心、呕吐
C. 喘气不舒
D. 节律性上腹痛
E. 黑粪

30. 溃疡病病人并发消化道大出血时，下述症状不常出现的是

- A. 呕血或黑粪
B. 贫血
C. 氮质血症
D. 高热
E. 失血性周围循环衰竭

31. 急性肾损伤的中医病机是

- A. 肾失气化，水湿浊瘀不能排出体外
B. 肾元虚衰，湿浊内蕴
C. 药毒伤肾
D. 劳伤久病，脾肾亏虚
E. 饮食不当

32. 急性肾损伤急诊透析的指针不包括

- A. 无尿 2 天
B. 代谢性酸中毒
C. 尿毒症症状明显
D. 血钾超过 5.5mmol/L
E. 肌酐清除率较正常下降超过 50%

33. 肾性贫血与以下哪种因素有关

- A. 叶酸缺乏
B. 铁缺乏
C. 失血过多
D. 红细胞生成素缺乏
E. 饮食减少

34. 最易引起尿路感染的细菌是

- A. 葡萄球菌
B. 大肠杆菌
C. 粪链球菌

- D. 变形杆菌
- E. 产气杆菌

35. 急性粒细胞缺乏症与白细胞不增多型白血病的主要鉴别点为

- A. 贫血
- B. 血小板减少
- C. 出血
- D. 骨髓及外周血幼稚细胞增多
- E. 骨髓增生活跃

36. 下列哪项不是骨髓增生异常综合征的中医病因病机

- A. 先天不足
- B. 后天失养
- C. 肝气不舒
- D. 饮食所伤
- E. 药毒中伤

37. 诊断急性白血病时，最具有决定性价值的是

- A. 血液检查
- B. CT 检查
- C. B 超检查
- D. 骨髓象检查
- E. 临床症状

38. 缺铁性贫血的病位及相关脏腑是

- A. 病位在脾肾，与肝胆相关
- B. 病位在脾胃，与肝肾相关
- C. 病位在心脾，与肝肾相关
- D. 病位在肝脾，与心肾相关
- E. 病位在脾胃，与心肝相关

39. 与原发免疫性血小板减少症发病有密切关系的是

- A. 饮食因素
- B. 环境因素
- C. 遗传因素
- D. 传染病
- E. 病毒或细菌感染

40. 治疗缺铁性贫血的前提是

- A. 病因诊断
- B. 病理诊断
- C. 西医诊断
- D. 中医诊断
- E. 临床诊断

41. 痛风发作当尿酸排泄减少时，血尿酸浓度一般超过

- A. 416mmol/L
- B. 416 μ mol/L
- C. 416nmol/L
- D. 416pmol/L

E. 416mol/L

42. 下列不属痛风病因的是

A. 风寒湿阻

B. 风湿热郁

C. 脾虚湿困

D. 痰瘀痹阻

E. 肝肾亏虚

43. 痛风诊断的金标准为

A. 血尿酸测定

B. 尿尿酸测定

C. 滑囊液检查

D. X线检查

E. 超声检查

44. 治疗甲亢手术的方式主要是

A. 休息

B. 化疗

C. 甲状腺全切

D. ^{131}I 放射性治疗

E. 甲状腺次全切除术

45. 胰岛素的主要不良反应是

A. 过敏反应

B. 视光不正

C. 低血糖反应

D. 胰岛素性水肿

E. 注射部位脂肪营养不良

46. 类风湿关节炎发病的内在因素是

A. 湿热痹阻

B. 阴虚内热

C. 真虚不足，劳逸失度

D. 痰瘀互结，经脉痹阻

E. 肝肾亏损，邪痹筋骨

47. 治疗短暂性脑缺血发作肝肾阴虚、风阳上扰证的首选方剂是

A. 黄连温胆汤

B. 真方白丸子

C. 镇肝息风汤

D. 补阳还五汤

E. 桃红四物汤

48. 急性一氧化碳重度中毒临幊上主要表现为

A. 头痛

B. 头晕

C. 恶心

D. 呕吐

E. 反射消失

49. 血证由外邪所致者多是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 热邪
- D. 燥邪
- E. 湿邪

50. 腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，身体困重，舌苔黄腻，脉濡数，治宜

- A. 清热化痰，舒筋通络
- B. 利水消肿，舒筋通络
- C. 健脾渗湿，舒筋止痛
- D. 活血化瘀，通络止痛
- E. 清热利湿，舒筋止痛

答案部分

1. 【正确答案】E

【答案解析】肺脓肿应与癌性空洞继发感染相鉴别。原发性肺脓肿起病急，伴高热，咳大量脓痰，中毒症状明显，胸片上表现为薄壁空洞，内有液平，周围有炎症改变。癌性空洞常先有咳嗽、咯血等肿瘤症状，后出现咳脓痰、发热等继发感染症状。胸片可见癌肿块影有偏心空洞，壁厚，内壁凸凹不平。

2. 【正确答案】A

【答案解析】急性上呼吸道感染 70%~80%由病毒引起，少数为细菌所致。

3. 【正确答案】A

【答案解析】慢性支气管炎，X线检查，早期可无异常，随着病情发展，可见肺纹理增多、变粗、扭曲，呈网状或条索状阴影，向肺野周围延伸，以两肺中下野明显。

4. 【正确答案】C

【答案解析】慢性阻塞性肺疾病的临床表现：早期劳力时出现气短、喘息或呼吸困难，后逐渐加重，是 COPD 的标志性症状。

5. 【正确答案】A

【答案解析】哮病病理因素以痰为主。本病多有宿痰内伏于肺，由于复感外邪、饮食、情志、劳倦等，诱动内伏之宿痰，致痰阻气道，痰饮气升，气因痰阻，壅塞气道，壅遏肺气，肺气上逆、气机不利而发病。痰主要由于肺不布津，脾失转输，肝不散精，肾失蒸腾气化，以致津液凝聚成痰，伏藏于肺，成为发病的“夙根”，遇各种诱因而引发。

6. 【正确答案】B

【答案解析】支气管哮喘早期发作时可见两肺透亮度增加，缓解期多无明显异常。

7. 【正确答案】D

【答案解析】痰脱落细胞检查是诊断肺癌的重要方法之一。

病理学检查：取得病变部位组织，进行病理学检查，对肺癌的诊断具有决定性意义。

8. 【正确答案】E

【答案解析】肺炎链球菌肺炎：多呈大叶性或肺段性分布。病理变化可分为四期：早期为充血期，表现为肺组织充血、扩张、水肿和浆液性渗出；继而为红色肝变期，肺泡内有大量中性粒细胞、吞噬细胞及红细胞的渗出；进而为灰色肝变期，大量白细胞纤维蛋白渗出；最后为消散期，纤维蛋白性渗出物溶解、吸收，肺泡重新充气。

9. 【正确答案】A

【答案解析】胸部 X 线检查：是发现肺癌的最基本方法。

10. 【正确答案】C

【答案解析】慢性肺源性心脏病痰蒙神窍证

证候：神志恍惚，谵语，烦躁不安，撮空理线，表情淡漠，嗜睡，昏迷，或肢体（目闰）动，抽搐，咳逆，喘促，咳痰不爽，苔白腻或淡黄腻，舌质暗红或淡紫，脉细滑数。

治法：涤痰开窍，息风止痉。

方药：涤痰汤加减，另服安宫牛黄丸或至宝丹。

11. 【正确答案】D

【答案解析】冠心病的病因是冠状动脉粥样硬化，与下列因素有关：①血脂异常；②高血压；③吸烟；④糖尿病或糖耐量异常；⑤性别；⑥年龄；⑦肥胖；⑧家族史。

12. 【正确答案】C

【答案解析】急性心肌梗死低血压和休克：主要是心源性，心肌广泛（40%以上）坏死，心排血量急剧下降所致，神经反射引起的周围血管扩张属次要，有些患者尚有血容量不足的因素参与。

13. 【正确答案】B

【答案解析】急性心衰属中医学“喘脱”、“心水”、“水肿”、“亡阳”、“厥脱”等范畴。

14. 【正确答案】C

【答案解析】阶段 A（前心力衰竭阶段） 患者为心力衰竭的高危人群，无心脏结构或功能异常，无心力衰竭症状和/或体征。包括高血压、冠心病、糖尿病、肥胖、代谢综合征、使用心脏毒性药物史、风湿热史、心肌病家族史等。

阶段 B（前临床心力衰竭阶段） 患者已发展成器质性心脏病，但从无心力衰竭的症状和/或体征。如左心室肥厚、陈旧性心肌梗死、无症状的心脏瓣膜病等。

阶段 C（临床心力衰竭阶段） 患者有器质性心脏病，既往或目前有心力衰竭的症状和/或体征。器质性心脏病患者伴运动耐量下降（呼吸困难、疲乏）和液体潴留。

阶段 D（难治性终末期心力衰竭阶段） 患者有器质性心脏病不断进展，虽经积极的内科治疗，休息时仍有症状，且需要特殊干预。包括因心力衰竭反复住院，且不能安全出院者；需要长期静脉用药者；等待心脏移植者；使用心脏机械辅助装置者。

15. 【正确答案】B

【答案解析】急性心肌梗死疼痛持续时间多超过 30 分钟。心绞痛疼痛出现后常逐步加重，然后在 3~5 分钟内渐消失，很少超过 15 分钟。

16. 【正确答案】A

【答案解析】恶性高血压：肾功能损害明显，出现蛋白尿、血尿、管型尿，迅速发生肾功能不全。

17. 【正确答案】B

【答案解析】急性肾小球肾炎：起病急骤，发病前 1~3 周多有链球菌感染史，有发热、水肿、血尿等表现。尿常规检查可见蛋白、红细胞和管型，血压为一过性升高。青少年多见。

18. 【正确答案】A

【答案解析】80%由冠心病及其并发症引起，此外为心肌病（肥厚型、扩张型）、心瓣膜病、先天性心血管疾病、急性心包填塞、心力衰竭、电解质紊乱、Q-T 间期延长综合征、神经内分泌等因素所致的电不稳定性和等。

19. 【正确答案】B

【答案解析】肝功能减退时，对内分泌激素灭活作用减弱，主要有雌激素、醛固酮及抗利尿激素增多。由于雄、雌激素平衡失调，男性患者常有性欲减退、睾丸萎缩、毛发脱落及乳房发育等。

20. 【正确答案】E

【答案解析】肝性脑病是肝硬化最严重的并发症，亦是最常见的死亡原因。主要临床表现为性格行为失常、意识障碍、昏迷。

21. 【正确答案】D

【答案解析】溃疡性结肠炎有“疼痛-便意-便后缓解”的规律。

22. 【正确答案】A

【答案解析】溃疡性结肠炎脾肾阳虚证治法为健脾温肾止泻，方药首选四神丸加味。

23. 【正确答案】D

【答案解析】消化性溃疡是上消化道出血主要原因。

24. 【正确答案】E

【答案解析】淋巴结转移：是最早、最常见的转移方式，通过淋巴管转移到局部（胃旁）及远处淋巴结，如转移至左锁骨上时称为 Virchow 淋巴结。

25. 【正确答案】E

【答案解析】手术切除仍是目前根治原发性肝癌的最好方法。

26. 【正确答案】D

【答案解析】进展期胃癌最早出现的症状是上腹痛，可伴早饱、纳差、腹胀、体重下降等。

早期胃癌可无任何体征，中晚期癌的体征中以上腹压痛最为常见。

27. 【正确答案】C

【答案解析】慢性胃炎病理变化是胃黏膜损伤与修复的慢性过程，主要病理学特征是炎症、萎缩和肠化生。

28. 【正确答案】E

【答案解析】溃疡性结肠炎气滞血瘀证治法为化瘀通络，方药首选膈下逐瘀汤加减。

29. 【正确答案】D

【答案解析】消化性溃疡主要表现为节律性上腹痛，周期性发作，伴有中上腹饱胀、嗳气、反酸等。

30. 【正确答案】D

【答案解析】除了选项 D 外，其余选项是在溃疡病人并发消化道大出血时均会出现的症状。

出血是消化性溃疡最常见的并发症，DU 较 GU 更多并发出血，尤以十二指肠球部后壁和球后溃疡更多见；出血常因溃疡侵蚀周围血管所致，是上消化道大出血最常见的病因。临床表现取决于出血量的多少，轻者只表现为黑便，重者出现呕血和循环衰竭表现，如休克等。出血前常有上腹疼痛加重现象，出血后疼痛反减轻；少数病人（尤其是老年病人）并发出血前可无症状。

31. 【正确答案】A

【答案解析】急性肾损伤病机主要为肾失气化，水湿浊瘀不能排出体外。

32. 【正确答案】D

【答案解析】出现下列指征的急性肾损伤患者，应考虑进行急诊透析：①少尿或无尿 2 天；②尿毒症症状明显；③肌酐清除率较正常下降超过 50%，或血尿素氮升高达 21mmol/L ，血肌酐升高达 $442\mu\text{mol/L}$ ；④血钾超过 6.5mmol/L ；⑤代谢性酸中毒， $\text{CO}_2-\text{CP} \leqslant 13\text{mmol/L}$ ；⑥脑水肿、肺水肿或充血性心力衰竭。

33. 【正确答案】D

【答案解析】体液因子如红细胞生成素（EPO）、骨化三醇的缺乏，可分别引起肾性贫血和肾性骨病。

34. 【正确答案】B

【答案解析】革兰阴性菌属引起的泌尿系感染约占 75%，阳性菌属约占 25%。革兰阴性菌属中以大肠杆菌最为常见，约占 80%；革兰阳性菌属中以葡萄球菌最为常见。

35. 【正确答案】D

【答案解析】白细胞不增多型白血病：多伴有贫血、血小板减少及不同部位出血；浓缩外周血涂片可找到幼稚细胞，骨髓检查原始细胞和其他幼稚细胞增多，可资鉴别。

36. 【正确答案】C

【答案解析】骨髓增生异常综合征发病主要与先天不足、后天失调、饮食所伤、药毒中伤等因素相关。

37. 【正确答案】D

【答案解析】对于急性白血病，骨髓象具有决定性诊断价值。

38. 【正确答案】B

【答案解析】缺铁性贫血病位在脾胃，与肝、肾相关。

39. 【正确答案】E

【答案解析】细菌或病毒感染与原发免疫性血小板减少症发病有密切关系。

40. 【正确答案】A

【答案解析】（缺铁性贫血）IDA 的病因诊断是治疗 IDA 的前提，如婴幼儿、青少年和妊娠妇女营养不足引起的 IDA，应改善饮食；胃、十二指肠溃疡伴慢性失血或胃癌术后残胃癌所致的 IDA，应多次检查大便潜血、做胃肠道 X 线或内镜检查，必要时手术根治；月经过多引起的 IDA 应调理月经；寄生虫感染者应驱虫治疗等。

41. 【正确答案】B

【答案解析】低嘌呤饮食 5 天后，24 小时尿尿酸 $>3.6 \text{ mmol}$ (600mg)，为尿酸生成过多；如 $<3.6 \text{ mmol}$ 而血尿酸 $\geq 416 \text{ umol/L}$ ，为尿酸排泄减少。

42. 【正确答案】C

【答案解析】痛风的中医病因为：风寒湿阻，风湿热郁，痰瘀痹阻，肝肾亏虚。

43. 【正确答案】C

【答案解析】滑囊液检查具有确诊意义，为痛风诊断的“金标准”。

44. 【正确答案】E

【答案解析】外科手术是治疗甲状腺功能亢进症的有效手段之一，手术的方式主要是甲状腺次全切除术。

45. 【正确答案】C

【答案解析】胰岛素的主要不良反应是低血糖反应，其他包括过敏反应、胰岛素性水肿、屈光不正、注射部位脂肪营养不良等。

46. 【正确答案】C

【答案解析】正气虚弱是本病发病的内在因素，凡禀赋不足、劳逸失度、情志失调、饮食所伤等均易受外邪侵袭。

47. 【正确答案】C

【答案解析】肝肾阴虚、风阳上扰证

证候：头晕目眩，甚则欲仆，目胀耳鸣，心中烦热，多梦健忘，肢体麻木，或卒然半身不遂，言语謇涩，但瞬时即过，舌质红，苔薄白或少苔，脉弦或细数。

治法：平肝息风，育阴潜阳。

方药：镇肝息风汤加减。

48. 【正确答案】E

【答案解析】重度中毒 血 COHb 浓度高于 50%。呈深昏迷状态，各种反射消失。部分患者表现为去大脑皮质状态（睁眼昏迷）。体温升高，呼吸频数，严重时呼吸衰竭，脉搏快而弱，血压下降。如空气中 CO 浓度很高，患者可在几次深呼吸后立即突然发生昏迷、惊厥、呼吸困难以致呼吸麻痹，称为“闪电样中毒”。重度中毒常出现吸入性肺炎、肺水肿、心律失常、心肌梗死、皮肤水疱、急性肾衰竭、脑局灶损害、上消化道出血等并发症。

49. 【正确答案】C

【答案解析】外邪侵袭，或因热病损伤脉络而引起出血，其中以热邪及湿热所致者为多。

50. 【正确答案】E

【答案解析】湿热腰痛证

证候：腰部弛痛，痛处伴有热感，暑湿阴雨天加重，活动后或可减轻，小便短赤，苔黄腻，脉濡数或弦数。

治法：清热利湿，舒筋止痛。

方药：四妙丸加减。