

医学教育网初级药士：《答疑周刊》2022年第17期

问题索引：

1. 【问题】水、钠代谢障碍。

2. 【问题】细胞膜的物质转运功能。

3. 【问题】变态反应的分类。

具体解答：

1. 【问题】水、钠代谢障碍。

【解答】[医学教育网原创]

1. 低渗性脱水（低容量性低钠血症）	
特点	失钠>失水 血清 Na ⁺ 浓度<130mmol/L 血浆渗透压<280mOsm/L 伴有细胞外液量的减少
病因和机制	基本机制是钠、水大量丢失后，仅给予水的补充 (1) 肾丢失钠水：①长期连续使用利尿剂：如呋塞米、依他尼酸、噻嗪类等。②肾上腺皮质功能不全：醛固酮分泌不足。③肾实质性疾病：慢性间质性肾疾患。④肾小管酸中毒。 (2) 肾外丢失：①经消化道丢失：如呕吐、腹泻。②液体在第三间隙：形成大量胸水、大量腹水。③经皮肤丢失：大量出汗、大面积烧伤等
2. 高渗性脱水（低容量性高钠血症）	
特点	失水>失钠 血清 Na ⁺ 浓度>150mmol/L 血浆渗透压>310mOsm/L 细胞内、外液量均减少
病因和机制	(1) 摄入过少：水源断绝，饮水、进食困难 (2) 丢失过多：①经呼吸道失水，如癔症、代谢性酸中毒等所致过度通气；②经皮肤失水：见于高热、大量出汗（长跑）、甲亢；③经肾失水见于中枢性尿崩症、肾性尿崩症、大量应用脱水剂等；④经消化道丢失如呕吐、腹泻及消化道引流等
3. 等渗性脱水（血钠浓度正常的血容量不足）	
特点	钠、水等比例丢失，血容量减少，血钠浓度在正常范围，所以要补充平衡盐溶液
病因和机制	任何原因致短时间内等渗性体液大量丢失。见于①经胃肠道丢失：呕吐，腹泻；②经皮肤丢失：大面积烧伤；③大量抽放胸水、腹水等
表现	见口渴、体位性低血压，甚至休克等，其发生与血容量减少有关
4. 水中毒（高容量性低钠血症）	
特点	血清 Na ⁺ 浓度<130mmol/L

	血浆渗透压 < 280mmol/L 体钠总量正常或增多，体液量明显增多
病因和机制	由于过多的低渗性体液在体内潴留造成细胞内外液量都增多，引起重要器官功能严重障碍 (1) 水摄入过多：如用无盐水灌肠引起肠道吸收水分过多、精神性饮水过量和持续性大量饮水等。静脉输入含盐少或不含盐的液体过多过快，超过肾脏的排水能力 (2) 水排出减少：多见于急性肾衰竭，ADH 分泌过多
5. 水肿	
特点	液体在组织间隙或体腔内过多聚集的病理过程
病因和机制	① 血管内外液体交换平衡失调——组织液生成大于回流：毛细血管流体静水压增高、血浆胶体渗透压降低、微血管壁通透性增加、淋巴回流受阻。 ② 体内外液体交换平衡失调——钠、水潴留：肾小球滤过率下降、肾小管重吸收钠水增多

2. 【问题】细胞膜的物质转运功能。

【解答】[医学教育网原创]

	单纯扩散	易化扩散	主动转运（原和继）
举例	脂溶性物质 O ₂ 、CO ₂ 、N ₂ 、NH ₃ 、H ₂ O、乙醇、甘油、尿素及类固醇激素等	非脂溶性物质 K ⁺ 、Na ⁺ 、Cl ⁻ 、Ca ²⁺ 葡萄糖，氨基酸	K ⁺ 、Na ⁺ 、Cl ⁻ 、Ca ²⁺ 葡萄糖，氨基酸、神经递质、甲状腺素
移动方向	高浓度→低浓度	高浓度→低浓度	低浓度→高浓度
移动过程	自由扩散	通道或载体	需 Na ⁺ 泵、Ca ²⁺ 泵、H ⁺ 泵的参与

3. 【问题】抗菌药物的作用机制。

【解答】[医学教育网原创]

1. 干扰细菌细胞壁合成：如 β-内酰胺类抗生素
2. 影响细胞膜通透性：如多肽类抗生素。
3. 抑制细菌蛋白质合成：如氨基糖苷类、四环素类（作用于 30S 亚基）、大环内酯类、氯霉素、林可霉素（作用于 50S 亚基）。
4. 抑制核酸代谢：抑制 RNA 多聚酶，阻碍 mRNA 的合成如利福平；抑制 DNA 回旋酶，妨碍细菌 DNA 的复制如喹诺酮类。
5. 影响叶酸代谢：如磺胺类和甲氧苄啶可分别抑制二氢叶酸合成酶与二氢叶酸还原酶，影响叶酸的代谢。