

2021年《中药学综合知识与技能》考前密卷（一）答案解析

一、最佳选择题

1.

【正确答案】 A

【答案解析】 《神农本草经》全书共3卷，序例1卷。该书序例部分，包括药物三品分类原则、君臣佐使配合、七情、四气五味、采造时月、真伪新陈、药性调剂宜忌、用药察源、毒药用法、用药大法、服药时间、大病之主等。载药365种。其分类原则是：上品120种，无毒，欲轻身益气，不老延年者；中品120种，无毒有毒斟酌其宜，欲遏病补虚羸者；下品125种，多毒，欲除寒热邪气，破积聚愈疾者。

2. 【正确答案】 B

【答案解析】 健胃消食药宜饭后服，如保和丸、大山楂丸等。

3. 【正确答案】 C

【答案解析】 执业药师向患者提供咨询服务活动中，要注意到患者对信息的要求及解释上存在种族、文化背景、性别及年龄的差异，适宜的方式方法，并注意尊重患者的个人意愿。

(1) 对特殊人群需注意的问题 老年人由于认知能力下降，因此向他们作解释时语速宜慢，还可以适当的多用些文字、图片形式以方便他们理解和记忆。对于女性咨询患者，还要注意询问是否已经怀孕或有否准备怀孕的打算；是否正在哺乳，这些都是需要在解答问题中特别要注意的地方。患者的疾病状况也是不能忽视的问题。比如，患者有肝、肾功能障碍，会影响药物的代谢和排泄，容易导致药品不良反应的发生和中毒。

(2) 解释的技巧 对于一般患者的咨询要以容易理解的医学术语来解释。对患者来说，尽量使用描述性语言以便患者能正确理解，还可以采取语言与书面解释方式同时并用。尽量不用带数字的术语来表示。

(3) 尊重患者的意愿，保护患者的隐私在药学实践工作中，一定要尊重患者的意愿，保护患者的隐私，更不应该将咨询档案等患者的信息资料用于商业目的。

(4) 及时回答不拖延 对于患者所咨询的问题，能够给予当即解答的就当即解答，不能当即答复的，或者不十分清楚的问题，不要冒失地回答，要问清对方何时需要答复；待进一步查询相关资料以后尽快给予正确的答复。拖延太久的答案时常会失去它的意义。因此，如何有效的利用资源，用较少的时间来回答问题，不仅受条件设施的影响，还与执业药师自身的知识结构和表达能力有关。

4. 【正确答案】 D

【答案解析】 在诊法方面，用阴阳的属性来分析四诊收集到的临床症状和体征。如以色泽的明暗分阴阳，鲜明者为病在阳分，晦暗者为病在阴分。以声息的动态分阴阳属性，

语声高亢洪亮、多言而躁动者，多属实、属热，为阳；语声低微无力、少言而沉静者，多属虚、属寒，为阴；呼吸微弱，声低气怯，多属于阴证；呼吸有力，声高气粗，多属于阳证。以脉象部位分阴阳，则寸为阳，尺为阴；以至数分，则数者为阳，迟者为阴；以形态分，则浮大洪滑为阳，沉小细涩为阴。

5. 【正确答案】 B

【答案解析】 “五心烦热，颧红，盗汗，舌红少津，脉细数无力”可辨证为阴虚证。阴虚不能制阳而致阳亢者，属虚热证，一般不能用寒凉药直折其热，须用“壮水之主，以制阳光”即用滋阴壮水之法，以抑制阳亢火盛，这种治疗原则亦称为“阳病治阴”。

6. 【正确答案】 D

【答案解析】 气的固摄作用，主要是对于精、血、津液等物质具有防止其无故流失，以及维护脏腑器官各自位置的相对恒定等作用。具体表现在：固摄血液，即维持血液在脉管内循行，防止逸出脉外；固摄汗液、尿液、唾液、胃液、肠液等正常物质分泌和排泄，防止其无故外泄和流失，从而维持体内水液代谢的相对平衡；维持脏腑器官位置的稳定，使之保持正常的生理活动和脏腑之间功能的相互协调，维持胎儿在胞宫内的安定和正常发育等。

7. 【正确答案】 C

【答案解析】 偏阴质是指具有代谢相对抑制、身体偏寒、喜静少动等特征的体质类型。

8. 【正确答案】 A

【答案解析】 表里用以分辨疾病病位与病势的浅深。

9. 【正确答案】 D

【答案解析】 望头发：主要望发的质和色的变化。如发稀疏易落，或干枯不荣，多为精血不足之证；突然出现片状脱发，多属血虚受风；年少落发，不属于肾虚，便属于血热。青年白发，无其他病象者不属病态。头发的质和色与家族遗传也直接相关。

10. 【正确答案】 A

【答案解析】 热证的临床表现及辨证要点：热证，热证多由外感火热之邪，或因七情过激，郁而化火，或饮食不节，积蓄为热，或房事劳倦，劫夺阴精，阴虚阳亢，或阳盛阴虚，表现为机体的功能活动亢进的证候。

其临床表现多见发热喜凉，口渴饮冷，面红目赤，烦躁不宁，小便短赤，大便燥结，舌红苔黄而干燥，脉数等症状。以热为主，功能活动亢进为辨证要点。

11. 【正确答案】 C

【答案解析】 心脾两虚证临床常见心悸怔忡，失眠多梦，健忘，食纳减少，腹胀，大便溏泻，倦怠乏力，舌质淡嫩，脉细弱。

12. 【正确答案】 D

【答案解析】 淀粉酶活性增高的临床意义有诊断胰腺炎：①急性胰腺炎是 AMY 增高的最常见原因；②其他：慢性胰腺炎急性发作、胰腺囊肿、胰腺管阻塞时 AMY 也可升高。

13. 【正确答案】 B

【答案解析】 空腹血糖 (FBG)：3.9~6.1mmol/L。5.6 在此范围内，指标正常。

TG：合适水平是 0.56~1.70mmol/L。2.45 不在此范围内，指标异常。

TC：合适水平是 < 5.20mmol/L。5.16 在此范围内，指标正常。

HDL：合适水平是 > 1.04 mmol/L。1.4 在此范围内，指标正常。

LDL：合适水平是 ≤ 3.4 mmol/L。2.27 在此范围内，指标正常。

14. 【正确答案】 C

【答案解析】 阴盛格阳：临床除可见四肢厥逆、下利清谷、脉微欲绝等症状外，又可见阳浮于外之症，如身热反不恶寒（但欲盖衣被）、面颊泛红等假热之象，应属真寒假热之证。此时应采用“热因热用”的治法，以热治热，即用热性药物治疗具有假热症状的病证。适用于阴寒内盛，格阳于外，反见热象的真寒假热证。

15. 【正确答案】 D

【答案解析】 气虚感冒

【症状】发热，恶寒较甚，无汗，头痛鼻塞，身楚倦怠，咳嗽，痰白，咳痰无力。舌淡，苔白，脉浮而无力。

【治法】益气解表。

16. 【正确答案】 C

【答案解析】 咳嗽——风热犯肺证

【症状】咳嗽频剧，气粗，或咳声嘎哑，咳痰不爽，痰黏稠或稠黄，喉燥咽痛，口渴，鼻流黄涕，头痛，肢楚，恶风身热。舌边尖红，苔薄黄，脉浮数。

【治法】疏风清热，宣肺止咳。

17. 【正确答案】 A

【答案解析】 胸痹——气虚血瘀证

【症状】胸痛隐隐，遇劳则发，神疲乏力，气短懒言，心悸自汗。舌胖有齿痕，色淡暗，苔薄白，脉弱而涩，或结、代。

【治法】益气活血，通脉止痛。

【方剂应用】基础方剂：补阳还五汤（当归、川芎、黄芪、桃仁、红花、地龙、赤芍）加减。

18. 【正确答案】 B

【答案解析】 胃痛——饮食伤胃证【方剂应用】基础方剂：保和丸(山楂、神曲、茯苓、半夏、莱菔子、陈皮、连翘、麦芽)加减。

19. 【正确答案】 C

【答案解析】 便秘——冷秘【症状】大便艰涩，腹痛拘急，胀满拒按，胁下偏痛，手足不温，呃逆呕吐。舌苔白腻，脉弦紧。

【方剂应用】基础方剂温脾汤(附子、人参、大黄、干姜、甘草)合半硫丸(半夏、硫黄)加减。

20. 【正确答案】 D

【答案解析】 根据患者症状应辨证为眩晕——肾精不足证。
眩晕——肾精不足证可选用的中成药有左归丸、古汉养生精。

21. 【正确答案】 D

【答案解析】 中风——风痰入络证
【症状】肌肤不仁，手足麻木，突然发生口眼喎斜，语言不利，口角流涎，舌强语蹇，甚则半身不遂，或兼见手足拘挛，关节酸痛等症。舌苔薄白，脉浮数。

【治法】祛风化痰通络。

【方剂应用】基础方剂真方白丸子(半夏、白附子、天南星、天麻、川乌、全蝎、木香、枳壳)加减。

22. 【正确答案】 E

【答案解析】 水肿——湿热壅盛证【症状】遍体浮肿，皮肤绷急光亮，胸脘痞闷，烦热口渴，小便短赤，或大便干结。舌红，苔黄腻，脉沉数或濡数。

23. 【正确答案】 A

【答案解析】 虚劳——气虚证【症状】面色(白光)白或萎黄，气短懒言，语声低微，头昏神疲，肢体无力。舌质淡，或有齿痕，舌苔薄白，脉虚无力。

【方剂应用】基础方剂：四君子汤(人参、白术、茯苓、炙甘草)加减。

24. 【正确答案】 B

【答案解析】 积聚——气滞血瘀证【症状】腹部积块质软不坚，固定不移，胀痛不适。舌苔薄，脉弦。

【方剂应用】基础方剂 柴胡疏肝散(陈皮、柴胡、川芎、枳壳、芍药、炙甘草、香附)合失笑散(蒲黄、五灵脂)加减。

25. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者为湿热蕴结所致的疖，治疗可选用的中成药有皮肤病血毒丸、老鹤草软膏。

26. 【正确答案】 B

【答案解析】 乳癖——肝郁痰凝证【症状】多见于青壮年妇女。乳房肿块，质韧不坚，胀痛或刺痛，症状常随喜怒消长；伴胸闷胁胀，善郁易怒，失眠多梦，心烦口苦。舌苔薄黄，脉弦滑。

中成药可选用乳核散结片、乳疾灵颗粒。

27. 【正确答案】 D

【答案解析】 瘾疹——风寒束表证【症状】风团色白，遇寒加重，得暖则减；伴恶寒，口不渴。舌质淡红，苔薄白，脉浮紧。

【方剂应用】基础方剂：桂枝麻黄各半汤(桂枝、芍药、生姜、甘草、麻黄、大枣、苦杏仁)加减。

28. 【正确答案】 D

【答案解析】 患者为男性不育症——湿热下注证。男性不育症——湿热下注证【方剂应用】基础方剂：程氏萆薢分清饮(萆薢、黄柏、石菖蒲、茯苓、白术、莲子心、丹参、车前子)加减。

29. 【正确答案】 D

【答案解析】 月经先期——肝郁血热证【症状】月经周期提前，经量或多或少，经色深红或紫红，质稠，经行不畅，或有块；或少腹胀痛，或胸闷胁胀，或乳房胀痛，或心烦易怒，口苦咽干。舌红，苔薄黄，脉弦数。

【方剂应用】基础方剂：丹栀逍遥散(丹皮、栀子、当归、白芍、柴胡、白术、茯苓、煨姜、薄荷、炙甘草)加减。

30. 【正确答案】 A

【答案解析】 绝经前后诸症-阴虚火旺证【症状】绝经前后，月经紊乱，心烦易怒，懊恼不安，坐卧不宁，哭笑无常，夜卧多梦善惊，口干渴饮，尿黄便燥。舌质红，苔薄黄，脉弦细而数。【方剂应用】基础方剂 百合地黄汤(百合、生地黄)加减。

31. 【正确答案】 B

【答案解析】 根据患者的症状“发热恶风，脉浮数，舌红苔黄”等可辨证为风热外袭型咽喉肿痛。咽喉肿痛——风热外袭证【方剂应用】基础方剂：疏风清热汤(荆芥、防风、牛蒡子、甘草、金银花、连翘、桑白皮、赤芍、桔梗、黄芩、天花粉、玄参、浙贝母)加减。

32. 【正确答案】 B

【答案解析】 八味沉香散由沉香、肉豆蔻、广枣、石灰华、乳香、木香、诃子(煨)、木棉花 8 味药加工制成的散剂。功能清心热，养心，安神，开窍。用于热病攻心，神昏谵语；冠心病，心绞痛。

33. 【正确答案】 B

【答案解析】 “赫依” “希日” “巴达干” 为三根，是人体的本基。蒙医用三根的动态关系来解释人体的生理、病理现象。其中，“赫依”属五元之气，中性，是生命活动（包括语言思维）动力的支配者；“希日”属五元之火，是机体阳或热能的基物；“巴达干”属五元之土和水，是机体阴或寒性的基物。

34. 【正确答案】 E

【答案解析】 药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。

“四查十对”记忆技巧：方三品四配二合一。

35. 【正确答案】 C

【答案解析】 大黄功用泻下攻积、清热泻火、凉血解毒、逐瘀通络，大承气汤泻下用生大黄；大黄廑虫丸或加减方破瘀消癥则宜用熟大黄。

36. 【正确答案】 E

【答案解析】 同一植物来源但不同部位入药的并且功效不相同的饮片不能排列在一起，如麻黄与麻黄根。

37. 【正确答案】 C

【答案解析】 柴胡桂枝汤等具有抗癫痫作用的中药复方与西药抗癫痫药联用，可减少抗癫痫药的用量及肝损害、嗜睡等副作用。

38. 【正确答案】 C

【答案解析】 钩藤散、柴胡加龙骨牡蛎汤等与抗高血压药甲基多巴、卡托普利等联用，有利于改善对老年高血压症的治疗作用。

39. 【正确答案】 B

【答案解析】 丹参注射液与间羟胺（阿拉明）、多巴胺等升压药同用，不但能加强升压作用，还能减少对升压药的依赖性。

40. 【正确答案】 A

【答案解析】 香加皮心血管系统：主要为心律失常，如心率减慢、早搏、房室传导阻滞等。动物毒性实验表明香加皮中毒后多表现为血压先升而后下降、心肌收缩力增强、每分钟心输出量增加，继而心输出量减弱、心律失常，乃至心肌纤颤而死亡。

二、配伍选择题

[41~42]

41. 【正确答案】 E

【答案解析】 肝主疏泄功能，具体体现在五个方面：

- (1) 调畅情志
- (2) 协调脾胃升降
- (3) 促进胆汁生成与排泄
- (4) 促进血液运行和津液代谢
- (5) 调畅排精行经

42. 【正确答案】 A

【答案解析】 心的生理功能有二，一是心主血脉，主要体现在两个方面：（1）心有推动血液在脉管内运行的作用；（2）心对血液的生成也有一定的作用。二是心主神明，即心有主宰生命活动和主宰意识、思维、情志等精神活动的功能。

[43~44]

43. 【正确答案】 D

【答案解析】 因实邪结聚，阻滞经络，气血不能外达，可导致真实假虚证，称为“大实有羸状”。

44. 【正确答案】 C

【答案解析】 因脏腑的气血不足，运化无力，可导致真虚假实证，称为“至虚有盛候”。

[45~46]

45. 【正确答案】 D

【答案解析】 芒刺：舌乳头增生、肥大，高起如刺，摸之棘手，称为芒刺。若芒刺干燥，多属热邪亢盛，且热愈盛则芒刺愈多。根据芒刺所生部位，可分辨邪热所在脏腑，如舌尖有芒刺，多属心火亢盛；舌边有芒刺，多属肝胆火盛；舌中有芒刺，多属胃肠热盛。

46. 【正确答案】 B

【答案解析】 齿痕：舌体的边缘见牙齿的痕迹，即为齿痕舌。多因舌体胖大而受齿缘压迫所致，故齿痕舌常与胖大舌同见，多属脾虚。若舌质淡白而湿润，多为脾虚而寒湿壅盛。

[47~49]

47. 【正确答案】 A

【答案解析】 心阳虚证的临床表现，心悸，气短，自汗，活动或劳累后加重，兼见形寒肢冷，心胸憋闷，面色苍白，舌淡或紫暗脉细弱或结代。如出现心阳虚脱，除有心阳虚的症状外，兼见大汗淋漓，四肢厥冷，口唇青紫，呼吸微弱，脉微欲绝。

48. 【正确答案】 C

【答案解析】 心血虚证的临床表现，心悸，心烦，易惊，失眠，健忘，兼见眩晕，面色不华，唇舌色淡，脉细弱。

49. 【正确答案】 B

【答案解析】 肝肾阴虚证的临床表现，常见头晕目眩，耳鸣，胁痛，腰膝酸软，咽干，颧红，盗汗，五心烦热，男子或见遗精，女子或见月经不调。舌红无苔，脉细数。

[50~52]

50. 【正确答案】 C

【答案解析】 根据患者症状为风燥伤肺型咳嗽。

咳嗽——风燥伤肺证【方剂应用】基础方剂：桑杏汤（桑叶、苦杏仁、沙参、象贝、香豉、栀子、梨皮）加减。

51. 【正确答案】 B

【答案解析】 咳嗽——肺阴亏耗证【方剂应用】基础方剂：沙参麦冬汤（沙参、玉竹、生甘草、冬桑叶、麦冬、生扁豆、天花粉）加减。

52. 【正确答案】 A

【答案解析】 咳嗽——风热犯肺证【方剂应用】基础方剂：桑菊饮（桑叶、苦杏仁、芦根、菊花、甘草、连翘、薄荷、桔梗）加减。

[53~55]

53. 【正确答案】 D

【答案解析】 喘证——肾不纳气证【症状】喘促日久，动则喘甚，呼多吸少，气不得续，小便常因咳甚而失禁，或尿后余沥，形瘦神疲，汗出肢冷，面唇青紫，或有跗肿，舌淡苔薄，脉沉弱；或见喘咳，面红烦躁，口咽干燥，足冷，汗出如油。舌红少津，脉细数。

可选用的中成药是补金片。

54. 【正确答案】 C

【答案解析】 咳嗽——痰热郁肺证【症状】咳嗽，气息粗促，或喉中有痰声，痰多，质黏稠色黄，或有腥味，难咳，胸胁胀满，或咳时引痛，面赤，或有身热，口干而黏，欲饮水。舌红，苔黄腻，脉滑数。

可选用的中成药有清肺化痰丸、清肺抑火丸、复方鲜竹沥液。

55. 【正确答案】 A

【答案解析】 喘证——风寒闭肺证【症状】喘咳气逆，呼吸急促，胸部胀闷，痰多色白稀薄而带泡沫，兼头痛鼻塞、无汗、恶寒、发热，舌苔薄白而滑，脉浮紧。

可选用的中成药有小青龙胶囊、风寒咳嗽颗粒、苓桂咳喘宁胶囊、桂龙咳喘宁胶囊。

[56~58]

56. 【正确答案】 D

【答案解析】泄泻——脾胃虚弱证【症状】大便时溏时泻，迁延反复，食少，食后脘闷不舒，稍进油腻食物，则大便次数增多，面色萎黄，神疲倦怠。舌质淡，苔白，脉细弱。

57. 【正确答案】 B

【答案解析】泄泻——肾阳虚衰证【症状】黎明前脐腹作痛，肠鸣即泻，泻后则安，完谷不化，腹部喜暖，形寒肢冷，腰膝酸软。舌淡苔白，脉沉细。

58. 【正确答案】 A

【答案解析】泄泻——食滞肠胃证【症状】腹痛肠鸣，泻下粪便臭如败卵，泻后痛减，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，暖腐吞酸，不思饮食。舌淡红，苔垢浊或厚腻，脉滑实。

[59~62]

59. 【正确答案】 C

【答案解析】患者为阴虚燥热型消渴，治疗宜选用的中成药有降糖胶囊、消渴平片、消糖灵胶囊。

60. 【正确答案】 A

【答案解析】患者为脾胃气虚型消渴，治疗宜选用的中成药有参苓白术散、益津降糖口服液。

61. 【正确答案】 B

【答案解析】患者为肾阴亏虚型消渴，治疗宜选用的中成药有六味地黄丸、麦味地黄丸等。

62. 【正确答案】 E

【答案解析】患者为阴阳两虚型消渴，治疗宜选用的中成药有金匮肾气丸。

[63~65]

63. 【正确答案】 B

【答案解析】内伤发热证——阴虚发热证【症状】午后潮热，或夜间发热，不欲近衣，手足心热，烦躁，少寐多梦，盗汗，口干咽燥。舌质红，或有裂纹，苔少甚至无苔，脉细数。

中成药选用知柏地黄丸。

64. 【正确答案】 C

【答案解析】内伤发热——气郁发热证【症状】发热多为低热或潮热，热势常随情绪波动而起伏，精神抑郁，胁肋胀满，烦躁易怒，口干而苦，纳食减少。舌红，苔黄，脉弦数。

中成药选用丹栀逍遥丸。

65. 【正确答案】 D

【答案解析】 内伤发热——血瘀发热证【症状】午后或夜晚发热，或自觉身体某些部位发热，口燥咽干，但不多饮，肢体或躯干有固定痛处或肿块，面色萎黄或晦暗。舌质青紫或有瘀点、瘀斑，脉弦或涩。

中成药选用血府逐瘀口服液。

[66~67]

66. 【正确答案】 B

【答案解析】 月经先期——肝郁血热证，中成药选用丹栀逍遥丸。

67. 【正确答案】 C

【答案解析】 月经后期——气滞血瘀证，中成药选用益母丸、得生丸、调经丸、调经活血片。

[68~69]

68. 【正确答案】 A

【答案解析】 崩漏——脾不统血证【症状】出血量多，日久而止，气短神疲，面色㿔白，或面浮肢肿，手足不温，或饮食不佳，大便溏。舌质淡，苔薄白，脉弱或沉弱。

【方剂应用】基础方剂：固本止崩汤（人参、黄芪、白术、熟地黄、当归、黑姜）加升麻、山药、大枣、乌贼骨。

69. 【正确答案】 E

【答案解析】 月经先期——肾气虚证【症状】月经周期提前，经量或多或少，色淡暗，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗或面有暗斑。舌淡暗，苔白，脉沉细。

【方剂应用】基础方剂：固阴煎（人参、熟地、山药、山茱萸、远志、炙甘草、五味子、菟丝子）或归肾丸（熟地、菟丝子、山药、枸杞、茯苓、杜仲、山茱萸、当归）加减。

[70~71]

70. 【正确答案】 A

【答案解析】

71. 【正确答案】 C

【答案解析】 黄连有生黄连、姜黄连、萸黄连之分，泻心汤泻火解毒，用生黄连；香连丸清热化湿、行气止痛，宜用萸黄连。

[72~73]

72. 【正确答案】 C

【答案解析】 小金丸为妊娠禁用药。

73. 【正确答案】 E

【答案解析】 枣仁安神胶囊为妊娠慎用药。

[74~75]

74. 【正确答案】 D

【答案解析】 苦杏仁：小毒。5~10g，生品入煎剂后下。

75. 【正确答案】 A

【答案解析】 斑蝥：大毒，0.03~0.06g，炮制后多入丸散用。

[76~78]

76. 【正确答案】 D

【答案解析】 “自汗，气短乏力”说明患者为气虚汗出。体虚多汗者，忌用发汗药，以免加重出汗而伤阴津。

77. 【正确答案】 C

【答案解析】 “大便稀溏，四肢不温”说明为脾胃虚寒。脾胃虚寒、大便稀溏者，忌用苦寒或泻下药，以免再伤脾胃。

78. 【正确答案】 E

【答案解析】 “牙龈红肿，咽喉肿痛”说明为实热证。火热内炽和阴虚火旺者，忌用温热药，以免助热伤阴。

[79~80]

79. 【正确答案】 D

【答案解析】 九分散：活血散瘀，消肿，止痛。含有马钱子粉。破伤出血者不可外敷。

80. 【正确答案】 E

【答案解析】 麝香通心滴丸：芳香益气通脉，活血化瘀止痛。含有蟾酥。运动员慎用。

[81~82]

81. 【正确答案】 B

【答案解析】 土鳖虫与大蒜同贮。

82. 【正确答案】 E

【答案解析】 蛤蚧与花椒、吴茱萸或荜澄茄同贮。

[83~84]

83. 【正确答案】 A

【答案解析】 含糖分及黏液质较多的饮片，如肉苁蓉、熟地黄、天冬、党参等，应贮于通风干燥处。

84. 【正确答案】 D

【答案解析】 种子类药材因炒制后增加了香气，如紫苏子、莱菔子、薏苡仁、扁豆等，若包装不坚固则易受虫害及鼠咬，故应密闭贮藏于缸、罐中。

[85~86]

85. 【正确答案】 A

【答案解析】 治疗风寒湿痹证的大活络丸、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造丸等均含有附子，而止咳化痰的川贝枇杷露、蛇胆川贝液、通宣理肺丸等分别含有川贝、半夏，依据配伍禁忌原则，若将上述两组合用，附子、乌头与川贝、半夏当属相反禁忌同用之列。

86. 【正确答案】 E

【答案解析】 如附子理中丸与牛黄解毒片联用，附子理中丸系温中散寒之剂，适用于脾胃虚寒所致的胃脘痛、呕吐、腹泻等；而牛黄解毒片性质寒凉，为清热解毒泻火之剂，适用于火热毒邪炽盛于内而上扰清窍者，可见不加分析地盲目将两者合用是不适宜的。

[87~90]

87. 【正确答案】 E

【答案解析】 蓖麻子的不良反应表现，在神经系统表现为四肢麻木、步态不稳、烦躁不安、精神错乱、手舞足蹈、昏迷、幻觉、癫痫样发作。

88. 【正确答案】 D

【答案解析】 黄药子的不良反应表现为一般常见症状为乏力、纳差、尿黄、头晕、厌油腻，有的伴有巩膜、皮肤黄染，瘙痒，大便灰白等，严重者表现为急性肝炎等，有的患者伴有胆囊炎。大剂量服用可引起恶心、呕吐、脱发等症状。

89. 【正确答案】 A

【答案解析】 苦杏仁的不良反应临床表现为眩晕、心悸、恶心、呕吐等中毒反应，重者出现昏迷、惊厥、瞳孔散大、对光反应消失，最后因呼吸麻痹而死亡。

90. 【正确答案】 B

【答案解析】 罂粟壳的不良反应表现为昏睡或昏迷，抽搐，呼吸浅表而不规则，恶心、呕吐、腹泻，面色苍白，发钳、瞳孔极度缩小呈针尖样，血压下降等。

三、综合分析选择题

[91~93]

91. 【正确答案】 B

【答案解析】 心悸——心阳不振证

【症状】心悸不安，胸闷气短，动则尤甚，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白。脉虚弱或沉细无力。

92. 【正确答案】 D

【答案解析】 心悸——心阳不振证【治法】温补心阳，安神定悸

93. 【正确答案】 C

【答案解析】 桂枝甘草龙骨牡蛎汤出自东汉《伤寒论》。

原方“桂枝”可在肉桂、桂心、炒桂枝中选择，肉桂补火助阳，温通经脉；桂心味厚燥性较小，可助心阳交心肾；桂枝经炒制后辛散之力减弱，而温通之功增强。选用蜜炙甘草（炙甘草），善补中益气，调和诸药。选用生龙骨、生牡蛎，两者生用时平肝潜阳，镇惊安神的作用均较强。

参附汤出自明代朝鲜医书《医方类聚》。选用红参，补气的同时尚有刚健温燥之性，最善振奋阳气。熟附子宜选用白附片、黑顺片、黄附片、明附片、制附片、淡附片、炮附子，其中白附片、黑顺片、黄附片、明附片与淡附片相比，燥性较大，药力稍猛，不若淡附片缓和；淡附片毒性极微，应用安全，药力缓和，由散专守，常用于温肾壮阳；炮附子毒性较白附片大，除温补以外，尚常用于回阳救逆，散寒祛湿。

[94~96]

94. 【正确答案】 C

【答案解析】 眩晕——肾精不足证

【症状】眩晕日久不愈，精神萎靡，两目干涩，视力减退，腰膝酸软，或遗精滑泄，耳鸣齿摇，颧红咽干，五心烦热。舌红少苔，脉细数。

95. 【正确答案】 C

【答案解析】 眩晕——肾精不足证【治法】滋养肝肾，益精填髓。

96. 【正确答案】 A

【答案解析】 眩晕——肾精不足证【方剂应用】基础方剂：左归丸（熟地黄、山药、山茱萸、菟丝子、枸杞子、川牛膝、鹿角胶、龟板胶）加减。

[97~99]

97. 【正确答案】 B

【答案解析】 痹证——痛痹

【症状】肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒则痛甚，得热则痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有寒冷感。舌质淡，舌苔薄白，脉弦紧。

98. 【正确答案】 A

【答案解析】 痹证——痛痹【治法】散寒通络，祛风除湿。

99. 【正确答案】 C

【答案解析】 痹证——痛痹【方剂应用】基础方剂：乌头汤（川乌、芍药、麻黄、黄芪、甘草）加减。

[100~102]

100. 【正确答案】 A

【答案解析】 积滞——乳食内积证【症状】不思乳食，嗳腐酸馊，或呕吐食物、乳片，脘腹胀满疼痛，大便酸臭或便秘，烦躁啼哭，夜眠不安，手足心热。舌质红，苔白厚，或黄厚腻，脉弦滑，或指纹紫滞。

101. 【正确答案】 D

【答案解析】 积滞——乳食内积证【治法】消乳化食，和中导滞。

102. 【正确答案】 B

【答案解析】 积滞——乳食内积证【方剂应用】基础方剂：乳积用消乳丸（香附、神曲、麦芽、陈皮、砂仁、甘草）加减；食积用保和丸（山楂、神曲、半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子）加减。

[103~104]

103. 【正确答案】 D

【答案解析】 药品不良反应报告表中最后要进行因果关系分析评价（关联性评价），目前分为无法评价、待评价、可能无关、可能、很可能、肯定六级。根据题干表述，患者在排除其他因素后，停用了复方青黛丸后，肝功能逐步恢复正常。且患者2年前服用该药20天，也曾出现相同症状，故说明该患者的症状与该药的不良反应的关系是“肯定”。

104. 【正确答案】 C

【答案解析】 复方青黛丸的不良反应有腹泻、腹痛、肝炎、肝功能异常、头晕等；严重临床主要表现为药物性肝损害和胃肠出血。不包括肾功能损伤，故选C。

[105~107]

105. 【正确答案】 C

【答案解析】 男性不育症—湿热下注证【症状】阳事不兴或勃起不坚，精子少或死精较多；伴小腹急满，小便短赤。舌苔薄黄，脉弦滑。【方剂应用】程氏萆薢分清饮。

106. 【正确答案】 E

【答案解析】 男性不育症—湿热下注证，治宜选用的中成药是黄精赞育胶囊。

107. 【正确答案】 E

【答案解析】 黄精赞育胶囊：口服，每次4粒，每日3次。故D错。3个月为一疗程，故A错误。脾气久虚，腹胀便溏者慎用黄精赞育胶囊。故B、C错。

黄精赞育胶囊可酌情选用治疗湿热下注淋证、癃闭、精浊的中成药，来辅助治疗此证候的男性不育症，这些中成药包括八正合剂、癃清片、热淋清颗粒、三金片、前列通片、五淋化石丸、癃闭舒胶囊、前列回春片、男康片等。

[108~110]

108. 【正确答案】 C

【答案解析】 黄药子中毒后一般常见症状为乏力、纳差、尿黄、头晕、厌油腻, 有的伴有巩膜、皮肤黄染, 瘙痒, 大便灰白等, 严重者表现为急性肝炎等, 有的患者伴有胆囊炎。大剂量服用可引起恶心、呕吐、脱发等症状。

109. 【正确答案】 E

【答案解析】 萜类在自然界分布广泛, 种类繁多, 不少萜类化合物对肝脏有明显毒副作用, 但肝损伤机制还不甚明了。包括有川楝子、黄药子、艾叶等, 其中川楝子是含萜类肝脏毒性中药中最典型的一类物质, 能引起急性中毒性肝炎, 出现转氨酶升高、黄疸、肝肿大。

110. 【正确答案】 D

【答案解析】 黄药子对肝脏有一定毒性, 不可与利福平、四环素、红霉素、氯丙嗪等本身也具有肝毒性的西药联用, 以免引发药源性肝病。

四、多项选择题

111. 【正确答案】 BCDE

【答案解析】 未病先防, 包括以下两个方面的原则和方法。

1. 扶助正气, 提高抗病能力

- (1) 重视精神调养
- (2) 加强身体锻炼
- (3) 注意生活起居
- (4) 人工免疫

2. 消灭病邪, 防止邪气侵害

- (1) 药物杀灭
- (2) 讲究卫生
- (3) 避免病邪侵害
- (4) 防范各种外伤

112. 【正确答案】 ABD

【答案解析】 中风——风痰入络证【症状】 肌肤不仁, 手足麻木, 突然发生口眼喎斜, 语言不利, 口角流涎, 舌强语蹇, 甚则半身不遂, 或兼见手足拘挛, 关节酸痛等症。舌苔薄白, 脉浮数。

中成药选用大活络丸、再造丸、豨蛭络达胶囊。

113. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 影响中药质量变异的环境因素包括: 温度、湿度、日光、空气、霉菌、虫害、包装容器、贮存时间。

114. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 不合理用药的后果有：①浪费医药资源。②延误疾病的治疗。③引发药物不良反应及药源性疾病的发生。④造成医疗事故和医疗纠纷。

115. 【正确答案】 BDE

【答案解析】 止咳宝片含有的西药成分是氯化铵。

痰咳清片含有的西药成分有盐酸麻黄碱、氯化铵。

咳特灵片含有的西药成分是马来酸氯苯那敏。

镇咳宁糖浆含有的西药成分是盐酸麻黄碱。

鼻炎通喷雾剂含有的西药成分有盐酸麻黄碱。

总结：含有盐酸麻黄碱的中成药有良园枇杷叶膏、痰咳清片、镇咳宁糖浆、安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散痰宁糖浆、天一止咳糖浆、消咳宁片、鼻炎通喷雾剂。

116.

【正确答案】 BC

【答案解析】 苍耳子有小毒，生品对肝脏有损害；相思豆含有毒蛋白，其毒性反应使肝脏坏死，淋巴充血。

117.

【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 肾功能不全者用药基本原则和注意事项

1. 明确疾病诊断和治疗目标
2. 忌用有肾毒性的药物
3. 注意药物相互作用，避免产生新的肾损害
4. 坚持少而精的用药原则
5. 定期检查，及时调整治疗方案

118. 【正确答案】 ABCD

【答案解析】 与药物不良反应发生的临床使用因素有

- (1) 剂量过大。
- (2) 疗程过长。
- (3) 辨证不准。
- (4) 配伍失度。

119. 【正确答案】 BDE

【答案解析】 含乌头的中成药有追风丸、追风透骨丸、三七伤药片、附子理中丸、金匮肾气丸、木瓜丸、小金丸、风湿骨痛胶囊、祛风止痛片、祛风舒筋丸、正天丸、右归丸等。

乌灵胶囊的组成是乌灵菌粉。不含乌头类药物。

120. 【正确答案】 ABCDE

【答案解析】 中药注射剂合理应用基本原则

1. 选用中药注射剂应严格掌握适应证，合理选择给药途径。能口服给药的，不选用注射给药；能肌内注射给药的，不选用静脉注射或滴注给药。必须选用静脉注射或滴注给药的应加强监测。

2. 辨证施药，严格掌握功能主治。临床使用应辨证用药，严格按照药品说明书规定的功能主治使用，禁止超功能主治用药。

3. 严格掌握用法用量及疗程。按照药品说明书推荐剂量、调配要求、给药速度、疗程使用药品。不超剂量、过快滴注和长期连续用药。

4. 严禁混合配伍，谨慎联合用药。中药注射剂应单独使用，禁忌与其他药品混合配伍使用。谨慎联合用药，如确需联合使用其他药品时，应谨慎考虑与中药注射剂的间隔时间以及药物相互作用等问题。

5. 用药前应仔细询问过敏史，对过敏体质者应慎用。

6. 对老人、儿童、肝肾功能异常患者等特殊人群和初次使用中药注射剂的患者应慎重使用，加强监测。对长期使用者，在每疗程间要有一定的时间间隔。

7. 加强用药监护。用药过程中，应密切观察用药反应，特别是开始 30 分钟。发现异常立即停药，采用积极救治措施，救治患者。