

医学教育网口腔执业医师: 《答疑周刊》2023年第5期

- 问题索引: 1. 引起牙周炎的因素是?  
2. 牙周夹板的适应症是?  
3. 根分叉病变的治疗目标是?

具体解答

1. 引起牙周炎的因素是?

造成牙周病的最直接因素是

- A. 牙石
- B. 牙菌斑
- C. 遗传因素
- D. 内分泌因素
- E. 全身疾病

【答案】B

【解析】牙菌斑是牙[医学教育网]周病的始动因素,即牙菌斑是导致牙周病的最直接因素,而牙石、牙面着色、食物嵌塞、(牙合)创伤、解剖因素、不良习惯、医源性因素等都属于牙周病的局部促进因素,并非导致牙周病的直接因素。而遗传因素、内分泌因素和全身疾病等是属于牙周病的全身易感因素。

2. 牙周夹板的适应症是?

牙周夹板的适应证,不正确的一项是

- A. 外伤引起的有保留价值的松动牙
- B. 牙周病导致的牙齿松动III度
- C. 牙周手术前固定患牙
- D. 口腔卫生保持良好
- E. 牙周炎症已基本控制者

【答案】B

【解析】牙周夹板适应证: ①牙周炎松动牙经牙周治疗后,牙松动仍较明显且有

咀嚼不适等症状,如牙列完[医学教育网]整,可作牙齿结扎以利牙周组织的修复再生。②松动牙在手术前需固定,以利于手术操作和术后的愈合。由于固定的力量不大,故只用于前牙。③因外伤而松动的牙,用夹板固定后,有利于牙周组织的修复,一般固定8周后便可拆除。牙周病导致牙齿Ⅲ度松动的牙齿为拔除的指征,不是牙周夹板的适应症。

### 3. 根分叉病变的治疗目标是?

不属于根分叉区病变的治疗目标的是

- A. 清除根分叉病变区内牙根面上的牙石
- B. 通过手术等方法形成有利于患者进行菌斑控制的局部外形
- C. 早期病变尽量争取一定的牙周组织再生
- D. 消炎止痛,防止感染扩散,引流脓液
- E. 通过一些手段清除根分叉区的菌斑,并控制炎症

**【答案】**D

**【解析】**根分叉区病变的治疗目标有三点:①清除根分叉病变区内牙根面上的牙石、菌斑,控制炎症;②[医学教育网]通过手术等方法,形成一个有利于患者自我控制菌斑并长期保持疗效的局部解剖外形,阻止病变加重;③对早期病变,争取有一定程度的牙周组织再生,这方面尚有一定难度。